
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Given by Andrew Carnegie, Esq.
1903.
Septemb 1899
R W Gibson Invt

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/arboretumsegrezi00lava

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX

CULTIVÉS A SEGREZ

(SEINE-ET-OISE)

COMPRENANT

LEUR SYNONYMIE ET LEUR ORIGINE
AVEC L'INDICATION D'OUVRAGES DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT FIGURÉS

PAR

ALPH. LAVALLÉE

DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE FRANCE,
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'HORTICULTURE DE FRANCE,
MEMBRE DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, ETC., ETC.

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, 19, PRÈS LE BOULEVARD SAINT-GERMAIN

LONDRES
BAILLIÈRE, TINDALL AND COX

MADRID
C. BAILLY-BAILLIÈRE

M D CCC LXXVII

ARBORETUM SEGREZIANUM

PARIS. — IMPRIMERIE DE E. DONNAUD, RUE CASSETTE, 9.

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX

CULTIVÉS A SEGREZ

(SEINE-ET-OISE)

COMPRENANT

LEUR SYNONYMIE ET LEUR ORIGINE
AVEC L'INDICATION D'OUVRAGES DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT FIGURÉS

PAR

ALPH. LAVALLÉE

DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE FRANCE,
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'HORTICULTURE DE FRANCE,
MEMBRE DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, ETC., ETC.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, 19, PRÈS LE BOULEVARD SAINT-GERMAIN

LONDRES
BAILLIÈRE, TINDALL AND COX

MADRID
C. BAILLY-BAILLIÈRE

M D CCC LXXVII

QK480
.F7
A726
1877

PRÉFACE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Les collections dendrologiques dont je publie l'énumération sont établies à Segrez, dans le département de Seine-et-Oise, sur les territoires des communes de Saint-Sulpice-de-Favières et de Saint-Yon (1), qui faisaient partie de l'ancien Hurepoix; ces communes sont placées à une distance à peu près égale des villes de Dourdan, Etampes et Arpajon, entre la grande ligne du chemin de fer d'Orléans et celle de Tours, par Vendôme (2).

Le parc de Segrez est situé, ainsi que ses dépendances, sur la pente orientale de la vallée du Renard, petit affluent de l'Orge. Resserrée entre deux lignes de collines, cette vallée reçoit à son origine, du côté du sud-ouest, les sources de Villeconin et de Souzy, enfin celles de Segrez (3). Les eaux sont déjà assez abondantes, après quelques kilomètres de parcours, pour alimenter plusieurs moulins.

En face de Segrez, la vallée s'élargit; la colline de la rive gauche s'éloigne vers le couchant; de ce côté la vue s'étend sur des prairies et, au delà, sur des pentes cultivées,

(1) A 36 kilomètres de Paris. — Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan nord.

(2) Longitude de Paris, 38°.
Latitude — — 48°.
Altitude 76 mètres.

(3) Elles produisent, à peu près, 800 litres d'eau à la minute.

tandis que les collines de la rive droite, après avoir formé le vallon pittoresque occupé par le village de Saint-Sulpice-de-Favières, dont l'église remonte au XIIIe siècle, offrent à la vue des pentes rapides et boisées.

En descendant la vallée vers le nord-est, les eaux du Renard vont grossir, vers Breuillet, la petite rivière de l'Orge, qui se jette dans la Seine à Athis, près de Paris.

La formation géologique des terrains explique l'abondance des sources de Segrez et des environs : le thalweg de la vallée, depuis Villeconin jusqu'à sa jonction dans la vallée de la Seine, appartient au terrain tertiaire du bassin de Paris ; mais les étages du *gypse* et du *calcaire grossier* n'y sont pas représentés ; on trouve celui de l'*argile plastique* en couche inclinée dans le sens de la vallée, et, au-dessus de cette couche, les dépôts des terrains tertiaires moyens de formation plus récente ; les grès de Fontainebleau et les meulières forment ces collines et ces encaissements de vallées si remarqués aux environs de Fontainebleau, d'Étampes, de Dourdan, et en se rapprochant de Paris, à Orsay et près de Versailles.

Les grès et les sables composent la colline boisée de Segrez ; au-dessus, les meulières forment le plateau qui précède la Beauce et qui s'étend, au sud, vers Étampes. Or, ces terrains sont perméables ; les eaux de pluie s'y infiltrent, et, retenues par la couche d'argile inférieure, elles se dégagent en sources abondantes dans les bas-fonds de la vallée où affleure cette couche, ainsi que sur des points même élevés, lorsque l'argile a pu être atteinte au moyen de tranchées et de galeries.

Par sa situation, Segrez est exposé à des vents violents et à des froids parfois intenses ; les gelées printanières,

très-fortes, comme dans toutes les vallées abritées et parcourues par des cours d'eau, y sont signalées presque chaque année. Par opposition les chaleurs estivales se font remarquer par leur ardeur.

Ces conditions climatériques, que des observations météorologiques (1) relevées avec soin permettent de préciser, offrent encore cette particularité que les pluies y sont relativement rares.

La flore ligneuse spontanée autour de Segrez est assez variée. J'ai constaté la présence du *Mespilus germanica*, de deux variétés du *Sorbus aucuparia*, du *Torminaria*, du *Quercus pubescens* Willd. et de deux formes de chênes bien caractérisées se rapprochant l'une du *Q. Tozza* Bosc. (chêne Brosse), l'autre du *Q. apennina* Lamk. Les *Genista pilosa* et *prostrata*, le *Rosa arvensis*, le *Ruscus aculeatus* se rencontrent dans les parties calcaires, tandis que le *Malus acida*, le *Viburnum Opulus*, les *Salix lanceolata* et *rubra*, le lauréole, etc., recherchent les terrains humides ou argileux. Le myrtille, le genêt à balais, la viorne, le bouleau, le châtaigner caractérisent les parties siliceuses. On y rencontre aussi les *Cornus mas* L. et *sanguinea* L., le *Rosa villosa* Wolf., l'*Erica vagans* L., l'*Ulmus tortuosa* Host., le buis, quelques rares pieds de *Pirus cordata* Desv. et d'alisier de Fontainebleau. Enfin l'arbre de Judée, le faux ébénier, l'érable plane, le Robinia, le pin du Lord y sont naturalisés sur certains points (2).

(1) L'Observatoire de Segrez fonctionne régulièrement depuis le 1er juillet 1875. Les observations sont faites trois fois par jour, à 7 heures du matin, 2 heures et 7 heures du soir.

(2) J'ai constaté, dans nos environs, quelques plantes intéressantes pour la flore parisienne : *Scilla bifolia* L., *Paris quadrifolia* L., *Allium flavum* L., *Ophrys arachnites* Willd., et *monorchis* L., *Spiranthes au-*

Le parc mesure environ 31 hectares. Les collections d'arbres y sont disséminées suivant un ordre que j'indiquerai plus loin, et placées dans les conditions les mieux appropriées à chaque genre.

Les arbustes sont réunis dans deux Ecoles : l'une, commencée en 1858 est d'environ 1 hectare ; l'autre, créée en 1874, occupe près de 3 hectares.

Les premiers arbres qui font aujourd'hui partie des collections de Segrez furent plantés en 1857, mais sans ordre; car aucun but scientifique ne présida à ces premiers essais. De beaux individus, dont quelques-uns rares, existaient déjà dans le parc (1) et m'avaient permis de pressentir les excellentes conditions qui m'étaient offertes pour en augmenter le nombre. Dès 1858, encouragé par mon père, qui mit à ma disposition les terrains nécessaires pour ces collections, je résolus de réunir tous les végétaux ligneux cultivables à l'air libre aux environs de Paris, pour en former un *Arboretum*. Le nombre des individus s'éleva très-promptement à environ 3 000 ; mais les déterminations me firent plus tard comprendre combien ce chiffre était exagéré.

Je fus naturellement amené à reconnaître qu'il n'était pas possible de conserver un aussi grand nombre de végétaux

tumnalis Rich., *Alisma Damasonium* L , *Circæa lutetiana* L , *Anemone pulsatilla* L., *Crassula rubens* L., *Sedum hirsutum* All., *Epilobium palustre* L., *Primula grandiflora* Lamk, *Gentiana germanica* Willd , *Atropa belladona* L., *Veronica peregrina* L., et *montana* L., *Linaria Pelisseriana* Mill., *Orobanche concolor* Duby, *Lamium maculatum* L., *Galeobdolon luteum* Smith, *Sylibum marianum* Gœrtn, *Antennaria dioica* Gœrtn, *Trifolium rubens* L , et *subterraneum* L , *Tillæa muscosa* L. etc. Guettard, dans ses *Observations sur les plantes*, publiées à Paris en 1774, cite souvent Segrez, Saint-Sulpice et d'autres localités environnantes.

(1) Les tulipiers, cyprès chauve (*Taxodium distichum* Rich., et *adscendens* Brongt.), des noyers américains, les *Pinus pungens*, *Fraxinus pubescens*, etc.

vivants sans les classer : c'est ce qui me détermina, en 1860, à établir des Ecoles d'arbres en lignes, et non plus en massifs. Mais que d'essais et de tâtonnements furent nécessaires! Les chênes et plusieurs genres de Conifères purent seuls être conservés à la place qui leur avait été assignée. Si j'entre ici dans ces détails, c'est afin d'épargner aux autres l'embarras dans lequel je me suis trouvé.

La collection des érables, plantée le long d'une allée trop couverte, dut être changée en 1864 et placée dans les conditions plus favorables qu'elle occupe aujourd'hui. Celle qui comprend les espèces arborescentes du groupe des Pomacées, faute d'un emplacement suffisant, fut également transportée ailleurs cette même année. En effet, au lieu de 22 espèces ou variétés, réunies en 1858, il fallait pouvoir en cultiver une centaine et y faire de nouvelles introductions. Les marronniers et les peupliers furent aussi remaniés en 1865. Enfin, en 1872, je me résignai à refaire la collection de frênes. Croyant agir sagement, je l'avais placée sur le bord de prairies irriguées, mais je ne tardai pas à voir que mes arbres souffraient d'un excès d'humidité.

Aujourd'hui toutes les collections d'arbres ont un emplacement bien approprié à leurs besoins, comme en témoignent la vigueur et la bonne santé des individus. Elles sont au nombre de 21, et renferment toutes les espèces et variétés d'une même famille, ou, tout au moins, d'un même grand genre, représentées chacune, en général, par plusieurs individus. Elles occupent les deux côtés d'une allée, et s'étendent sur une longueur d'environ 2 000 mètres.

L'école des arbustes établie primitivement fut bientôt beaucoup trop petite : les intercalations avaient rompu l'ordre méthodique, et le peu de place accordé à chaque

individu obligeait à lui faire subir une taille regrettable à tous égards et impuissante à maintenir certaines espèces trop vigoureuses.

Diverses autres considérations me déterminèrent enfin à créer une nouvelle Ecole, et à lui donner définitivement une contenance en rapport avec les besoins du présent et les nécessités possibles de l'avenir ; suffisante, en outre, pour renfermer les arbres de petite taille.

Ma nouvelle Ecole a été plantée dès le printemps de 1874. Placée à l'extrémité du parc, vers le village, elle forme un vaste triangle dont la base mesure 140 mètres. Elle est divisée en 12 grands carrés que séparent des allées de 3 mètres, et subdivisée en 660 plates-bandes, de 1m 60, coupées par des sentiers ; leur longueur totale est d'environ cinq kilomètres. Cette vaste Ecole est encadrée par de larges bandes de 210 mètres de longueur, consacrées, au nord et à l'ouest, aux *Éricacées*, *Vacciniées, Hydrangéacées*, *Magnoliacées* et autres genres de plantes, dites de *terre de bruyère,* au midi elles renferment les variétés jardinières de Lilas, *Diervilla* (Weigela); tandis que les nombreux althéa et pivoines en arbres occupent le côté oriental, associés à des mûriers ainsi qu'à des bouleaux.

Les collections d'arbres et d'arbustes, réunies à Segrez, peuvent être considérées aujourd'hui comme complètes, c'est-à-dire que mes dernières recherches dans les établissements scientifiques et horticoles de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et même des Etats-Unis, me conduisent à penser que je possède, à peu près, toutes les espèces, indigènes ou exotiques, qui peuvent vivre en plein air sous notre climat. Mais que de richesses encore à conquérir parmi les arbres de la Chine, du Thibet, de l'Himalaya, de la région

du fleuve Amour, du Japon, pour ne parler que des végétaux de l'ancien continent !

Les espèces et variétés que je suis parvenu à réunir sont au nombre de 4 267 (1) ; ce chiffre ne comprend pas les variétés jardinières, purement ornementales (2), et dont la nomenclature, pour certaines espèces, est devenue impossible, telles sont celles des roses, des pivoines, des clématites, etc., et surtout les variétés fruitières.

Mais pour cultiver un aussi grand nombre d'espèces, les conserver, les faire fleurir et fructifier, enfin, les déterminer avec exactitude, que de peines, que de temps !

Il me fallut d'abord rassembler tout arbre ou arbuste qui portait un nom quelconque, et tout ce qui m'était inconnu ; recevoir maintes fois la même plante sous des noms différents !... Je dus entretenir une correspondance avec les pépiniéristes de toute l'Europe, me créer des relations avec les voyageurs, visiter les parcs et les jardins botaniques, être enfin à l'affût de toutes les introductions.

Mais les témoignages bienveillants et les excellentes relations que me procuraient ces études spéciales m'encourageaient à persévérer dans la lourde tâche que je m'étais bénévolement imposée.

Je suis heureux de pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à M. Decaisne, professeur de culture au Muséum d'His-

(1) Les Monocotylédonées ne sont représentées que par 84 espèces ou variétés ; les Dicotylédonées en comprenent donc 4 081, dont 1 029 espèces et 994 variétés sont des polypétales, 418 espèces et 429 variétés des monopétales, enfin 609 espèces et 702 variétés des apétales.

Cent soixante arbres et arbustes, environ, restent indéterminés et n'ont été encore l'objet d'aucune étude.

(2) Le nombre de ces variétés, purement ornementales, s'élève à Segrez à plus d'un mille.

toire naturelle, qui a bien voulu se souvenir de l'*Arboretum* de Segrez en me procurant les espèces ligneuses introduites directement par le Muséum et qui ne se trouvaient pas dans le commerce, ou des graines d'espèces intéressantes d'une provenance authentique. Je dois aussi à M. Decaisne de nombreux renseignements et la détermination de certaines espèces litigieuses.

Ma tâche la plus ingrate fut la détermination de ce nombre considérable de végétaux, dont je devais tout d'abord obtenir la fleuraison et la fructification.

Après avoir récolté et séché de beaux échantillons, j'ai toujours dû chercher à oublier momentanément les noms sous lesquels les plantes avaient été reçues, seule manière de débrouiller leur nomenclature et de parvenir à connaître nettement nos richesses dendrologiques. Tout en rectifiant, au fur et à mesure des déterminations, la nomenclature de mes Ecoles, je reconnus combien il était nécessaire de conserver la provenance de chaque espèce et la date précise de son introduction à Segrez. Je fus dès lors conduit à dresser des catalogues méthodiques permettant de retrouver de suite ces indications relatives à chaque individu, qui a ainsi une sorte d'état civil. J'ai en outre indiqué sur un plan (1) par un numéro correspondant à la fois au catalogue général, ainsi qu'à une fiche sur laquelle sont inscrits sa provenance, le nom sous lequel l'individu a été reçu, la date de sa réception, celle de sa première fleuraison ou de sa première fructification, etc., etc., enfin tous les renseignements qui peuvent contribuer à constituer son histoire.

(1) Chaque plan, établi à l'échelle d'un demi-centimètre par mètre, comprend toutes les espèces et variétés appartenant à une même famille, ou à un même grand genre.

Pour compléter cette organisation, il était nécessaire d'adopter un double mode d'étiquetage : chaque individu, à son arrivée, reçoit, en effet, une première étiquette matricule sur laquelle est inscrit le nom, fût-il absurde, sous lequel il a été envoyé, l'indication de sa provenance, la date de sa plantation, etc. ; puis, lorsque la détermination rigoureuse en est faite, on remplace l'étiquette primitive par une autre plus grande, de forme différente, qui, outre ces premiers renseignements, indique le nom spécifique et le pays d'où la plante est originaire.

Les difficultés contre lesquelles j'ai dû lutter pour entretenir ces collections vivantes, et y conserver l'ordre nécessaire, sont peut-être plus grandes que celles que j'avais à vaincre pour les créer. Sans une exactitude rigoureuse dans toutes les opérations, sans de continuels recensements, sans des précautions infinies pour que chaque espèce soit représentée par plusieurs individus, il eût été impossible de conserver l'ordre au milieu d'un aussi grand nombre de plantes. Aussi, que d'espèces, jadis introduites, sont aujourd'hui disparues ! Que sont devenues toutes les Éricacées, Vacciniées que cultivaient nos pères ? Où trouverait-on les *Gordonia*, les *Hopea*, les *Talauma* (*Magnolia*) *pumila* et-*fuscata*, etc., etc. ? Telle espèce cultivée en abondance, il y a peu d'années, vendue même chez les fleuristes et jusque sur les marchés, n'existe même plus dans les écoles de botanique.

Pour former et entretenir cette organisation, j'ai été secondé par M. Herincq, aide de botanique au Muséum d'Histoire naturelle, qui a bien voulu consacrer à mes collections tous les moments que lui laissaient ses fonctions dans le grand établissement scientifique auquel il est attaché. Son

dévouement affectueux m'a puissamment aidé à vaincre les difficultés que j'ai rencontrées pour former mon *Arboretum*. M. Herincq s'est chargé des recensements annuels de mes diverses Écoles et de la comparaison d'un grand nombre d'échantillons avec ceux de l'herbier du Muséum.

Si les arbres ont été l'objet d'études sérieuses et suivies jusque dans les premières années de ce siècle, il faut reconnaître que, malgré les introductions très-nombreuses que nous devons aux Siebold, Douglas, Fortune, Maximowitz, Roelz, Boissier, David, etc., etc. et malgré les variétés remarquables obtenues ou découvertes dans ces dernières années, personne n'a entrepris, en France, de les grouper et d'en faire une étude spéciale.

Les espèces décrites dans les flores et dans les journaux de botanique ne sont pas associées aux espèces voisines, originaires de contrées différentes, auxquelles elles pourraient être comparées, ou parfois réunies. Dans les écoles de botanique, tout au contraire, elles sont rapprochées, mais ordinairement dans de mauvaises conditions; d'ailleurs, un assez grand nombre, comme je le disais plus haut, se rencontrent dans les jardins, sans avoir jamais été décrites; leur origine nous échappe souvent. C'est ainsi que nous ignorons encore la patrie du lilas, dit de Perse, publié par Cornuti; celle du marronnier à fleurs rouges; celle du marronnier d'Inde, quoique soupçonnée par M. Decaisne, ne nous est connue que depuis peu.

Placé loin d'un centre scientifique je fus forcément entraîné à former une bibliothèque dendrologique, d'y joindre des flores locales des pays septentrionaux, ainsi que les ouvrages descriptifs généraux et les recueils de botanique et d'horticulture où se trouvent de nombreuses descriptions des plantes ligneuses cultivées.

Je dus aussi former un herbier spécial, contenant un rameau, soit en feuilles, soit en fleurs ou en fruits, cônes, etc., de chaque espèce (1), ainsi qu'une collection de bois, et conserver dans l'alcool les fruits mous. Je fus enfin amené à avoir un album de dessins des espèces nouvelles ou critiques accompagnées de leurs principaux organes. Ces dessins, faits sur nature, sont destinés à la publication d'un *Icones* des espèces rares, nouvelles ou litigieuses, cultivées à Segrez.

Ce ne fut qu'après tous ces travaux préalables que je pus reconnaître, avec quelque certitude, mes richesses dendrologiques et entreprendre leur détermination rigoureuse. Quoique très-imparfaite encore, elle permettra cependant de connaître avec quelque certitude leur nomenclature et leur effrayante synonymie. C'est-là le but de cette publication et la première raison d'être des collections que j'ai formées; c'est là que réside pour moi leur véritable intérêt.

Comme je viens de le dire, les jardins et les pépinières fourmillent d'espèces imparfaitement connues; j'ai pu constater, trop souvent, que beaucoup d'autres, regardées comme vulgaires, n'existent pas dans les cultures, tandis que quelques-unes, considérées comme rares, s'y rencontrent au contraire à profusion. J'ai reconnu, en outre, qu'un certain nombre d'espèces douteuses, dont l'introduction n'a pas été signalée, sont confondues avec celles inédites.

Quelques exemples feront mieux comprendre combien

(1) L'ancien herbier de Desvaux que j'ai pu conserver à la France en en faisant l'acquisition à la mort du savant botaniste angevin, m'a été d'un grand secours pour la comparaison de certaines espèces litigieuses. J'ai pu souvent mettre à la disposition de botanistes monographes les types, parfois uniques, renfermés dans ces collections qui contiennent environ 40 000 espèces.

est confuse la nomenclature des plantes introduites dans nos jardins. En effet, ni les catalogues des jardins botaniques, ni des horticulteurs, n'ont jamais signalé la présence du *Ribes gayanum* Walp., du *Pourthiæa arguta* Dcne, des *Rhamnus libanoticus* Boiss. et *bapticus* Dcne., du *Juglans rupestris* Engelm, etc., etc.; tandis qu'au contraire, les *Amorpha*, à l'exception de l'*A. fructicosa*, considérés comme des arbrisseaux vulgaires et mentionnés dans la plupart des catalogues, n'existent en réalité dans aucun jardin. Il en est de même des *Platanus*, dont le *P. orientalis* seul est cultivé, quoique les *P. occidentalis*, *californica* et *cuneata* soient partout mentionnés.

Quelques genres ou espèces anciennement introduits, et que l'on croit très-répandus, sont néanmoins fort rares. Je puis citer les *Nyssa*, *Gordonia*, *Pinckneya*, le *Cratægus Azarolus*, etc., qui n'existent que dans un très-petit nombre d'anciens parcs, quoique portés sur les catalogues de plusieurs pépiniéristes.

Des espèces entièrement nouvelles se rencontrent dans nos jardins, sans y avoir jamais été signalées et ont reçu, au hasard, leurs noms des horticulteurs ou des voyageurs; d'autres s'y trouvent inscrites comme espèces vulgaires, ou simplement désignées comme variétés jardinières, souvent même placées dans des genres auxquels elles n'appartiennent pas. C'est ainsi que, sous le nom d'*Ampelopsis japonica*, j'ai reconnu un *Rhus;* que sous celui fort singulier de *Malus edulis*, j'ai trouvé un pommier très-curieux à petits fruits dressés; que, sous les qualificatifs de *fraxinifolia* et de *caucasica*, j'ai distingué deux espèces de *Pterocarya* et que le même genre *Pterocarya* m'a encore offert une espèce très-caractérisée par son port buissonnant. Sous le nom d'*Hydrangea*

volubilis, on nous vend le *Colquhounia coccinea*; sous celui d'*H. alternifolia.*, le *Mœsa hirsuta*; comme *Leycesteria japonica*, le *Deeringia celosioides*; pour le *Galphimia hirsuta*, un *Lippia* ou un *Callicarpa*, et sous le nom de *Ligustrum multiflorum* le *Citharexylon laurinum*, etc., etc.

Je n'ai pas à multiplier ces exemples. Ceux que je viens de citer font assez pressentir l'étrange confusion qui règne dans la nomenclature horticole des arbres et arbustes. Les plus fausses déterminations y ont été introduites et s'y perpétuent; leur synonymie grossit et se complique sans cesse. Ce ne sont là que des erreurs fâcheuses pour la science, mais, jusqu'à un certain point, excusables.

Malheureusement quelques horticulteurs, j'en ai acquis la conviction, ne craignent pas, dans un intérêt trop facile à comprendre, de changer le nom des espèces ou des variétés depuis longtemps cultivées, pour les rajeunir au moyen de noms de fantaisie. Cette pratique est d'autant plus regrettable, que ces fausses dénominations se transmettent rapidement, persistent, et s'imposent d'autant plus facilement, que personne ne se charge de les rectifier. Il serait aisé de citer de nombreux exemples de végétaux ligneux, anciennement cultivés, transformés aujourd'hui en espèces nouvelles.

Je ne saurais également m'empêcher de signaler un autre genre d'erreurs dans la nomenclature horticole. Il arrive trop souvent que si l'horticulteur, auquel une commande est adressée, n'a plus telle ou telle espèce, il ne craint pas de la remplacer par une autre, en l'étiquetant du nom de l'objet demandé; il est inutile de dire que c'est presque toujours par une plante sans valeur.

C'est ainsi qu'après avoir planté jadis une collection des

principales variétés de notre noyer, j'ai reconnu, quinze ans plus tard, lorsqu'ils se sont mis à fructifier, que, sur vingt-six d'entre elles, deux seulement se trouvaient exactement nommées ; deux constituaient des variétés jardinières ; les vingt-deux autres n'étaient que des individus sans intérêt.

Je me suis étendu sur ce sujet, afin de faire saisir les difficultés que j'ai eu à vaincre pour constituer l'*Arboretum* de Segrez, et pour publier l'énumération des espèces qu'il renferme, suivie de leurs synonymes horticoles (1).

Outre les espèces que j'ai pu me procurer dans les pépinières et les jardins botaniques, je suis parvenu à en introduire quelques nouvelles, en nouant des relations avec des collecteurs tels que MM. Bourgeau, Deyrolle, Roelz, Warren, Wallis, etc.

Mon *Arboretum*, quoiqu'il ne soit définitivement constitué que depuis peu d'années, a déjà eu l'honneur de recevoir plusieurs visiteurs célèbres, au nombre desquelles figurent : MM. Asa Gray, Mettenius, Von Siebold, Sargent, colonel Korolkow, l'abbé Brunet, etc., qui m'ont fait à différentes reprises, de précieux envois. Enfin, une commission de la Société centrale d'horticulture de France s'est transportée à Segrez en 1874. Elle était composée de MM. Briot, Burelle, Carrière, Duchartre, Hardy, Keteleêr, Malet, Rivière et Verlot. Ce dernier a fait, au nom de cette commission, un rapport qui indique le genre d'intérêt qu'offre actuellement à la science l'*Arboretum* que j'ai créé (2).

(1) Cette énumération renferme un assez grand nombre d'espèces qui ne sauraient résister aux hivers des environs de Paris, mais que j'ai cru devoir conserver puisqu'elles font partie des collections de Segrez. Toutes pourraient, du moins, résister sur quelques points de la France.

(2) Voir à la fin de cette préface, page xxx un extrait de ce rapport.

Il n'existe plus en effet, en France, de grandes collections dendrologiques. Celles dont il reste quelques vestiges se composaient principalement d'espèces des Etats-Unis. Aucune, au siècle dernier, ne possédait de plantes du Japon, du fleuve Amour, ou de la partie de l'Amérique du Nord que baigne le Pacifique, enfin de tant de contrées tempérées que des explorations récentes nous ont fait connaître depuis un demi-siècle. Cependant, nos jardins botaniques renferment quelques arbres ou arbustes précieux; mais ces établissements sont situés dans des villes, dont ni le sol, ni l'atmosphère ne se prêtent à une bonne culture ; il est pour ainsi dire impossible qu'ils puissent y prendre tout leur développement. On ne saurait d'ailleurs y placer ce grand nombre d'espèces douteuses et de variétés jardinières que j'ai entrepris de réunir à Segrez.

Les *Arboretum* les plus riches aujourd'hui sont donc, en réalité, les grandes pépinières, où des horticulteurs intelligents conservent quelques exemplaires à cause de leur belle venue ou de leur rareté.

Certains genres trouvaient encore, il y peu d'années, des collectionneurs ardents, animés du désir de rassembler les espèces ou variétés ornementales d'un même groupe, mais sans être guidés par un but scientifique. C'est ainsi que les Conifères ont eu une certaine vogue pendant ces quinze dernières années. Aussi, les belles espèces de cette famille sont-elles presque communes, tandis qu'une infinité d'autres, moins recommandées, mais tout aussi intéressantes, sont fort rares. Il en est de même de la famille des Éricacées, qui passionnaient les amateurs du commencement de ce siècle, à la suite des voyages des deux Michaux. Un peu auparavant, le célèbre Duhamel de Monceau avait exercé une influence

plus décisive encore et, le premier, avait su exciter en France le goût des arbres exotiques.

Mais, avant Duhamel, et dès le milieu du XVIe siècle, une collection d'arbres avait été formée et réunissait déjà, outre les espèces indigènes, un certain nombre de types étrangers. C'est dans la Sarthe, à Touvoye, alors résidence des évêques du Mans, que René du Bellay avait rassemblé toutes les espèces ligneuses qu'il avait pu se procurer, et dont les plus précieuses lui avaient été adressées par Pierre Belon (1), savant médecin et célèbre voyageur de l'époque, qui avait su diriger, au profit de la science, les goûts de l'évêque du Mans vers ce but spécial. « René du Bellay, au dire » de Bonaventure des Perriers (2), se tenait sur son évêché » studieux des choses de la nature, et singulièrement de » l'agriculture, des herbes et du jardinage. »

Au dire de Gesner, « le jardin de Touvoye était alors le » plus beau, le plus riche, non-seulement de la France, » mais encore de l'Allemagne et de l'Italie. » La liste de quelques-uns des arbres, qui y étaient cultivés, se trouve citée dans un chapitre du plus célèbre des ouvrages de Belon, publié en 1558 : « *Les remontrances sur le défaut du labour et culture des plantes, et de la connaissance d'icelles, contenant la manière d'affranchir et apprivoiser les arbres sauvages.* »

Enfin, Le Corvoisier (3) nous dit, en parlant de René du Bellay : « Il gouverna paisiblement son diocèse, y faisant

(1) Problème 6. « J'ai fait parvenir des graines d'espèces variées, provenant de l'Italie, l'Allemagne et la Flandre, qui ont poussé et dont la plupart existent encore et ornent le jardin de Touvoye.

(2) Contes.

(3) *Histoire des évêques du Mans.*

» sa résidence ordinaire dans son château de Touvoye, où il » menait une vie douce et tranquille, prenant ses divertis- » sements innocents aux plaisirs de l'agriculture, du jardi- » nage et de la curiosité des plantes rares, qu'il faisait venir » de toutes parts pour en peupler son jardin, qui fût le pre- » mier qui fit voir que les *Ebéniers*, les *Pistachiers* et la *Ni- » cotiane* pouvaient se nourrir à l'air de cette province. » Parmi les espèces citées par Belon se trouvent les *Quercus Ilex, suber, coccifera*, un *Erable à feuilles crispées*, l'*Arbre de Judée*, l'*Agnus castus*, un *Sumac* (*Rhus veterum ?*), le *Juniperus Oxycedrus*, les *Mûriers blanc et noir*, le *Viburnum Tinus*, le *Zisyphus*, le *Styrax*, le *Diospyros*, le *Rosa moschata*, le *Myrthe*, plusieurs espèces de genêts.

C'est aux bienfaits de Belon et de l'évêque du Bellay que les provinces du Maine, de l'Anjou et de la Touraine, nous dit Renouard dans son *Annuaire littéraire de la Sarthe*, ont dû le bonheur d'être les premières en France qui aient cultivé avec succès les arbres à fruits de toutes espèces.

On peut donc considérer les collections formées par du Bellay, sous les inspirations de Belon, comme les premières établies en France. J'ai vainement cherché à retrouver quelques traces des anciennes plantations faites à Touvoye, qui appartint pendant près d'un siècle à ma famille ; je n'ai pu en découvrir aucune et je me suis assuré que les archives du département de la Sarthe ne renfermaient plus le moindre document propre à nous éclairer sur les collections de l'évêque du Mans. Tout ce qui concernait l'ancienne propriété des évêques a, en effet, été brûlé pendant la Révolution.

Jean du Bellay, archevêque de Paris et frère de Mgr du Mans, avait aussi, au dire de Belon, réuni, à la même époque, des arbres étrangers dans les jardins de l'abbaye de

Saint-Maur. Il y introduisit l'*Alaterne*. M. Horéau, dans son *Histoire littéraire du Maine*, nous dit : « Il employait volon-
» tiers son temps à greffer ses rosiers, à tailler ses arbres
» fruitiers, à semer des graines nouvelles qu'il avait acquises
» à grands frais de divers voyageurs. »

Le premier jardin botanique de Paris fut créé à la fin du XVIe siècle par Jean Robin, qui publia, dès 1601 (1), le catalogue des espèces cultivées, parmi lesquelles quinze espèces ou variétés de Roses, entre autres : *la Rose jaune*, *la Rose mousseuse à fleurs simples et la Rose blanche à fleurs pleines*, les *Mûriers blanc et noir*, le *Styrax*, etc.

Vespasien Robin, fils du précédent, fut chargé d'établir. en 1635, un jardin botanique qui devint notre Jardin des Plantes et, plus tard, le Muséum d'Histoire naturelle.

Dès 1640, Guy de la Brosse, conseiller et médecin ordinaire de Louis XIII, publia la liste de toutes les plantes qui s'y trouvaient (2), parmi lesquelles figuraient aussi un certain nombre d'espèces déjà mentionnées par Belon ou par Robin. Après Guy de la Brosse et Robin, Fagon, Tournefort, Vaillant, Antoine puis enfin son frère Bernard de Jussieu, mirent tous leurs soins à constituer et à enrichir les collections vivantes du Jardin Royal. Le nombre des arbres et arbustes avait considérablement augmenté , et la plupart s'étaient déjà répandus dans les parcs et les jardins.

Les arbres dont l'introduction est due au Muséum d'His-

(1) Catalogus stirpium tam indigenarum quam exoticarum quæ Lutetiæ colluntur, à Robino botanico regio et latrici horti celeberrimæ schole Parisiensis curatore. Parisiis ex typographia Phillipi a Prato, via amygdalina, ad veritatis insigne.

(2) *L'ouverture du Jardin Royal de Paris* pour la démonstration des plantes médicinales, par Guy de la Brosse, conseiller et médecin ordinaire du roi. Paris. Par Jacques Dugast, rue de la Boucherie. 1640.

toire naturelle sont nombreux : le *Robinia*, l'*Ailanthe* et le *Sophora* dont les graines furent envoyées par le Père d'Incarville ; le *Juniperus excelsa*, l'*Acer creticum*, rapportés par Tournefort ; les *Pirus salicifolia* et *sinaica*, ainsi que le *Pêcher d'Ispahan*, par Michaux et Olivier ; le *Noyer noir*, le *Paulownia*, l'*Abies cilicica*, le *Pinus Bungeana*, tout récemment encore le *Xanthoceras sorbifolia*, le *Cedrela sinensis*, le *Poirier de la Chine*, les *Pêchers à fruits plats*, etc., introduits à la demande de M. Decaisne par MM. l'abbé David. de Geoffroy, ministre de France à Pékin et le R. P. Heude.

La collection d'arbres créée au Tremblay, près Paris, nous est révélée par la publication, en 1735, d'un catalogue anonyme attribué à Bernard de Jussieu (1). Cet *Arboretum* était déjà remarquable par de nombreuses espèces étrangères telles que : l *Erable à sucre*, le *Negundo*, le *Sassafras*, les *Noyers blancs* et *pacaniers*, le *Marronnier rouge*, des *Chênes américains*, etc.

Peu avant, en 1705, le parc de Rambouillet avait reçu quelques espèces des États-Unis, dont de beaux sujets existent encore. L'abbé Nollin en était alors le directeur, et fut chargé de cultiver les nombreuses espèces envoyées plus tard par André Michaux.

Buffon, vers 1739, introduisit dans une terre qu'il possédait en Bourgogne, à Montbard, plusieurs espèces d'arbres exotiques dont il donna quelques exemplaires à Duhamel de Monceau ; ce fut l'origine des riches collections réunies par cet homme illustre qui chercha promptement à les augmenter, et auquel Bernard de Jussieu et Richard, directeur des pépinières de Trianon, procurèrent tour à

(1) Catalogue des arbres et arbrisseaux qui se peuvent élever aux environs de Paris. 1735.

tour les espèces qu'ils possédaient. C'est à Duhamel de Monceau que revient l'honneur d'avoir réuni, dans un but scientifique déterminé, les premières collections dendrologiques. Le célèbre inspecteur de la marine avait rassemblé toutes les espèces ligneuses qu'il avait pu se procurer dans ses vastes propriétés de Vrigny, de Monceau et même à Denainvilliers, domaine d'un frère cadet qui le secondait dans tous ses travaux, et qui surveilla toutes ses plantations et les soumit à une étude rigoureuse. Duhamel put ainsi les décrire avec soin et publier en 1755 son *Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France.* C'est cet important ouvrage que Loiseleur-Deslongchamps compléta cinquante ans plus tard et qu'illustrèrent des artistes célèbres, tels que Bessa et Redouté (1). Cet ouvrage est encore actuellement le meilleur traité descriptif que nous ayons des espèces ligneuses.

Placé à la tête de la marine, et membre de l'Académie des sciences, Duhamel occupait à la cour un des premiers rangs et sut se servir de sa haute position pour obtenir, à diverses sources, un grand nombre d'arbres et d'arbustes, non encore introduits, et qu'il sut désigner à ses correspondants, MM. de Fontenette, en Louisiane ; Gautier, à Québec ; Peyronnel, consul à Smyrne ; Prevost, commissaire à l'Ile royale ; Caussineri, chancelier à Chio. Grâce au concours de son ami Bernard de Jussieu, de Buffon et de la Galissonnière, l'ancien gouverneur du Canada ; grâce en outre, à une correspondance suivie avec trois membres de la Société royale de Londres : Mitchell, Miller et Collinson, il parvint à acquérir des graines de la Virginie et du Canada. Duhamel s'était aussi créé des relations dans diverses

(1) Nouvelle édition, Paris 1800-1812 (Nouveau Duhamel).

parties de la France : MM. de Bombarde, Charentoneau, le chevalier Turgot, et enfin l'abbé Nollin, directeur des cultures de Rambouillet, puis de celles du Roi, au Roule, lui procurèrent des espèces intéressantes et précieuses. Il était ainsi parvenu à réunir un millier d'arbres et arbrisseaux, appartenant à 191 genres. Dans ce nombre figuraient, il est vrai, des variétés jardinières, beaucoup plus nombreuses déjà qu'on ne peut le supposer.

C'est à Duhamel que l'on doit en grande partie la plantation dans les parcs et les jardins des premiers arbres étrangers. Non-seulement il cultivait et multipliait toutes les espèces qu'il avait pu rassembler, mais il se plaisait à les distribuer et à les répandre. Il essayait, en outre dans ses domaines, la culture forestière de plusieurs d'entre elles, et l'on peut encore voir aujourd'hui quelques restes de ses grandes plantations : le cèdre, le cyprès chauve, et quelques autres espèces y sont représentés par de magnifiques individus.

A l'époque où Duhamel réunissait ses richesses dendrologiques, le duc d'Ayen, maréchal de Noailles, plantait dans son parc, près de Saint-Germain-en-Laye, avec le concours de Lemonnier, un grand nombre d'arbustes d'ornement, dont quelques-uns, fort rares, et qui firent l'admiration de tous ceux qui visitèrent ces beaux jardins ouverts à tous les amateurs. Ce fut lui l'instigateur, auprès de Louis XV, de la création du Jardin botanique de Trianon, où Bernard de Jussieu établit la classification naturelle.

Les jardins du petit Trianon furent confiés, en 1753, par Louis XV, d'après les conseils de Lemonnier, à Claude Richard, qui créa rapidement, outre des orangeries et des serres une Ecole de plantes de pleine terre, qui fit faire de

grands progrès à la botanique. Le parc avait été peuplé de nombreuses essences forestières provenant de pays étrangers, dont le climat n'est pas moins rigoureux que le nôtre, et qui se répandirent ensuite sur tous les points de la France.

L'Ecole de botanique disparut lors de la transformation du petit Trianon; mais quelques arbres épars représentent encore ces anciennes collections, tels sont : les *Quercus pyramidalis*, *Ilex*, et *occidentalis*, *Chamæcyparis sphæroidea*, *Pinus strobus*, *Gincko*, le *Planera*, des *Celtis*, le *Maclura*. Les vastes pépinières actuellement existantes furent organisées sous Charles X; elles servirent aux collections réunies par M. Massey, le collaborateur de de Mirbel, et renferment encore beaucoup d'espèces précieuses ou critiques.

Les pépinières du Roi, au Roule, contribuèrent, comme celles de Trianon, à répandre les premières introductions d'arbres de l'Amérique septentrionale. Etablies probablement sous Henri IV, elles restèrent consacrées, jusqu'en 1772, à la multiplication d'espèces destinées aux parcs et jardins de la couronne. A cette époque, placées sous la direction de l'abbé Nollin, des espèces rares y furent plantées et multipliées pour servir à leur propagation.

M. de Lézermes, neveu de l'abbé Nollin, succéda à son oncle et fut bientôt remplacé par Aubert du Petit-Thouars. membre de l'Académie des sciences, auquel on doit à peu près les seuls renseignements relatifs à ces pépinières (1).

La pensée chimérique d'accoutumer les plantes de pays chauds à vivre sous des latitudes septentrionales, en les y

(1) *Notice historique sur la pépinière du Roi, au Roule.* Paris, 1825.

amenant par des degrés insensibles, prit naissance dans les pépinières du Roule. L'espalier de pistachiers qui ornait les murs de l'Orangerie semblait, en effet, encourager ces tentatives; mais Aubert du Petit-Thouars ne partageait pas ces illusions.

Les pépinières du Roule servirent surtout à propager et à répandre les végétaux dont les Michaux faisaient incessamment des envois. L'exactitude rigoureuse des renseignements fournis dans leurs ouvrages, et surtout le soin apporté à indiquer les conditions précises d'habitat de chaque espèce dans l'*Histoire des arbres de l'Amérique du Nord*, exercèrent une influence considérable et contribuèrent puissamment à faire rechercher les arbres nouveaux dont l'introduction est due à ces deux savants et courageux voyageurs.

Michaux fils était membre de la Société centrale d'agriculture de France et fut chargé, à ce titre, pendant longtemps, de la direction du domaine forestier d'Harcourt (1). Il y planta des massifs entiers d'espèces des États-Unis et réunit dans une sorte d'Ecole plusieurs autres, qui ne lui semblaient pas offrir un aussi grand intérêt. Les *Pinus strobus*, *Cupressus thuyoides*, *Thuya occidentalis*, *Quercus rubra*, etc., etc. constituèrent bientôt, à Harcourt, des groupes exploitables, dont l'étude est pleine d'intérêt.

Le duc d'Ayen, fils du créateur des collections de Saint-Germain, en transporta une grande partie dans sa propriété de Champlâtreux, près de l'Isle-Adam, et fit de grands ef-

(1) Des rapports de MM. Huzard fils en 1836, Adolphe Brongniart en 1845 et 1852, Pépin la même année et en 1857, permettent d'apprécier l'intérêt que peut offrir, aux forestiers, le domaine légué à la Société centrale d'agriculture de France par l'un de ses membres, M. Delamarre. La petite Ecole formée par Michaux renferme quelques espèces devenues très-rares en France.

forts pour les augmenter. C'est, actuellement, l'un des seuls parcs de France où subsistent encore quelques-uns des premiers arbres introduits, à la fin du siècle dernier, de l'Amérique du Nord.

Lemonnier avait prêté au duc d'Ayen son précieux concours, et il est probable que l'intérêt scientifique qui s'attacha aux collections de Saint-Germain et de Champlâtreux, est entièrement dû à son initiative, que secondaient merveilleusement ses relations amicales avec Michaux. Il habitait Montreuil, près de Versailles, et avait réuni, dans son propre jardin, les arbrisseaux de petite taille, et surtout ceux appartenant à la famille des Éricacées, alors en vogue. La propriété de Lemonnier fût saccagée pendant la Révolution : un *Zelkowa*, un *Quercus coccifera*, et deux variétés de Cèdre du Liban existaient pourtant encore en 1835 (1). A la même époque, un amateur distingué, le chevalier Janssin, rassemblait à grands frais, dans sa propriété, à Chaillot, les espèces et variétés d'arbres précieux. Ne reculant devant aucune dépense, il achetait, dans toutes les parties de l'Europe, les arbres et arbustes qui lui paraissaient nouveaux. Quoiqu'en grande partie détruites par la Révolution, on pouvait encore retrouver, vers 1830, quelques beaux sujets de cette collection : un *Acer opalus* et un *Ilex balearica*, qui permettaient d'apprécier l'œuvre du chevalier Janssin. Vers 1810, de Vilmorin entreprit, dans son domaine des Barres, d'importantes plantations des arbres exotiques qu'il croyait les plus propres à l'exploitation, et dont la plupart existent encore aujourd'hui. Cette Ecole forestière, acquise par l'Etat, renferme environ 260 espèces ou variétés, parmi lesquelles un grand nombre de Conifères.

(1) *Journal de la Société d'horticulture de Paris*, 1835, p. 342.

Les arbres et les arbustes d'ornement étaient plus spécialement cultivés à Brunoy, chez Noisette (1), fils du jardinier de Monsieur (Louis XVIII), et à Ville-d'Avray, chez Godefroy, l'un des premiers qui multiplia les plantes de terre de bruyère.

C'est aussi au commencement du siècle que furent créées les pépinières, très-connues, des frères Audibert, à Tarascon; celles de Baumann, à Bollwyller; de Jacquemet-Bonnefont, à Annonay; d'André Leroy, à Angers; d'E. Simon, à Metz, etc. Elles permirent à plusieurs amateurs de se procurer d'intéressantes collections; la réputation des jardins du baron de Pappenheim, à Combes-la-Ville (2), de l'amiral Tchitchagoff, à Sceaux; du comte de Montberon, à Clervaux, près de Châtellerault, et du comte de Dijon, à Nérac, s'est transmise jusqu'à nous.

Des arbres exotiques furent encore plantés en grand nombre dans les parcs de Méréville, près d'Etampes et de Saint-Leu, aux environs de Paris, ainsi qu'à La Maillardière, près Nantes, où le comte de la Bretèche introduisit, probablement le premier en Europe, le *Magnolia grandiflora*, dont de magnifiques individus existent encore.

Je dois en outre citer le général Lemarrois et M. de Mayneville qui, tous deux, avaient fait d'importantes plantations de Conifères en Normandie; M. d'Ivoy, dans le département de la Gironde. Le baron de Tschudy, de son côté, réunissait dans sa propriété de Columbière, près Metz, les espèces

(1) Une note insérée dans le *Journal de la Société d'horticulture de Paris* signale quelques arbres remarquables introduits ou propagés par Noisette: *Acacia var. spectabilis*, *Juglans nigra macrocarpa*, *Quercus macrocarpa*, *Ulmus nigra*, *Populus grandidentata*, *Betula bella*, *Cupressus Tournefortii*, *Hovenia dulcis*.

(2) *Journal de la Société d'horticulture de Paris*, 1829, p. 195.

précieuses de Conifères, qui lui paraissaient pouvoir offrir quelque intérêt. Son fils, l'inventeur de la greffe herbacée qui porte son nom, s'appliqua à les enrichir encore.

Malheureusement rien n'a été publié sur ces diverses collections, qui ne sont que très-vaguement connues; elles n'ont laissé aucune trace et sont disparues avec leurs propriétaires. Quant à celle formée par le vicomte Héricart de Thury, dans sa propriété de Thury, elle est connue par un rapport inséré dans les annales de la Société d'horticulture (1) ainsi qu'une autre à Baleine, près Moulins, appartenant à Mlle Aglaé Adanson, fille du célèbre botaniste. Mais cette propriété ne renferme pour ainsi dire, aujourd'hui, aucune des espèces qui y avaient été réunies. De gros buissons de camellias, en pleine terre, indiquent la localité, probablement la plus septentrionale, où puisse vivre ce bel arbuste dans le centre de la France.

Nous rencontrons encore, près de Pithiviers, dans le très-beau parc de Mme Eulalie Lebrun, quelques arbres fort rares, tels que : *Nyssa uniflora* et *capitata*, *Ilex opaca*, *Primos glaber*, *Abies canadensis*, etc., qui, pour la plupart, proviennent de Monceau ou de Vrigny; car Duhamel paraît avoir été l'inspirateur de cette collection.

Quoique je ne puisse avoir l'intention, dans cet examen rapide, de passer en revue les collections d'arbres réunies sous un climat très-différent de celui du bassin de Paris, il me paraît difficile de négliger celles créées au commencement de ce siècle par Dumont-Courset, l'auteur d'un ouvrage estimé de botanique horticole (2), qui était correspondant de l'Institut

(1) Tom. IX, p. 298.

(2) *Le botaniste cultivateur*, 5 vol. 1802.

et membre de la Société centrale d'agriculture. Ce savant amateur, esprit spéculatif autant qu'observateur, avait entrepris de réunir dans sa propriété, près Boulogne-sur-Mer, des plantes de toute nature, mais principalement de pleine terre, et surtout des arbustes d'ornement, placés, grâce au climat maritime, dans d'excellentes conditions. Ces écoles, commencées dès 1784, n'ont été classées systématiquement qu'en 1792. Les *Vacciniées*, les *Ericacées*, étaient, paraît-il, l'objet des soins tout particuliers de Dumont-Courset. Ces collections, dont une courte notice (1) peut encore nous donner l'idée, n'ont pas été, comme tant d'autres, dispersées à la mort de leur créateur et subsistent encore en partie.

Le beau parc de Fromont, à Ris, près de Paris, appartenant au chevalier Soulange-Bodin, renfermait une multitude d'arbres précieux, plantés de 1810 à 1829 ; à cette époque, son propriétaire y établit un Institut horticole enseignant, ainsi qu'un établissement pour la propagation et la vente des espèces précieuses. C'était le temps de splendeur de ces belles collections, qui devaient cesser de s'augmenter quelques années plus tard, à la mort de leur créateur.

Le parc de Fromont passa, depuis lors, en plusieurs mains ; mais les nouveaux propriétaires respectèrent du moins les plus beaux arbres ; aujourd'hui l'établissement horticole, qui contribuait surtout à assurer la conservation de la plupart des sujets, vient d'être vendu, et il est à craindre qu'il ne soit rien conservé des anciennes collections et qu'elles ne soient détruites, puisqu'en France tout ce qui n'a pas un caractère public, mais est dû à la seule initiative privée, est bientôt condamné à disparaître.

Ces riches collections exercèrent aussi une influence

(1) *Description des jardins de Courset*, par M. Lair. Paris, 1814.

réelle et ramenèrent, un moment, la vogue aux plantations d'espèces exotiques. Des hommes de mérite : Guillemin, Poiteau, et d'autres, y professaient. Les plus grands noms scientifiques concouraient à la rédaction des *Annales de Fromont* : du Petit-Thouars, de Mirbel, Brongniart, Adrien de Jussieu, Loiseleur-Deslongchamps, André Michaux, Richard, Turpin, etc., enrichirent de leurs articles cet important recueil. Les visiteurs étrangers y affluaient ; le roi Charles X et d'autres souverains vinrent également admirer ce bel établissement.

Il convient enfin de mentionner des collections, qui, bien que n'étant pas consacrées entièrement aux espèces ligneuses, n'en étaient pas moins très-intéressantes. Je veux parler de celles créées, vers 1825, par le duc d'Orléans, dans ses propriétés de Neuilly, du Raincy et de Mousseaux, qui comprenaient, outre les plantes de serre, un grand nombre d'arbres et surtout d'arbustes, dont quelques-uns fort rares. Ces cultures étaient confiées à Jacques, jardinier fort habile, qui en publia le catalogue (1). On y remarquait des espèces fort précieuses, dont quelques-unes ont disparu des cultures françaises ; telles sont le *Ceanothus procumbens*, le *Daphne altaica*, l'*Hypericum veronense*, deux *Ledum*, aujourd'hui inconnus (les *L. odoratissimum* et *procumbens*), le *Lycium americanum*, les *Cratægus ovalis*, *radiata*, *grandiflora* et *græca*, diverses espèces ou variétés typiques de *Roses*, etc., etc.

Ces collections, qui avaient exigé tant de soins et de dé-

(1) Catalogue alphabétique des plantes, arbres et arbustes, croissant naturellement ou cultivés en plein air, orangeries ou serres chaudes dans les jardins de Neuilly, du Raincy et de Mousseaux. Paris, 1824.

penses, furent saccagées lors de la révolution de 1848, et le parc morcelé. Toutefois, on retrouve encore un certain nombre de beaux arbres de l'ancien domaine, sur les bords de la Seine, près de l'île de la Grande-Jadhe (1).

A part les collections spéciales que je viens de citer et qui ne comprennent généralement que des végétaux ligneux de grande taille, il n'en existe plus, à ma connaissance, à l'état d'entretien, c'est-à-dire qui comprenne les nouvelles introductions.

Je regrette que cet aperçu rapide ne m'ait pas permis de mentionner les parcs et les jardins situés trop en dehors du bassin de Paris, et dans lesquels on rencontre encore de beaux exemplaires d'espèces exotiques. J'aurais voulu citer les essais de MM. Robert, Bredin, Daudin, Herpin de Frémont, Cte de Courval, Mis de Vibray, etc., etc., qui, dans d'autres parties de la France, se sont occupés, les uns et les autres, de la culture des arbres à divers points de vue ; mais cet examen m'eût fait sortir du cadre que je me suis tracé.

A. Lavallée.

(1) J'ai pu le constater dans une visite récente ; la collection de Saules est encore à peu près complète.

(*Extrait du Rapport de la commission de la Société centrale d'Horticulture, chargée de visiter les collections dendrologiques de Segrez*). [1]

. . . . . .

Les écoles d'arbres et d'arbustes, fruit d'un actif et patient labeur, qui ont été formées à Segrez, ne souffrent aucune concurrence. Nous n'avons rien à leur opposer en France et nous ne leur connaissons aucune rivale à l'étranger. Segrez possède une réunion de végétaux ligneux des plus importantes par le nombre et la variété des formes qui la composent. On y trouve, groupées ou isolées, la grande majorité des espèces des régions froides et tempérées froides de l'Europe moyenne et orientale, de l'Asie Mineure, du Caucase. L'Asie centrale, notamment les hautes régions de l'Himalaya, le Bootan, le Thibet et le Népaul, dont la végétation arbustive est si variée et si différente de la précédente, s'y trouvent représentés par un certain nombre de formes les moins frileuses. Les végétaux de la région Amour, du Japon, de la Chine et des autres contrées de l'Asie orientale ont été recherchés avec cette passion ardente qui caractérise le botaniste. Enfin, est-il besoin de dire que l'Amérique du

(1) Cette commission était composée de MM. Briot, Carrière, Duchartre, Hardy, Keteleêr, Malet, Rivière et B. Verlot, rapporteur. — Extrait du *Journal de la Société centrale d'horticulture de France*, 2me série, t. IX, 1875, pp. 281 à 297.

Nord et du Nord-Ouest, ainsi que les régions les plus froides du Mexique ont aussi leurs représentants à Segrez ?

Il est inutile de faire ressortir l'immense labeur que re-représente un établissement comme celui de Segrez, arrivé à son point actuel.

Là, ainsi que nous avons cherché à l'indiquer, nous n'avons pas seulement sous les yeux une masse de végétaux rassemblés à grands frais de tous les points du globe, mais chacun d'eux a donné lieu à un travail qui a créé sa véritable valeur. M. A. Lavallée peut dire, à juste titre, que son *Arboretum* est son herbier, herbier vivant, constamment revisé et étudié, où chaque individu est un type bien déterminé, auquel vient se comparer chacune des acquisitions nouvelles. Mais on sent qu'un herbier de cette nature présente des difficultés de conservation et de classement plus grandes que les herbiers desséchés de nos collections scientifiques. A une plante sèche quelques grammes de sublimé corrosif dissous dans l'alcool et un local à l'abri de l'humidité assurent une conservation pour ainsi dire indéfinie, en même temps que les introductions nouvelles viennent, avec une extrême facilité se classer entre les anciennes. La plante vivante a bien d'autres exigences. L'individu nouveau, souvent unique, est exposé à tant de périls, avant sa complète et définitive installation, que tout le soin et le tact du jardinier ne sont pas de trop. Quels seront ses besoins, ses aptitudes? Sera-ce un nain ou un géant ? C'est ce que le plus souvent on est réduit à deviner, faute de renseignements. Puis, si la détermination manque ou si elle est inexacte, pour remettre un arbre ou même un arbuste à sa véritable place dans la série, il faut des transplantations souvent fort délicates et non sans périls. Les déterminations botaniques

en laissant de côté le travail de cabinet souvent aride qu'elles nécessitent, ne peuvent se faire d'une façon précise qu'à la floraison ou même à la fructification, et celles-ci ne se produisent souvent que sur des individus déjà âgés. Quelles difficultés ne résultent pas de cet état de choses ? Disons que nous les avons trouvées, à Segrez, aussi parfaitement vaincues qu'il est possible de le faire. Chaque espèce nous a paru avoir été placée dans les conditions qui lui sont les plus favorables, et nous ne pouvions en avoir de meilleure preuve que la bonne santé et la vigueur générale des individus qui font des écoles de Segrez des plantations modèles.

Votre Commission a été unanime pour féliciter notre savant collègue de sa création qui est appelée à rendre de signalés services à la science. L'encombrement des dénominations erronées est l'une des plaies de l'horticulture, et on ne peut mieux s'en débarrasser qu'en lui fournissant une réunion de types bien déterminés. Aussi aurions-nous désiré vous proposer, en outre des vives félicitations que nous vous demandons, Messieurs de lui adresser, de renvoyer ce Rapport à la Commission des Récompenses, avec une recommandation toute spéciale, si nous n'étions assurés que la modestie de M. A. Lavallée lui ferait refuser une distinction à laquelle il a cependant tous les droits.

. . . . . .

VERLOT, *Rapporteur*.

AUTEURS ET OUVRAGES CITÉS

A

A. Braun. — Alexandre Braun.
Act. Acad. Paris. — Mémoires de l'Académie de Paris.
A. Gr. et *As. Gr.* — Asa Gray.
A. Gr. Gen. — Asa Gray, Genera floræ Americæ boreali-orientalis.
Ait. — Aiton, Hortus Kewensis.
All. fl. pedem — Allioni, Flora pedemontana.
All. Cunn. — Allan Cunningham.
Alph. DC. — Alphonse de Candolle.
Anders. Monogr. Salic. — Anderson, Monographia Salicum.
Arch. Mus. — Archives du Muséum.
Andr. The heath. — Andrews, The heathery, or monograph of the genus Erica.
— Bot. rep. — Andrews, The Botanist's repository.
Ann. de Gand. — Annales de Gand.
Ann. From. — Annales du Jardin de Fromont.
Ann. Mus. — Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Ann Soc. Hort. Par. — Annales de la Société royale d'horticulture de Paris.
Ann. sc. nat. — Annales des sciences naturelles.
Ant. Conif. — Antoine, Die coniferen nach Lambert.
A. Rich. Elæag. — Achille Richard, Monographie des Eléagnées.
Arn. — Walker Arnott.
Audib. — Audibert.
Audub. Birds of amer. — Audubon, Birds of america.

B

Baill. — Baillon, Adansonia.
Balb. — Balbis, Miscellanea botanica.
Balf. — Balfour, A catalogue of british plants.

Banks. Ic. Kæmpf. — Banks, Icones selectæ plantarum quas in Japonia collegit et delineavit Kaempfer.
Barckh. — Barckhausen, Specimen botanicum, etc.
Barr. Plant. Icon. — Barrelier, Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ iconibus æneis exhibitæ.
Bart. Fl. bor. amer. — Barton, Flora of north America.
Bartr. It. ed. germ. — Bartram, Travels trough north and south Carolina. Edition allemande.
Bast. — Bastard, Essai sur la Flore du dépt. de Maine-et-Loire.
Bauh. — Bauhin (Gaspard).
Beauv. — Palisot de Beauvois.
Beauv. Agrost. — Palisot de Beauvois, Essai d'une nouvelle agrostographie.
Beekl. — Beekley.
Belg. Hort. — Belgique horticole.
Benth. — Bentham.
Bert. Mém. genev. — Bertoloni, Mémoire de l'Académie de Genève.
Bess. — Besser.
Bieb. — Bieberstein (Marschall von).
Bigel. med. bot. — Bigelow, American medical Botany.
Blom. (*Carl Magnus*). — Register öfver Bengt Bergii.
Blackw. Blackwel, A curious herbal.
Blum. Fl. Jav. — Blume, Flora Javæ.
— Mus. Lugd. bat. — Blume, Museum Lugduni batavorum.
Bung. Enum. — Bunge, Enumeratio plantarum quas in China boreali collegit.
Boiss. — Boissier (Edmond).
— Voy. Esp. — Boissier, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne.
— Fl. or. — Boissier, Flora orientalis.
Bonaf. — Bonafous.
Bong. — Bongard, Descriptiones plantarum novarum.
Bork. ou *Borkh.* — Borkhausen.
Bosc. — Bosc (Louis-Augustin-Guillaume).
Bot. cab. — Botanical cabinet.
Bot. mag. — Botanical magazine.
Bot. reg. — Botanical register.
Brand. Illustr. for Ind. — Brandis, Illustration of the forest sof India.
Brit. flow. gard. — The british flower garden.
Brongt. — Adolphe Brongniart.

Brot. — Brotero.
Buckl. — Buckland.
Bull. soc. bot. fr. — Bulletin de la Société botanique de France.
Bull. Ac. Brux. — Bulletin de l'Académie de Bruxelles.
Bur. — Edouard Bureau.
Burgsd. — Burgsdorff.

C

Cambess. — Cambessèdes.
C. A. Mey. — Carl Anton Meyer.
Carr. Conif. — Carrière, Traité général des Conifères.
Cas. DC. — Casimir De Candolle.
Catesb. Carol. — Catesby, The natural history of Carolina.
Cathc. Illustr. of himal. pl. — Hooker in « Cathcart » Illustrations of Himalayan plants.
Cav. Diss. — Cavanilles, Monadelphiæ classis Dissertationes.
— Icon. — Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum quæ in Hispania crescunt.
Cham. — Chamisso.
Cham. et *Schl.* ou *Schlecht.* — Chamisso et Schlechtendal.
Chapm. — Chapman.
Chois. — Choisy.
Christ. — Christ (Johann-Ludwig).
C. Koch — Carl Koch.
Cl. Gay. Fl. chil. — Claude Gay, Flora Chilena.
Clus. hist. — Clusius (Charles de l'Ecluse), Rariorum plantarum historia.
Coll. — Colla, Hortus Ripulensis.
Comm. — Commerson.
Commel. Hort amst. — Commelyn (Johan), Catalogus plantarum horti medici amstelodamensis, etc.
Compt. rend Ac. sc. — Comptes rendus de l'Académie des sciences.
Cook. — Cook (S. E.).
Coss. — Cosson.
Crtz. — Crantz.
— Stirp. austr. — Crantz, Stirpes austriacæ.
Cunn. — Allan Cunningham.
Curt. Fl. lond. — Curtis, Flora londinensis.

Curt. Bot. mag. — Curtis, The Botanical magazine.
Cyr. Pl. rar. — Cyrillo, Plantarum rariorum.

D

DC. — De Candolle (Augustin-Pyramus).
— Fl. fr. — Flore française.
— Hort. genev. — Hortus genevensis.
— Ic. rar. — Icones plantarum Galliæ rariorum, etc.
— Pl. rar. genev. — Plantes rares du jardin de Genève.
— Prodr. — Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis.
Dcne. — Decaisne.
— Jard. fr. Mus. — Decaisne, Jardin fruitier du Muséum.
Dcne et *Pl.* — Decaisne et Planchon.
De Chambr. — De Chambray.
Dehndt. — Dehnhardt.
Del. — Delile.
Delaun. — Delaunay.
Deless. Icon. select. — Delessert, Icones selectae plantarum.
Déségl — Déséglise.
Desf. — Desfontaines.
— Fl. atl. — Desfontaines, Flora atlantica.
Despr — Despréaux.
Desv. — Desveaux, Dictionnaire des sciences naturelles.
D. Hook. Rhod. of Sik. Him. — Dalton Hooker, Rhododendrons of Sikkim-Himalaya.
Dietr. Dietrich.
Dict. sc. nat. — Dictionnaire des sciences naturelles de Desvaux
Domb. — Dombey.
Don. — Don (David).
Dougl. — Douglas.
Drum. — Drummond.
Duh. ou *Duham.* — Duhamel du Monceau.
— Arb. — Duhamel, Traité des arbres et arbustes cultivés en France.
Dum. Cours. — Dumont-Courset.
Dur ou DR. — Danal.
Dur. — Durieu de Maisonneuve.
Duroi. — Duroi, Dissertatio inauguralis, Observationes botanicas (de arboribus americæ septentrionalis) sistens.
Durraz. — Durrazini.

E

Eat. — Eaton.
Ehret. — Ehret, Plantæ depictæ.
Ehrh. — Ehrhart.
Ehrnb. — Ehrenberg.
Eichw. Cauc. — Eichwald, Plantarum novarum, quas in itinere Caspio-Caucasico observavit, fasciculi.
Ell. — Elliot.
Ellis. — Ellis.
Emers. Rep. Massach. — Emerson, Report on the trees of Massachusetts.
Endl. — Endlicher.
— Conif. — Endlicher, Sinopsis Coniferarum.
Engelm. — Engelmann.
Engl. bot. — English botany.
Engl. fl. — English flora.
Exot. bot. — Exotic botany.

F

Fisch. — Fischer.
Fisch. et Mey. — Fischer et Meyer.
Fl. austr. — Host, Flora austriaca.
Fl. atl. — Desfontaines, Flora atlantica.
Fl. dan. — Flora danica.
Fl. des serr. — Flore des serres.
Fl. et *Pom. fr* — Flore et Pomone françaises.
Fl. franç. — De Lamarck et De Candolle, Flore française.
Fl. gard. — Loudon, Flower-gardens.
Fl. lapp. — Linné, Flora lapponica.
Fl. ross. — Ledebour, Flora rossica.
Fl. sard. — Flora sardoa.
Flor. and Pomol. — Florist and Pomologist.
Flor. mag. — Floral magazine.
Flugg. Ann. Mus. — Flugge, Annales du Muséum.
Forb. Pinet. Wob. — Forbes, Pinetum Woburnense.
— Salic. Woburn. — Forbes, Salicetum Woburnense.
Forsk. — Forskal.

Forst. Gen. pl. austr. — J. Forster et G. Forster, Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas maris australis collegerunt.
Fort. — Fortune.
Foug. Mém. Ac. sc. Par. — Fougeroux, Mémoires de l'Académie des sciences de Paris.
Frém. — Frémont.
Frey. — Freyer.
Fries. — Fries.

G

Gærtn. fruct. — Gærtner, De fructibus et seminibus plantarum.
Gard. chron. — Gardener's chronicle.
Gartenfl. — Gartenflora.
Gaud. — Gaudin.
Gaudich. — Gaudichaud.
Gill. et *Hook.* — Gillies et Hooker.
Gmel. — Gmelin.
Godr. — Godron.
Gord. — Gordon.
Gouan. Descr. Gink. — Gouan, Description du Ginkgo biloba, dit Noyer du Japon.
Gr. — Grenier.
Gr. et *Godr.* — Grenier et Godron.
Griff. — Griffith.
Griseb. — Grisebach.
G. Thur. — Gustave Thuret.
Guill. Arch. bot. — Guillemin, Archives de botanique.
Guimp. Abbild. deut. Holz. — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.
— Holzgew — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.
— fr. holzg. — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.
— et *Hayne*, Deutsch. holtz. — Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.
Guss. Pl. rar. — Gussone, Plantæ rariores, etc.

H

Hamilt. — Hamilton.
Hartw. — Hartweg.
Hartig. — Hartig.
Harting. Parad. — Hartinger, Paradisus Vindobonensis.
Hassk. — Hasskarl.
Haw. — Haworth.
Hayn. Arzn. — Hayne, Arzneigewächse, etc.
— Darstell. — Hayne Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse, etc.
H. B. K. Nov. gen. — Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova genera et species plantarum, etc.
Heldr. — Heldreich.
Hend. ou *Henders.* — Henderson.
Herb. amat. — Herbier de l'amateur.
Heuff. — Heuffer.
Hochst. — Hochstetter.
Hoffm. Salic. — Hoffmann, Historia salicum iconibus illustrata.
Hombr. Voy. Pôl. sud. — Hombron, Voyage au Pôle sud.
Hook. Bot. mag. — Hooker, Botanical magazine.
— Bot. misc. — — Botanical miscellany.
— Icon. — — Icones plantarum.
— Fl. bor. am. — — Flora boreali-americana.
Hook. fil. Fl. nov. zel. — — Flora novæ-zelandiæ.
— Illustr. him. — — Illustrations of himalayan plants.
— In catch. Ill. him. — Hooker, In Catchcart Illustrations of himalayan plants.
— Fl. antarct. — Hooker fils, Flora antarctica.
Hook. et *Arn.* Bot. Beech. — Hooker and Walker Arnott. The botany of capitain Beechey's voyage, etc.
Hook. et *Thom.* — Hooker et Thompson.
Hopp. — Hoppe.
Horn. — Hornemann.
Huds. — Hudson.
Hort. berol. — Hortus berolinensis.
— *bogor.* — — bogorensis.
— *Booth.* — — Booth.
— *paris.* — — parisiensis.

Hort. lon l. — Hortus londinensis.
— *kew.* — — regius kewensis.
— *lugd.bat.* — — lugduno-batavus.
— *petrop.* — — petropolitanus.
— *segr.* — — segreziensis.
Host, Gram. — Host, Icones et descriptiones Graminum austriacorum
Host, Salix. — Host, Salix.
Houtt. — Houttuyn.

I

Illustr. hort. — Illustration horticole.

J

Jacq. Fl. austr. — Jacquin (Nicolaus Joseph von), Flora austriaca.
— Hort. schænbr. — — Hortus schoenbrunnensis.
— Hort. vind. — — Hortus botanicus vindobonensis.
— Icon. — — Icones plantarum rariorum.
— Misc. austr. — — Miscellanea austriaca ad botanicam.
— Ecl. — — (Joseph Franz von) Eclogæ plantarum rariorum.
Jeaume St.-Hil. Fl. fr. — Jeaume de St.-Hilaire, Flore française.
— Pom. fr. — Pomone française.
Jaub. — Jaubert.
— et *Spach.* Illustr. — Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium.
— et *Spach.* Pl. or. ill. — Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium.
Jeffr. — Jeffrey.
J. F. Gmel. — Johann Friedrich Gmelin.
J. Gay, Jacques Gay.
Journ. hort. Soc. L. — Journal of horticultural Society of London.
— *Soc. hort. Fr.* — Journal de la Société centrale d'horticulture de France.
Juss. — De Jussieu.

K

Kæmpf., Amœn. — Kæmpfer, Amœnitatum, etc.
— Icon. — Kæmpfer, Icones selectae plantarum quas in Japonia, etc.
Kalm. — Kalm (Pehr.)
Ker. — Ker (John Bellenden).
Kern. — Kerner.
— Gen. — Kerner, Genera plantarum selectarum specierum iconibus illustrata.
Kirchn. — Kirchner.
Knight. — Knight.
Kotsch. Die Eich. — Kotschy, Die Eichen europas un der orients.
Kth. Gram. — Kunth, Agrostographia synoptica.
Kth. et *Bouch.* — Kunth et Bouché.

L

L. ou *Lin.* — Linné.
L. fil. — Linné fils.
Lab. ou *Labill.* Syr. ou Pl. syr. rar. — Labillardière, Icones plantarum Syriæ rariorum.
Lamb. Pin. — Lambert, A description of tho genus Pinus.
Lamk. Encycl. — De Lamarck, Encyclopédie méthodique.
— Dict. — De Lamarck, Dictionnaire ou Encyclopédie méthodique.
— Illustr. ou Ill. — De Lamarck, Illustrationes.
Lang. — Lang.
Lange. — Lange.
Lapeyr. — Picot de Lapeyrouse.
Lavall. Arbor. segrez. Ic. — Lavallée, Icones de l'Arboretum de Segrez.
Lawr. — Miss Mary Lawrance.
Laws. Pinet. brit. — Lawson, Pinetum britannicum.
Laxm. — Laxmann.
L. C. Rich. — Louis-Claude Richard.
Ledeb. Fl. alt. — Ledebour, Flora altaïca.
— Icones. — Ledebour, Icones floræ altaïcæ.
Lej. — Lejeune.

Lem. — Lemaire.
L'hérit. Corn. — L'héritier de Brutelle, Cornus.
— Stirp. nov. — L'héritier, Stirpes novæ aut minus cognitæ.
L'hort. fr. — Herincq, L'Horticulteur français de 1851.
Liebm. Chênes. — Liebman, Chênes de l'Amérique tropicale.
Lin. — Linné.
Lin. Transact. — Linnean society's Transactions.
Link. — Link.
Link et *Otto*, Icon. hort. berol. — Link et Otto, Icones plantarum horti berolinensis.
Lindl. — Lindley.
— Bot. reg. — Lindley, Botanical register.
— Monogr. Ros. — Lindley, Rosarum monographia.
Lob. Icon. — De Lobel (Lobelius), Plantarum seu stirpium icones.
Lodd. bot. cab. — Loddiges, Botanical Cabinet.
Lois. — Loiseleur-Deslongchamps.
— Herb. am. — Loiseleur-Deslongchamps, Herbier de l'amateur.
— Nouv. Duh. — Loiseleur, Nouveau Duhamel.
Loud. Arb. brit. — Loudon, Arboretum et fruticetum britannicum.
— Encycl. of tres. — Loudon, Encyclopedia of trees and shurbs.
Lour. — Loureiro.

M

Maak. Tent. Fl. ussur — Maak, Tentamen floræ ussuriensis.
Magn. — Magnol.
Manett. — Manetti.
Marsh. — Marshall.
Marsigl. — Marsigli (Marsilius).
Mart. et *Galeot.* — Martens et Galeotti.
Martyn. — Martyn.
Mast. Gard. chron. — Masters, Gardener's chronicle.
Maund, Bot. — Maund, The botanic garden.
Maxim. Lesped. — Maximowicz, Lespedesa.
— Prim. Fl. amur. — Maximowicz, Primitiæ floræ amurensis.
May. — Mayer.
M. Bieb. Cent. pl. rar. — Marshall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiæ meridionalis.
Medic. — Medicus.
Meisn. — Meisner.

Mém. Mus. — Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Mér. — Mérat.
Mhlbr. — Muhlenberg.
Michel. — Micheli.
Michx. Arb. Am. — Michaux fils, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
— Arb. for. — Michaux fils, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
— Chênes. — Michaux, Histoire des Chênes de l'Amérique.
Mill. Icon. — Miller, Icones plantarum.
Miq. — Miquel.
Mirb. — Brisseau-Mirbel.
Mos. — Mosino.
Moc. et *Sess.* — Mocino et Sessé.
Moench. Verzeich. Ausl. — Moench, Verzeichniss auslandischer Baume und Stauden.
Mol. — Molina.
Moor et *Jackm.* Clem. — Moor et Jackmann, The Clematis.
Moric. — Moricand.
Moris. Fl. sard. — Moris, Flora sardoa.
Morr. — Morren.
Muhl. — Muhlenberg.
Mull. — Muller.
Murr. Comment. Gætt. — Murray (Johan Anders), Commentarii societatis scientiarum gottingensis.
Murr. Bot. exped. to Oreg. — Murray, The botany of the expedition to Oregon.
Murr. fil. Pin. and Fire of Jap. — Murray fil, Pinetum and Ffires of Japon.
Munro. Bamb. — Munro, A. Monograph of the Bambuscæ.
Mut. — Mutis.
Mutel. Fl. fr. — Mutel, Flore de France

N

Ndn. — Naudin.
Nees. — Nees von Esenbeck.
Nels. — Nelson.
Nestl. — Nestler.

Newb. in Will. report. — Newberry in Williams reports of botany of northen California and Oregon.
Nouv. Arch. mus. — Nouvelles archives du Muséum.
Nouv. Duh. — Nouveau Duhamel (Traité des arbres et arbustes).
Nutt. North-Am. Sylv. — Nuttal, the North-American sylva.

O

Ortg. — Ortgies.

P

Pall. Fl. ross. — Pallas, Flora rossica.
Parlat. in DC. Prodr. — Parlatore in Aug. Pyr. De Candolle, Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis.
Park. Parkinson.
Parr. — Parry.
Pav. — Pavon.
Paxt. — Paxton.
— Fl. gard. — Paxton's Flower garden.
— Mag. of bot. — Paxton, Magazin of botany.
Perrot. — Perrottet.
Pers. — Persoon.
Planch. — Planchon.
Pluk. — Plukenett.
Plum — Plumier.
Poepp. — Poeppig.
— Nov. gen. et spec. — Poeppig, Nova genera et species plantarum.
Poir. — Poiret.
— Encycl. — Poiret, Encyclopédie botanique.
Poit. Poiteau.
— et *Turp.* Arbr. fruit. — Poiteau et Turpin, Pomologie française, ou recueil des plus beaux fruits cultivés en France.
Poit. et *Riss.* — Poiteau et Risso, Histoire naturelle des Orangers.
Pourr. — Pourret.
Presl. — Presl.
Prsh. Fl. bor. amer. — Pursh, Flora Americæ septentrionalis.

R

Ræusch. — Ræuschel.
Rafin. — Rafinesque.
Rau. — Rau, Enumeratio Rosarum.
Rauch. — Rauch.
R. Br. — Robert Brown.
Rchb. Fl. germ. — Reichenbach, Flora germanica.
Redout. Ros. — Redouté, Les Roses.
— Lil. — Redouté, Les Liliacées.
— et Th. — Redouté et Thori, Les Roses.
Reg. — Regel.
— Bem. Bet. — Regel, Monographisch Bearbeitung der Betulaceen.
— Gartenfl. — Regel, Gartenflora.
— Tent. fl. ussur. — Regel, (in Maak) Tentamen floræ ussuriensis.
Reichb. Icon. fl. germ. — Icones floræ germanicæ.
Retz. — Retzius, Observationes botanicæ.
Rev. hort. — Revue horticole.
Rheed. Hort. mal. — Rheede, Hortus indicus malabaricus.
Rich. Conif. — Richard, Mémoire sur les Conifères.
Riss. Orang. — Risso, Essai sur l'histoire naturelle des Orangers.
Rœm — Rœmer.
— Fl. Europ. — Roemer, Flora europea inchoata.
Rœm et *Sch.* — Rœmer et Schultes.
Rœlz. — Rœlz.
Roxb. — Roxburgh.
— Corom. Pl. — Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel.
Roxb. Fl. ind. — Roxburgh, Flora indica.
Royle, Illustr. — Royle, Illustrations of the botany of the himalayan mountains.
Ruel. — Rueling.
Ruiz et *Pav.* Fl. peruv. — Ruiz et Pavon, Flora peruviana.
Rumph. — Rumphius.
Rupr. — Ruprecht.
— Bamb. — Ruprecht, Bambuseæ.
Rupr et *Maxim.* — Ruprecht et Maximowicz.

S

Salisb. Parad. lond. — Salisbury, The Paradisus londinensis.
Saltzm. Ros. — Saltzmann, De Rosa.
Santi. Viag. tose. — Santi, Viaggio al Montamiata.
Saund. et *Bak.*, Refug. bot.— Saunder et Bak. Refugium botanicum.
Sav. Fl. ital. — Savi, Flora italiana.
Schied. — Schiede.
Schlech. ou *Schlcht.* — Schlechtendal.
Schk. Handb. — Schkuhr, Botanisches Handbuch.
Schr. — Schrader.
Schreb. — Schreber
Schmdt, Arb.—Schmidt (Franz), Œstereichs allgemeine Baumzuchi.
Sims, — Sims, Botanical magazine.
Schtz. — Schultz.
Scop. Fl. carn. — Scopoli, Flora carniolica.
Ser. — Seringe.
Sibth. Fl. græc. — Sibthorp, Flora græca.
Sieb. — Sieber.
Sieb. et *Zucc.* — von Siebold et Zuccarini.
— Fl. jap. — von Siebold et Zuccarini, Flora japonica.
— Fam. nat. — von Siebold et Zuccarini, Floræ japonicæ familiæ naturales.
Sitgrves, Rep. — Sitgreaves, Report of an expedition dawn Colorado.
Slne. Jam. — Sloane, A voyage to the Islands Madera and Jamaica.
Smith, Exot. bot. — Smith, Exotic Botany.
— Icon. pict. — Smith, Icones pictæ plantarum rariorum.
— Spicil. — Smith, Spicilegium botanicum.
Sol. ou *Soland.* — Solander.
Soul. Bod. — Soulange Bodin.
Soy.-Wilm. — Soyer-Willemet.
Spach, Suit. Buff. — Spach, Suites à Buffon.
Spreng. — Sprengel.
Staunt. — Staunton.
Steud. — Steudel.
Stev. — Steven.
Swtz, — Swartz.

Swtz. Trans. lin. soc. — Swartz, Transactions of the Linnean society of London.
— bot. — Swartz, Observationes botanicæ.
Sweet, Cist. — Sweet, Cistineæ.

T

Tausch. — Tausch.
Tchihat. — Tchihatchef.
Ten. Fl. nap. Icon. — Tenore, Icones floræ napolitanæ.
— Fl. napolit. — Tenore, Flora napolitana.
Thom. et *Hook*. — Thomson et Hooker.
Thor. — Thory.
Thouin. — Thouin (André).
Thuill. — Thuiller.
Thunb. Fl. jap. — Thunberg, Flora japonica.
Thur. — Thuret (Gustave).
Torr. — Torrey.
— Fl. New-York. — Torrey, Flore of the state of New-York.
Torr. et *Gr*. — Torrey et Asa Gray.
Torr. et *Frem*. To Rock. mount. — Torrey et Fremont, Report of the exploring expedition to the Rocky mountains.
Tourn. — Tournefort.
Tradesc. — Tradescant.
Trans. *Edimb*. *soc*. — Transactions of the Edimburgh society.
Tratt. Arch. — Trattinick, Archiv der Gewachskunde.
Trautv. Imag. fl. russ. — Trautvetter, Plantarum imagines et descriptiones Floram rossicam illustrantes.
Trée. — Trécul.
Turcz. — Turczaninow.
Turp Turpin.

V

Vahl. — Vahl.
— Symb. bot. — Vahl, Symbolæ botanicæ.
V. *Htte*. — Van-Houtte
Vent. — Ventenat.
— Ch. de pl. — Ventenat, Choix de plantes.
Vent. Jard. Cels. — Ventenat, Plantes nouvelles du Jardin de Cels.
— Malm. — Ventenat, Jardin de la Malmaison.
Versch. Illustr. Cam. — Verschaffelt, Illustration des Camellia.

W

Vill. — Villars.
Visian. — Visiani.
Wahlenb. — Wahlenberg.
Wald. et *Kit.* Hung. rar. — Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariæ.
— — Fl. hung.— Waldstein et Kitaibel, Flora hungaria.
Wall Tent. fl. nepal. — Wallich, Tentamen floræ nepalensis illustratæ.
Walp. — Walpers.
Walt. Fl. Carol. — Walter, Flora caroliniana.
Wangenh. Beitr. — Wangenheim, Beitrag zur teutschen holzgerechten Forstwissenschaft.
Wats. Dendr. brit. — Watson, Dendrologia britannica.
Wbb. — Webb.
— et *Bert.* — Webb et Berthelot.
Wendl. Collect. pl. — Wendland, Collectio plantarum, etc.
Weihe. Rub. — Weihe et Nees von Esenbeck, Rubi germanici descripti et figuris illustrati.
Wesm. Mon. Popul. — Wesmael, Monographie du genre *Populus*.
Wght, Icon. pl, ind. or. — Wight, Icones plantarum Indiæ orientalis.
Willd. — Willdenow.
— Baumz. — Willdenow, Berlinische Baumzucht.
— Hort. berol. — Willdenow, Hortus berolensis.
Wimm. — Wimmer.
Winsl. — Winslow.
Witcher. ou *Wither.* — Withering.
Woods. — Woods.
Wulf. — Wulfen.

Z

Zeyh — Zeyher.
Zucc. — Zuccarini.

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

DICOTYLEDONEÆ

POLYPETALÆ

RANUNCULACEÆ

CLEMATIS Lin.

§. FLAMMULA :

C. mandshurica *Rupr.* — Mandshuria.

C. Flammula *L.* — *Rchb.* Fl. germ. IV, tab. 62 et 64. — Europa.

C. fragrans *Ten.*

var. maritima.

C. maritima *L.* — *Rchb.* Ic. tab. 4665.

— rubella.

— linearis.

C. orientalis *L.* — *Dill.* Elth., tab. 119; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Caucasus.

C. flava *Mœnch.*

C. graveolens *Lindl.* Journ. Hort. soc., p. 307. — Bot. mag., tab. 4495.

Meclatis orientalis *Spach.*

C. glauca *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 73. — Sibiria.
C. orientalis *var.* glauca *Hort.*
Meclatis sibirica *Spach.*

C. apiifolia *DC.* — Japonia.

C. Vitalba *L.* — Engl. bot. IX, tab. 612; *Jacq.* Fl. austr., tab. 303. — Gallia.

C. paniculata *Thunb.* — Japonia.
C. Vitalba japonica *Houttuyn* Pflanz., tab. 2.

C. Grahami *Benth.* — Journ. Hort. soc. I, tab. 315.— Mexico.

C. virginiana *L.*— *Wats.* Dendr. brit., tab. 74. — Amer. sept.
var. bracteata.
C. bracteata *Mœnch.*

C. biternata *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Clematis virginica *Thunb.* (non *Lin.*).

C. montana *Hamilt.* — Bot. reg. XXVI, tab. 53; *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 8. — Nepalia.
C. anemoneflora *Don.*
var. grandiflora. — Bot. mag., tab. 4061.

C. mendocina *Hort.* — Chili?

§. Viornæ :

C. villosa *DC.* — India.

C. soongarica *Bnge.* — Songaria.
C. Gebleriana *Bnge.* Acad. Petersb. VI, tab. 1.

C. Pitcheri *Torr.* et *Gray.* — Arkansas.

C. grata *Wall.* Pl. asiat. rar. I, tab. 98. — India orientalis.

C. Viorna *L.* — *Jacq.* Ecl., tab. 32; *Andr.* repos. I, tab. 71. — America septentrionalis.
Viorna urnigera *Spach.*

C. cylindrica *Sims*, Bot. mag., tab. 1160. — Amer. sept.
C. divaricata *Jacq.* Ecl., tab. 33.
Viorna cylindrica *Spach.*

C. cordata *Walt.* (non *Pursh*). — Bot. mag., tab. 1816. — America septentrionalis.
C. Simsii *Sweet.*
C. rosea *Smith.*

C. crispa *L.* — Bot. mag., tab. 1892; Bot. reg. XXXII, tab. 60. — Virginia.
C. reticulata *Walt.* (non *Wats.*).
C. crispa rosea *Hort.*

C. reticulata *Wats.* Dendr. I, tab. 72. (non *Walt.*). — Georgia.
C. Schillingii *C. Koch.*

C. Hendersoni *Hort.*
C. Chandleri *Hort. brit.*
var. pallida (intermedia).

C. japonica *Thunb.* — Japonia.

§. VITICELLA.

C. campaniflora *Brot.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 987. — Iberia.
C. parviflora *DC.* Hort. Genev., tab. 12.
C. revoluta *Desf.* (non *Walt.* nec *Wats.*).
C. viornoides *Hort.*

C. Viticella *L* — Bot. mag., tab. 565. — Europa merid.
var. Guascoi. — Belg. hort. VII, tab. 37; Ill. hort. 1857, tab. 117.
Alt. variet. hortenses multæ.

C. patens *Dcne.* Bull. acad. Brux. III, 173. — Rev. hort. 1856, tab. 44. — Japonia.
C. cærulea *Lindl.* Bot. reg., tab. 1955.
C. — grandiflora. — Bot. mag., tab. 3983.
C. — azurea. — *Harting.* Parad. I, tab. 3.
var. Helena. — Rev. hort. 1855, tab. 18.
— Louisa. — Fl. des serres X, tab. 1052.
— rubra grandiflora *Moor* et *Jackm.*, Clematis, tab. 2, fig. 2.
— venosa *Hort.* (non *Royle*). — Fl. des serres XIII, tab. 1964.
— Sophia *Sieb.* — L'Hort. franç. 1854, tab. 1; Fl. des serres VIII, tab. 852.
— speciosa plena. — Illust. hort. V, tab. 184.

STIRPES VEL VARIETATES INCERTÆ.

var. Jackmanni — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 14; l'Hort. franç. 1872, tab. 2; Fl. des serres XVI, tab. 1628.
— John Gould Weitch. — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 7; Fl. des serres XVIII, tab. 1875.
— Mad. J. Bateman. — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 2, fig. 1.
— magnifica. — Floral mag. tab. 453.
— marmorata. — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 1, fig. 2.
— rubella. — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 1, fig. 1.
— rubro-violacea. — Fl. des serres XVI, tab. 1629.
— splendida (splendens). — Rev. hort. 1865, p. 70.

C. florida *Thunb.* — Bot. mag., tab. 881; Rev. hort. 1856, tab. 3. — Japonia.
var. Tessen (millefolia).
— flore albo.
— — pleno. — *Jacq.* Hort. Schœnbr. tab. 357.

C. Sieboldi *Don.* — Fl. des serres V, tab. 487; Rev. hort. 1856, p. 21; *Moor* et *Jackm.* Clem. tab. 16. — Japonia.
C. florida *var.* bicolor *Lindl.* Bot. reg. XXIV, tab. 25.

C. Standishii *Moor.* — Belg. hort. XIV, tab. 3. — Japonia.

C. Fortunei *Moor.* — Florist and Pomol. 1863, p. 169 cum Icon.; Fl. des serres XV, tab. 1553; *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 13. — Japonia.

C. lanuginosa *Lindl.* — L'Hort. franç. 1855, tab. 1; Fl. des serres VIII, tab. 811; *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 4. — China et Japonia.
var. candida. — Floral mag. tab. 210.
— lady Bowill. — *Moor* et *Jackm.* Clematis, tab. 15.
— pallida. — Fl. des serres XI, tab. 1176.
— Reginæ. — Floral mag. tab. 175.

§. CHEIROPSIS :

C. cirrhosa *L.* — Bot. mag., tab. 1070; Bot. reg. XXXIII, tab. 21; *Sibth.* Fl. gr. tab. 517. — Sicilia.

var. pedicellata.

C. pedicellata *Lindl.* Bot. reg. XXXIII, tab. 21.

C. balearica *Pers.* (non *Rich.*).

C. calycina *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab. tab. 720; Bot. mag., tab. 959. — Insula Minorca.

C. balearica *Rich.* (non *Pers.*).

C. barbellata *Edgew.* — Bot. mag. tab. 4794; Fl. des serres IX, tab. 956. — Himalaya.

C. nepalensis *Royle.*

§. ATRAGENE :

C. alpina *Mill.* — Bot. repert., tab. 180. — Europa media.

Atragene alpina *L.* — *Pall.* Fl. ross. II, tab. 76.

C. sibirica *Mill.* — Sibiria.

Atragene sibirica *L.* — Bot. mag., tab. 1951.

C. verticillaris *DC.* — America borealis.

Atragene americana *Sims*, Bot. mag., tab. 887.

PÆONIA Lin.

P. Moutan *L.* — *Bonpl.* Malm. tab. 1 et 23; Nouv. Duham. VII, tab. 3; Bot. mag., tab. 1155 et 2175. — China.

P. arborea *Hort.*

var. papaveracea *Lodd.* Bot. cab. tab. 547.

P. papaveracea *Andr.* Bot. repos. VII, tab. 463.

— Banksii.

— grandis.

P. germania *Hort. Sieb.*

Varietates hortenses multæ.

XANTHORHIZA L'Hérit.

X. apiifolia *L'Hérit.* Stirp. tab. 38. — Bot mag, tab. 1756; Nouv. Duham. III, tab. 37. — Virginia.

MAGNOLIACEÆ

ILLICIUM Lin.

I. religiosum *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 1; Bot. mag., tab. 3965. — Japonia.

I. floridanum *Ell.* Lett. to Lin. — *Lamk*, Encycl. tab. 493; Bot. mag., tab. 439. — America septentrionalis.

I. anisatum *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 493. — China. Vulg. *Anis étoilé.*

I. parviflorum *Michx.*— *Vent.* Jard. Cels, tab. 22.— Florida.

DRYMIS Forst.

D. Winteri *Forst.* — *Lamk*, Illustr., tab. 494; *Hayne* IX, tab. 6. — Fret. Magellan.

MAGNOLIA Lin.

SPECIES AMERICANÆ :

M. grandiflora *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 1. — Nouv. Duham. II, tab. 65. — Carolina.

var. angustifolia.
— crispa
— Gallissonieri.
— macrantha.
— majardieriensis.
— nannetensis.
— oxoniensis. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 814.
— rotundifolia.
— salicifolia.
— stricta.

M. glauca *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 2; Bot. mag., tab 2164. — America septentrionalis.

var. longifolia.

— pumila. — Bot. mag., tab. 977; *Vent.* Malm., tab. 37.

— Thompsoniana.

M. Thompsoniana *Hort.*

— sempervirens.

— arborea.

M. umbrella *Lamk.* — Herb. amat. III, tab. 198. — Amer. sept.

M. tripetala *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 5.

M. acuminata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 3. — Bot. mag. tab. 2427. — America septentrionalis.

M. maxima *Lodd.*

var. rustica.

M. rustica *Hort.*

M. auriculata *Lamk.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6; Bot. mag., tab. 1206. — Carolina.

M. pyramidata *Bartr.* — Bot. reg., tab. 107. — Carolina.

M. auriculata *var. Michx.*

M. Fraseri *Walt.*

M. macrophylla *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 7; Bot. mag., tab. 2189. — America septentrionalis.

M. cordata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6. — Bot. reg., tab. 325. — America septentrionalis.

var. biflora.

SPECIES ASIATICÆ:

M. Campbelii *Hook.* et *Th.* — *Hook.* in *Cathart* Ill. Him., tab. 4 et 5. — Sikkim et Bhotan.

M. conspicua *Salisb.* — Bot. mag., tab. 1621; Bot. reg., tab. 1164. — China.

M. Yulan *Desf.* — *Bonpl.* Malm. tab. 29; Herb. amat. V, tab. 297; *Lodd.* Bot. cab., tab. 1187.

Yulania conspicua *Spach.*

M. conspicua.

var. stricta.

— Soulangeana. — Ann. soc. hort. Par. I, p. 90, cum Icon.; Bot. reg., tab. 1164.

— Fischeri.

M. odoratissima *Remw.*

— Alexandrina (superba).

M. Nortbertii *Hort.*

— Bylsiana.

— spectabilis (alba).

M. spectabilis *Hort.*

— triumphans.

— speciosa.

M. Kobus *DC.* — Japonia.

M. gracilis *Salisb.* Parad., tab. 87.

Yulania Kobus *Spach.*

var. unicolor.

M. obovata *Thunb.* Kermer hort., tab. 655. — Japonia.

Yulania japonica *Spach.*

var. discolor.

M. discolor *Vent.* Malm., tab. 24. — Nouv. Duham. II, tab. 66 bis.

M. purpurea *Curtis*, Bot. mag., tab. 390.

— liliiflora.

M. liliiflora *Lamk.* — *Banks.*, Ic. Kæmpf., tab. 44.

— floribus roseis (subroseis).

— — atropurpureis.

— Lenneï. — Fl. des serres, XVI; tab. 1693; Rev. hort. 1866, p. 370, cum Icon.

LIRIOPSIS Spach

M. fuscata *Spach.* — China.

Magnolia fuscata *Andr.* Bot. reposit. tab. 2100. — Bot mag. tab. 1008.

TALAUMA Juss.

T. pumila *Blum.* Fl. jav. fasc. 19, tab. 12. — China.
Magnolia pumila *Andr.* Bot. Rep. IV, tab. 226. — *Vent.* Malm., tab. 37; Bot. mag., tab. 977.
Liriodendron liliifera *L.*

LIRIODENDRON Lin.

L. Tulipifera *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 5; Nouv. Duham. III, tab. 5. — America septentrionalis.
var. acutifolia aurea. — Fl. des serres, XIX, tab. 1025.
— contorta.
— crispa.
— foliis medio-pictis.
— heterophylla.
— integrifolia. — Illustr. hort. XV, tab. 571.
— pyramidalis.
— variegata.

SCHIZANDRACEÆ

SCHIZANDRA Michx.

S. chinensis *Hook.* et *Benth.* — Ussuri.
Maximowiczia chinensis *Turcz.* — *Maxim.* Prim. fl. amur., tab. 1; Fl. des serres XV, tab. 1273.
M. amurensis *Rupr.*
Kadsura chinensis *Turcz.*

KADSURA Juss.

K. japonica *Kæmpf.* Amœn., tab. 474. — *Sieb.* et *Zucc.* Fl jap., tab. 17. — Japonia.
var. variegata.

DILLENIACEÆ

ACTINIDIA Lindl.

A. volubilis *Hort. segrez.* — Japonia.
Trochostigma volubile *Sieb.* et *Zucc.*

A. polygama *Planch.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Regio amur.
Trochostigma polygama *Sieb.* et *Zucc.*

A. Kolomikta *Rupr.* — Ussuria.
Trochostigma Kolomikta *Maxim.*
Prunus Kolomikta *Maxim.*
Kolomikta mandshurica *Regel.*

ANONACEÆ

ASIMINA Adans.

A. triloba *Dunal.* — Pensylvania et Florida.
Anona triloba *Michx fil.* Arb. amer., III, tab. 9.
A. glabra *Hort.* (non *Lin.*).

LARDIZABALEÆ

AKEBIA Dcne.

A. quinata *Dcne.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 77; L'Hort. franç. 1869, tab. 4; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.
Rajania quinata *Thunb.*

HOLBŒLLIA Wall.

H. latifolia *Wall.* Tentam. fl. nepal, tab. 16. — Nepalia.
Stauntonia latifolia *Hort.* (non *Wall.*). — Gard. chron. 1876, fig. 46.

STAUNTONIA DC.

S. chinensis *DC.* — China.

S. hexaphylla *Dcne.* Arch. Mus. I, tab.2. — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 176 ; Garden. Chron. 1876, fig. 107. — Japonia.

LARDIZABALA Ruiz. et Pav.

L. biternata *Ruiz.* et *Pav.* — *Dcne*, Arch. Mus. 1, tab. 11, fig. A; Bot. mag., tab. 4501 ; Belg. hort. III, tab. 51. — Chili.

L. triternata *Ruiz* et *Pav.*—*Deless.* Icon. I, tab. 91. — Chili.

MENISPERMEÆ

COCCULUS C. Bauh.

C. Thunbergii *DC.* — Japonia.
Menispermum orbiculatum *Thunb.*

C. japonicus *DC.* — Japonia.
Menispermum japonicum *Thunb.*

C. carolinus *DC.* — *Gray* Genera., tab. 28. — Florida.
Menispermum carolinum *L.*

MENISPERMUM Tourn.

M. canadense *L.* — Bot. mag.. tab. 1910; *Spach*, Suites Buff., tab. 62. — America borealis.
var. virginica.

M. dauricum *DC.* — *Deless.* Icon. I, tab. 100. — Dahuria.

BERBERIDEÆ

BERBERIDOPSIS Hook. fil.

B. corallina *Hook fil.* Bot. mag., tab. 5443; — L'Hort. franç. 1863, tab. 13. — Chili.

BERBERIS Lin.

B. vulgaris *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 4; Engl. bot. I, tab. 49. — Europa, Asia et America.

var. foliis purpureis.
— — variegatis.
— macrocarpa.
B. monspeliensis *Hort.*
— fructu albo.
— — violaceo.
— cuneata *Hort.* (non *Banks.*).
— declinata *Hort.* (non *Schrad.*).
— gracilis.
— ovalifolia aurea.
— sanguinolenta *Schrad.*
B. sinensis *Aliq. Hort.* (non *Desf.*).
— chinensis *Hort.* (non *Desf.*).
B. sinensis hybrida *Hort.*

B. sinensis *Desf.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 26. — China.
B. monosperma *Hort.*
B. spathulata *Hort.* (non *Schrad.*).

B. serratifolia *Poir.*
B. microphylla *Hort.*

B. cretica *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 342. — Creta.

B. iberica *Steven.* — Caucasus.

B sibirica *Pall.* — Bot. reg., tab. 487. — Sibiria.
B. altaica *Pall.* Fl. ross. II, tab. 67.

B. nitens *Schrad.* — America borealis.

B. spathulata *Schrad.* — America septentrionalis.

B. canadensis *Mill.* (non *Pursh*).— *Gray*, Gen., tab. 31. — America septentrionalis.

B. caroliniana *Loud.* — America sept.

B. Fischeri *Hort. segrez.* — America sept.?

B. lucida *Schrad?* — Iberia.

B. laxa *Hort. Booth.* — Patria ignota.
B. canadensis *Hort.* (non *Miller*).

B. amurensis *Rupr.* — Mandshuria.

B. emarginata *Hort.* (non *Willd.*).

B. cratægina *DC.* — Asia minor.
B. ilicifolia *Hort.* (non *Forst.*).

B. ætnensis *Presl.* — *Moris.* Fl. sard., tab. 5. — Sardinia.
B. macracantha *Guss.* Fl. sic.
B. cretica *Lois.* (non *Lin.*).

B. provincialis *Hort. Audib.* — Gallia merid.
B. ilicifolia *Aliq. Hort.* (non *Forst.*).

B. petiolaris *Hort.* (non *Wall.*).

B. globularis *Hort.*

B. elegans *Desf.* — Asia septentrionalis.

B. nepalensis *Hort.* (non *Spreng.*).

B. aristata *DC.* — Bot. mag., tab. 2549. — Nepalia.
B. Chitria *Hamilt.* — Bot. reg., tab. 729.
var. floribunda.
B. floribunda *Wall.*

B. asiatica *Roxb.* — *Deless.* Icon. II, tab. 1. — Himalaya.

B. tinctoria *Lesch.* — *Deless.* Icon. II, tab. 2 ; *Wight.* Ill., tab. 8. — India orientalis.
B. nepalensis *Lodd.* (non *Spreng.*).

B. Kæmpferi *Hort. segrez.*

B. Neuberti *Hort. Baum.* (Stirps hybrida ?). — Illustr. hort. I. p. 111 cum Icon.

B. actinacantha *Mart.* — Bot. reg. XXXI, tab. 55. — Magell.
var. Knightii.
B. Knightii *Hort.*

B. ruscifolia *Lamk*, Illustr., tab. 253. — America austr.
B. sulcata *Koch* et *Bouché.*
B. angustifolia *Hort.* (non *Roxb.*).
B. heterophylla *Hort.* (non *Juss.*).
B. Lycium *Hort.* (non *Royle*).
B. umbilicata *Hort.*

B. Thunbergii *DC.* — Japonia.
B. cretica *Thunb.* (non *Lin.*, nec *Lois.*).

B. Wallichiana *DC.* — *Wall.* Pl. asiat., tab. 243; Bot. mag., tab. 4656. — Nepalia.

B. Hookeri *Hort. brit.* — Illustr. hort. VI, tab. 207.
B. Jamesii *Hort.*

B. macrophylla *Hort.*
B. Wallichiana *Herincq*, L'Hort. fr. 1868, tab. 9 (non *DC.*)

B. Darwini *Hook.* Icon. plant., tab. 672. — Bot. mag., tab. 4590; Fl. des serres VII, tab. 763. — Chili.

B. dulcis *Sweet*, Flow. gard. II, tab. 100. — L'Hort. franç. 1857, tab. 11; *Paxt.* Mag. X, tab. 171. — Magell.

B. buxifolia *Lamk*, Encycl., tab. 253. — *Lodd.* Bot. cab. tab. 1941. — Magellania.
B. rotundifolia *Hort.*
B. dulcis *Hort.* (non *Sweet*).
var. nana.

B. cristata *Hort. segrez.* — Fret. Magellan.
B. buxifolia *var.* cristata *Lamk.*

B. empetrifolia *Lamk*, Encycl., tab. 253. — Bot. reg., XXV, tab. 27. — Magellania.

B. stenophylla *Hort. brit.* (Stirps hybrida?).

MAHONIA DC.

M. fascicularis *DC.*— Bot. mag., tab. 2296. — Nov. Gran.
Berberis fascicularis *Sims*, Bot. reg., tab. 762.
var. serrata.

M. Aquifolium *Nutt.* — *Paxt.* Mag. IX, tab. 5.—Amer. sept.
Berberis Aquifolium *Pursh.* — Bot. reg., tab. 1425.
var. erecta.
— stricta (macrocarpa *Hort.*).
— gracilis.
— anemonefolia.
— crassifolia.
— diversifolia.
M. diversifolia *Sweet*, Fl. gard. II, tab. 94.
— intermedia.
— rotundifolia.
— Wagneri.

M. repens *G. Don.*
Berberis repens *Lindl.* Bot. reg., tab. 1176.

M. glumacea *DC.*— *Paxt.* Mag. VII, tab. 55.— Amer. sept.
Berberis glumacea *Spreng.* — Bot. reg., tab. 1426.
var. nervosa.
Berberis nervosa *Pursh.* — Bot. mag., tab. 3949.

M. nepalensis *DC.*— *Deless.* Icon. II, tab. 4. — Nepal.
Berberis nepalensis *Spreng.*—Jard. Fleur. III, tab. 278.
B. Miccia *Hamilt.*

M. japonica *DC.* — Japonia.
M. Bealii *Herincq*, L'Hort. franç. 1855, tab. 13.
M. Fortunei *Lindl.* Journ. Hort. soc. I, p. 251.
M. intermedia *Hort.*
Berberis Bealii *Curt.* Bot. mag., tab. 4852.
var. planifolia.
Berberis Bealii *var.* planifolia *Hook.* Bot. mag., tab. 1846.

M. Sieboldi *Hort. segrez.* — Japonia.
M. japonica *Hort.* (non *DC.*).
M. Bealii *Hort.* (non *Herincq.*).
Berberis Sieboldi *Miq.* in Ann. mus. bot. bat. II, p. 69.
M. trifurca *Fort.* — *Paxt.* Fl. gard. III, fig. 258. — China sept.
M. trifoliata *Hartw.* — Mexico.
Berberis trifoliata *Lindl.* Bot. reg., XXXI, tab. 10. — Fl. des serres I, 56.
M. longifolia *Hort. segrez.* — Patria ignota.
M. Leschenaulti *Wall.* — India orientalis.
M. pallida *Benth.* — Bot. reg. XVII, tab. 11. — Mexico.
M. Ehrenbergii *Kunze.* — Mexico.
Escallonia illinita *Presl.* — Bot. reg., tab. 1900.

NANDINA Thunb.

N. denudata *Lavall.* Arb. segrez. Icon., tab. ined. — Japon.
N. domestica *var.* tenuifolia *Hort.*
var. foliis variegatis.
— minor.
— fructibus albis.
— — flavis.
N. domestica *Thunb.* — *Kæmpf.* Ic. sel. tab. 14; Bot. mag., tab. 1109; Herb. amat., tab. 281. — China et Japon.
var. purpurea.
N. domestica *var.* heterophylla *Hort.*

CAPPARIDEÆ

ISOMERIS Nutt.

I. arborea *Nutt.* — Bot. mag., tab. 3842. — California.

BIXACEÆ

AZARA Ruiz et Pav.

A. dentata *Ruiz* et *Pav.* — Bot. reg., tab. 1788. — Chili.
A. ovata *Hort.*

A. integrifolia *Ruiz* et *Pav.* — Chili.

IDESIA Maxim.

I. polycarpa *Maxim.* — Japonia.
Polycarpa Maximowiczi *Hort.*
Flacourtia japonica *Hort.*

POLYGALEÆ

POLYGALA Tourn.

P. Chamæbuxus *L.* — Bot. mag., tab. 916. — Europa.

CISTINEÆ

HELIANTHEMUM Tourn.

H. variabile *Spach.* — Europa, etc.
H. vulgare *Gærtn.* — *Sweet,* Cistineæ, tab. 34.
var. multiplex. — *Sweet,* Cist., tab. 64.

H. diversifolium *Sweet,* Cist., tab. 95. — Regio medit.
var. multiplex — *Sweet,* Cistineæ, tab. 98.

H. grandiflorum *DC.*—*Sweet,* Cist., tab. 69.—Regio medit.
var. flore pleno

H. roseum *DC.* — *Sweet,* Cist., tab. 55. — Europa merid.
var. multiplex. — *Sweet,* Cist., tab. 86.

H. virgatum *Pers.* — *Sweet,* Cist., tab. 79. — Regio medit.

CISTUS Tourn.

C. ladaniferus *L.* — Bot. mag., tab. 112; Herb. amat. IV, tab. 265 ; *Sweet*, Cist., tab. 1 et 84. — Hispania.

var. angustifolia.

Cistus angustifolius *Juss.* — *Jacq.* Hort. Vind. IV, tab. 53.

C. laurifolius *L.* — *Sweet*, Cistineæ, tab. 52. — Hispania.

MALVACEÆ

HIBISCUS Lin.

H. syriacus *L.* — Bot. mag., tab. 83 ; Nouv. Duham., tab. 27. — Syria.

Varietates hortenses multæ.

H. Hamabo *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 93. — Japonia.

PLAGIANTHUS Forst.

P. divaricatus *Forst.* — Bot. mag., tab. 3271. — Nova-Zeland.

STERCULIACEÆ

STERCULIA Lin.

S. platanifolia *L.* — *Spach*, Suites Buff., tab. 69. — China

Firmiana platanifolia *Marsigl.*

var. japonica *Sieb.*

TILIACEÆ

TILIA Lin.

SPECIES EUROPEÆ.

T. sylvestris *Desf.* — Europa.
T. parvifolia *Ehrh.* — Engl. bot., tab. 1705.
T. microphylla *Vent.* Mém. Instit. IV, tab. 1.
T. ulmifolia *Scop.*
T. europæa *var.* γ *L.*
var. pubescens.
— rosea.
— marginata alba.
— Parmentieri.
— Blechiana.

T. dasystyla *Stev.* — Tauria.
T. euchlora *C. Koch.*

T. mollis *Spach.* — Europa centralis.
T. platyphylla *Scop.* — Nouv. Duham. I, tab. 50.
T. grandifolia *Ehrh.* — *Smith,* Engl. bot., tab. 2720.
T. communis *var. Spenn.*
T. europæa *Desf.* — Fl. danica IV, tab. 553.
T. rubra *DC.*
T. hollandica *Hort.* (non *Duroi*).
var. pyramidalis.
T. pyramidalis *Host.* — *Rchb.* Fl. germ, VI, tab. 323.
— pendula.
— vitifolia.
T. vitifolia *Host.* — *Rchb.* Fl. germ. VI, tab. 319.
— corallina.
T. rubra *DC.*
T. triflora *Horn.*
— spectabilis.

T. argentea *Desf.*— *Rchb.* Fl. germ. VI, tab. 324.— Hungaria.
T. rotundifolia *Vent.* Mém. Instit. IV, tab. 4. — Nouv. Duham. I, tab. 52.
T. tomentosa *Mœnch.*
var. pendula.
— fructu oblongo.
— pannonica (depressa rosea *Hort.*).
— mandshurica.
T. mandshurica *Rupr.* et *Maxim.*

SPECIES AMERICANÆ.

T. truncata *Spach.* — Carolina.
T. pubescens *var. Vent.*
T. glabra *Vent.* Mém. Inst. IV, tab. 2. — America sept.
T. americana *L.*— *Wats.* Dendr. brit., I, tab. 45; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 1.
T. canadensis *Michx.*
T. hollandica *Durei* (non *Hort.*).
T. nigra *Barchk.*
var. mississipiensis.
T. mississipiensis *Bosc.*
— pendula.
— macrophylla.
— hybrida superba.
— longidentata (longiflora dentata *Hort.*).
T. neglecta *Spach.* — America septentrionalis.
T. laxiflora *Michx* (non *Willd.*). — Florida.
T. pubescens *Ait.* — Nouv. Duham. I, tab. 51 ; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 3.
T. leptophylla *Hort.*
T. heterophylla *Vent.* Mém. Inst. IV, tab. 5.— Amer. sept.
T. alba *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 2.
T. macrophylla *Hort.*
T. gigantea *Hort.*

ARISTOTELIA L'HÉRIT.

A. Macqui *L'Hérit.* Stirp., tab. 16. — Chili.

TERNSTROEMIACEÆ

STACHYURUS Sieb. et Zucc.

S. præcox *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 18. — Japonia.
S. japonicus *Sieb.*
var. gracilis.

TERNSTRŒMIA Lin.

T. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 80. — Japonia.
Cleyera japonica *Thunb.* (non *Sieb.* et *Zucc.*).
var. variegata.

CLEYERA Thunb.

C. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 81 (non *Thunb.*).
— Japonia.
C. ochnacea *DC.*
var. longifolia.
— variegata.

EURYA Thunb.

E. japonica *Thunb.* Fl. jap., tab. 25. — Japonia.
var. latifolia variegata.
E. latifolia *Sieb.* et *Zucc.*
— angustifolia marginata.
E. chinensis *R. Br.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1213. — China.
E. littoralis *Sieb.* et *Zucc.*

STUARTIA Lin.

S. pentagyna *L'Hérit.* Stirp. nov., tab. 74. — Bot. reg., tab. 1104. — America septentrionalis.
Malachodendron ovatum *Cav.* Diss., tab. 158.

S. virginica *Michx.* — *Cav.* Diss., tab. 159. — America sept.
S. Malachodendron *L.*
S. marylandica *Andr.* Bot. repos., tab. 73.

S. grandiflora *Sieb.* — Japonia.

GORDONIA Ell.

G. lasianthus *L.* — Bot. mag., tab., 668; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 1. — America septentrionalis.

G. pubescens *Pursh.* — Herb. amat., tab. 236; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 2. — Carolina.

CAMELLIA Lin.

C. japonica *L.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 82; Herb. amat., tab. 43-46; *Versh.* Illust. Camellia. — Japonia.
var. apucæformis *Hort. Sieb.*
— quercifolia.
Varietates hortenses multæ.

C. Sasanqua *Thunb.* Fl. jap., tab. 30. — Bot. mag., tab. 2080. — Japonia.
var. Batavia.
— oleifera.

THEA Lin.

T. chinensis *Sims*, Bot. mag., tab. 998. — China.
var. Bohea.
T. Bohea *L.* — Bot. mag., tab. 998; N. Duh. II, tab. 6.
— viridis.
T. viridis *L.* — Bot. mag., tab. 3148.

T. macrophylla *Sieb.* — Japonia.
T. assamica *Hort.*

AURANTIACEÆ

CITRUS Lin.

C. japonica *Thunb.* Ic. fl. jap., tab. 15. — China.
C. Bigaradia *var.* chinensis *Poit.* et *Riss.* — Nouv. Duham. VII, tab. 5.
C. sinensis *Riss.*
Vulg. *Kum-Kouat.*
var. spinosa *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 15.
— inermis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 15.
C. californica *Hort.*
— margarita (fructu elliptico) *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 15.
C. aurantium japonica. — Bot. mag., tab. 6128.

C. leucocarpa *Sieb.* — Japonia.

C. Daidaï *Sieb.* — Japonia.

C. myrtifolia *Ferr.* Hesp. tab. 433, fig. 2. — China.
C. Bigaradia *var.* myrtifolia *Poit.* et *Riss.*, tab. 50.
C. sinensis *Hort.* (non *Riss.*).
Vulg. *Oranger à feuilles de Myrte.*

C. nobilis *Lour.* — *Andr.* Bot. repos. IX, tab. 608. — China.

C. deliciosa *Ten.* Mem. Oranc. Mandarina, et Ind. sem. hort. Nap. 1840. — China.
Vulg. *Mandarine.*

C. Aurantium *Risso*, Orang., tab. 3-29. — Nouv. Duham. VII, tab. 35, fig. 3. — China meridionalis.
Vulg. *Oranger.*
Varietates numerosæ.

C. Limonium *Risso*, Orang., tab. 70-95. — Nouv. Duham. VII, tab. 28. — China meridionalis.
Vulg. *Citronnier.*
Varietates numerosæ.

C. medica *Risso*, Orang., tab. 96-107. — Nouv. Duham., tab. 22-24. — China meridionalis.
Vulg. *Cédratier*.
Varietates numerosæ.

C. bigaradia *Risso*, Orang., tab. 30-52. — Nouv. Duham. VII, tab. 30-39. — China meridionalis.
Vulg. *Bigaradier*.
Varietates numerosæ.

PSEUDÆGLE Miq.

P. sepiaria *Miq.* — Japonia.
Ægle? sepiaria *DC.*
Citrus trifoliata *L.* — Ssi *Kæmpf.* Amœnit. p. 801.
C. triptera *Desf.* — Rev. hort. 1869, cum Icon.

HYPERICINEÆ

ANDROSÆMUM All.

A. officinale *All.* — Bot. mag., tab. 127; Engl. bot., tab. 1225. — Europa borealis.
Hypericum Androsæmum *L.* — *Curt.* Lond. bot. II, tab. 127.
H. elatum *Hort.* (non *Ait.*).
H. Caprifolium *Hort.* (non *Boiss.*).
H. Webbii *Hort.* (non *Spach*).
H. orientàle *Hort.* (non *Lin.*).

HYPERICUM Lin.

H. calycinum *L.* — Bot: mag., tab. 146. — Oriens.
H. balearicum *Hort.* (non *Lin.*).

H. elatum *Ait.* — *Juss.* Ann. Mus. III, tab. 17; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 85. — America borealis.

H. hircinum *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 64; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 86; Nouv. Duham. VI, tab. 28. — Europa meridionalis.

H. elatum *Hort.* (non *Ait.*).

var. minor.

— stricta.

H. strictum *Hort.* (non *Humb.* et *Bonpl.*).

— fol. variegatis.

H. prolificum *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 643; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 88. — America sept.

H. Kalmianum *Hort.* (non *Lin.*).

H. rosmarinifolium *Hort.* (non *Lamk.*).

H. Kalmianum *L.* — *Torrey*, Fl. New-York, tab. 13. — America septentrionalis.

H. Gumbletoni *Hort. segrez.* — Japonia?

H. patulum *Hort.* (non *Thunb.*). — Rev. hort. 1875, p. 170, cum Icon.

H. nepalense *Hort.* (non *Choisy*).

H. uralum *Don.* — Bot. mag., tab. 2375. — Nepalia.

H. uralense *Hort.*

H. oblongifolium *Chois.* Hyper., tab. 4. — *Wall.* Pl. asiat., tab. 244. — Nepalia.

H. multiflorum *Sieb.* — Japonia.

H. japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 31. — *Royle*, Illust., tab. 24. — Japonia.

H. monogynum *L.* — Bot. mag., tab. 334. — China.

H. aureum *Lour.*

H. chinense *Lamk.*

var. salicifolia.

H. salicifolium *Sieb.* et *Zucc.*

ACERINEÆ

ACER Tourn.

§. 1. FLORIBUS RACEMOSIS.

A. tataricum *L.* — *Pallas* Fl. ross., tab. 3; Nouv. Duham. IV, tab. 9; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 160; *Reich.* Fl. germ. V, tab. 162. — Tataria.

var. Ginnala (laciniata). — Regio amur.

A. Ginnala *Maxim.*

A. glabrum *Torr.* — America occidentalis.

A. pensylvanicum *L.* — *Tratt.* Arch. I, tab. 11, (non *Duroi*). — America sept.

A. canadense *Duham.* Arb. I, tab, 12.

A. striatum *Lamk.* — *Michx. fil.* Arb. amer. II, tab. 17.

A. hybridum *Bosc.* — *Lodd.* Bot. cab., tab., 1221.

A. tegmentosum *Maxim.* — Regio amur.

A. spicatum *Lamk.* — America septentrionalis.

A. montanum *Ait.* — *Tratt.* Arch. I, tab. 13.

A. pensylvanicum *Duroi* Arb. tab. 2 (non *Lin*).

A. Pseudo-Platanus *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 36; Fl. danica IX, tab. 1575. — Europa.

A. montanum *Lamk.* (non *Ait.*).

Vulg. *Erable Sycomore.*

var. trilobata.

— opulifolia (non A. opulifolium *Vill.*).

— purpurea (rubra). — Belg. hort. XVIII, cum Ic.

— Leopoldi. — Illustr. hort. XI, tab. 411.

— erythrocarpa. — Rev. hortic. 1864, cum Ic.

— tricolor.

— aureo-variegata.

— jaspidea.

A. macrophyllum *Pursh.* — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 38. *Nutt.* North-Am. sylv., tab. 67. — America borealis.

A. campestre *L.* — *Guimp.* Holz.; tab. 213; Fl. danica VIII, tab. 1288. — Europa.

var. austriaca.

A. austriacum *Tratt.* Arch., tab. 36; *Guimp.* Holz., tab. 212.

— taurica.

— hebecarpa.

— heterocarpa.

— leiocarpa (collina).

— pulverulenta.

— suberosa.

— variegata.

A. hyrcanum *Fisch.* et *Mey.* — Caucasus.

§. II. FLORIBUS CORYMBOSIS FASCICULATISVE.

A. Opalus *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 171; *L'Hérit.* Stirp. II, tab. 98; *Reich.* Fl. germ. V, tab. 163. — Gallia meridionalis.

A. rotundifolium *Lamk.*

var. villosa.

A. villosum *Presl.* (non *Wall.*).

A. coriaceum *Bosc.* — Patria ignota.

A. opulifolium *Vill.* — *Gaud.* Fl. helv. VII, tab. 3; *Tratt.* Arch. tab. 43. — Gallia merid.

A. hispanicum *Pourr.*

A. obtusatum *Kit.* — *Tratt.* Arch., tab. 44. — Hungaria.

A. neapolitanum *Ten.* Fl. nap., tab. 100. — Italia.

A. lætum *C. A. Mey.* — Caucasus.

A. colchicum *Hartw.*

A. ætnense *Hort.*

var. rubra.

A. Mono *Maxim.* — Regio amur.

A. lætum parviflorum *Reg.* (non *C. A. Mey.*).

A. circinnatum *Pursh.* — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 39; *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 68. — America sept.

A. creticum *Tourn.* — *Tratt.* Arch., tab. 45. — Creta.
A. trilobatum *Lamk.*
A. obtusilobum *Sibth.* Fl. græc., tab. 391.

A. monspessulanum *L.* — *Tratt.* Arch., tab. 46. — Europa merid. et Austria.

A. ibericum *M. Bieb.* — Iberia.

A. barbatum *Michx.* — Carolina.
A. carolinianum *Walt.*

A. platanoides *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 10. fig. 1; *Tratt.* Arch., tab. 34. (non *Tausch.*). — Europa.
Vulg. *Erable plane.*
var. lactescens.
— palmatifida (dissecta).
A. palmatifidum *Tausch.*
— laciniata *DC.*
A. crispum *Lauth.* — *Tratt.* Arch., tab. 5.
— Schwerdlerii.

A. Lobelii *Ten.* Fl. napol., tab. 199. — Italia meridionalis.
A. platanoides *var. Tausch.* (non *Tratt.*).

A. saccharinum *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 15; — Nouv. Duham. III, tab. 8. — America sept.

A. nigrum *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 16. — Carolina.

A. eriocarpum *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 12. — Amer. sept.
A. dasycarpum *Willd.* — *Tratt.* Arch., tab. 38.
A. rubrum *var.* pallida *Ait.*
A. glaucum *M. Bieb.*
A. rubrum *Lamk.* (non *Lin.*).
A. tomentosum *Hort.*
var. Wagneri (laciniata). — Rev. hort. 1868, cum Ic.

A. rubrum *L.* (non *Lamk.*). — *Michx fil.*, Arb. amer. II, tab. 14. — America septentrionalis.

A. coccineum *Hort.*

var. sanguinea.

A sanguineum *Spach.* — Rev. hort. 1867, cum Ic.

A. rubrum *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 169, (non *Lin.*)

— pendula.

— tomentosa.

A. fulgens *Hort.*

§. III. SPECIES JAPONICÆ.

A. japonicum *Thunb.* Icon. jap., tab. 20. — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 144.

A. cratægifolium *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 157.

A. trifidum *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 153.

A. micranthum *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 151.

A. pictum *Thunb.* Ic. Fl. jap., tab. 43.

A. pulchrum *Maxim.*

A. rufinerve *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 148.

A. polymorphum *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 155-156.

var. dissecta.

A. dissectum *Thunb.* Ic. Fl. jap, tab. 45. — Illustr. hort. XIV, tab. 523.

— palmata.

A. palmatum *Thunb.* Ic. Fl. jap., tab. 43. — Fl. des serres XII, tab. 1273.

— palmata foliis rubris. — Fl. des serres XII, tab. 173.

A. polymorphum atropurpureum *Hort.*

— palmata foliis sanguineis. — Illustr. hort. XIV, tab. 156.

— — foliis crispis. — Illustr. hort. XVII, tab. 43.

— septemloba (versicolor *Van Htte*) Fl. des ser. XIV, tab. 1498.

A. septemlobum *Thunb.*

— ornata. — Illustr. hort. XVII, tab. 46.

A. ornatum *Carr.* Rev. hort. 1867, cum Ic.

A. hederæfolium *Sieb.*

NEGUNDO Mœnch.

N. fraxinifolium *Nutt.* — America septentrionalis.
N. aceroides *Mœnch.*
Acer Negundo *Michx fil.*, Arbr. amer. II, tab. 18 : — Nouv. Duham. III, tab. 7; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 172.
var. crispa.
— laciniata.
— variegata. — Fl. des serres XVII, tab. 1781.
— violacea.

N. californicum *Torr.* — *Hook.* Beech., tab. 77; *Nutt.* North-Am. sylv., tab. 72. — California.
Acer californicum *Hort.*

N. cissifolium *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Acer cissifolium *C. Koch.*

HIPPOCASTANEÆ

ÆSCULUS Lin.

Æ. Hippocastanum *L.* — *Clus.* Hist., p. 8, cum Icon.; *Reich.* Fl. germ. V, tab. 161. — Græcia.
Vulg. *Marronnier d'Inde.*

var. pyramidata.
— nana.
Æ. pumila *Aliq. Hort.*
— pendula.
Æ. pumila pendula *Hort.*
— crispa.
— digitata.
— laciniata (heterophylla).
Æ. incisa *Hort.*
— dissecta (aspleniifolia.)
— Memmingeri.
var. præcox.
— serotina.
— marginata.
— variegata.
— flore pleno. — Illustr. hort. II, tab. 59.
— pavioides.
— fructu eduli.
— spectabilis.
— nigra.
— procera.

Æ. rubicunda *Lois.* — *DC.* Pl. rar. Genev., tab. 24 ; Herb. amat., tab. 367 (non *Lodd.*). — Patria ignota.
Æ. carnea *Willd.* (non *Wats.*). — Bot. Reg., tab. 993.
var. nana.
— tortuosa.
— pubescens.
— marginata.
— heterophylla foliis aureis.
— variegata.
— flore albo.
— — purpureo.

Æ. carnea *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 121 (non *Willd.*). — *Sweet* Fl. gard. série 4, I, tab. 301. — Amer. sept.
Æ. rubicunda *Lodd.* Bot. cab., tab. 1242 (non *Loisel.*).

Æ. glabra *Willd.* — *Gray* Gen. tab. 176. — America sept.
Pavia glabra *Spach.*
var. pallida.
Æ. pallida *Willd.* — *Guimp.* Holzg., tab. 95.
Pavia pallida *Spach.*
— ohiotensis.
Æ. ohiotensis *Michx.* — Bot. reg. XIV, tab. 51.
Pavia ohiotensis *Michx fil.*, Arb. amer. II, tab. 29.
— ohiotensis aspera.

Æ. chinensis *Bunge.* — China borealis.

Æ. indica *Wall.* — *Brand.* Ill. for. Ind., tab. 19. — Ind. orient.
Pavia indica *Camb.* in *Jacquem.* voy., tab. 35.

Æ. flava *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1280 ; *Wats.* Dendr. brit., tab. 1634. — America sept.

SPECIES VEL VARIETATES DUBIÆ.

Æ. (Pavia) **marylandica** *Hort.*
Æ. (Pavia) **dubia** *Hort.*
Æ. (Pavia) **canadensis** *Hort.*

PAVIA Bœrh.

P. neglecta *Spach.* — Patria ignota.
Æsculus neglecta *Lindl.* Bot. reg., tab. 1009.

P. flava *DC.* — America septentrionalis.
P. lutea *Poir.* — Nouv. Duham. III, tab. 38.
Æsculus flava *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1280; *Wats.* Dendr. brit., tab. 163.
Æ. lutea *Wangenh.* Act. nat. scienc. Berol. VIII, tab. 6.

P. livida *Spach.* — Patria ignota.

P. hybrida *DC.* — Patria ignota.

P. versicolor *Spach.* — Patria ignota.
Æsculus Pavia *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 163, (non *Duham*, nec *Michx*).

P. discolor *Pursh.* — America septentrionalis.
Æsculus discolor *Lindl.* Bot. reg., tab. 310.

P. atropurpurea *Spach.* — America septentrionalis.
Æsculus Pavia *var.* sublaciniata *Wats.* Dendr. brit., tab. 120 (non Æ. Pavia *Willd.*).

P. Lindleyana *Spach.* — America sept.
Æsculus Pavia *var.* arguta *Lindl.* Bot. reg., tab. 993.

P. Willdenowiana *Spach.* — Patria ignota.
Æ. Pavia *Duham.* Arb. II, tab. 19 (non *Wats.*, nec *Michx*).
var. Lyonii.
Æ. Lyonii *Loud.*
— sanguinea.
Æ. Whitleyi *Hort.*

P. humilis *Spach.* — America sept.?
Æ. humilis *Lodd.* — Bot. reg., tab. 1018.

P. lucida *Spach.* — Patria ignota.

P. Michauxii *Spach*, Suites Buff., tab. 18. — America sept.
P. rubra *Lamk.* Enc., tab. 273. — N. Duh. III, tab. 19.
Æ. Pavia *Michx* (non *Duham.*, nec *Wats.*).

MACROTHYRSUS Spach.

M. discolor *Spach*, Suites Buff. — Georgia.
Æsculus parviflora *Walt.*
Æ. macrostachya *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 9. — Bot. mag., tab. 2118.
Pavia macrostachya *DC.* — Herb. amat. III, tab. 212.
P. edulis *Poit.* Arb. fruit., tab. 88.

CALOTHYRSUS Spach.

C. californica *Spach*, Suites Buff. — California.
Æsculus californica *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 64; Rev. hort. 1855, Icon.; Belg. hort. IX, tab. 121.

UNGNADIA Endl.

U. speciosa *Endl.* Atakta, tab. 36.—Fl. des serres X, t. 1076; L'hort. franç. 1865, tab. 15. — America sept.

SAPINDACEÆ

KŒLREUTERIA Laxm.

K. paniculata *Laxm.* Nov. Comm. Petr. 16, tab. 18; — Nouv. Duham., tab. 36; Bot. reg., tab. 320. —China.
K. japonica *Sieb.* — Japonia.
K. paniculata *var.* japonica *Hort.*

XANTHOCERAS Bnge.

X. sorbifolia *Bnge.* — Fl. des serres XVIII, tab. 1889. — China septentrionalis.

SAPINDUS Lin.

S. Mukorossi *Gærtn.* Fr. I, tab. 70. — Japonia.

MELIACEÆ

MELIA Lin.

M. Azedarach *Cav.* Diss. VII, tab. 207. — Bot. mag., tab. 1066. — Asia.

M. japonica *G. Don.* — Japonia.

CEDRELA Lin.

C. sinensis *A. Juss.* — China.

Ailanthus flavescens *Carr.* Rev. hort. 1865 p. 364, cum Icon.

AMPELIDEÆ

AMPELOPSIS Michx.

A. cordata *Michx.* — America borealis.

Vitis indivisa *Willd.*

A. hederacea *DC.* — America borealis.

Vitis hederacea *Willd.*

var. himalayca.

— major.

A. quinquefolia *Michx.* — *Gray*, Gen., tab. 162. — America borealis.

var. hirsuta.

A. hirsuta *Don.*

— macrophylla.

— pubescens.

Vitis pubescens *Hort.* (non *H. B. K.*).

— rotundifolia.

A. bipinnata *Michx.* — Carolina.
Vitis arborea *Willd.*
var. minima.
A. serjaniæfolia *Bnge.* — Asia septentrionalis.
Cissus viticifolia *Sieb.* et *Zucc.*
Ampelopsis napæformis *Carr.* Rev. hort. 1870, fig. 3.
A. tuberosa *Carr.* Rev. hort. 1870, p. 17, fig. 2.
A. aconitifolia *Bnge.* — China borealis.
A. tripartita *Carr.*
A. triloba *Carr.*
A. lucida *Carr.*
A. palmiloba *Carr.*
var. dissecta.
A. dissecta *Carr.*
Vitis dissecta *Hort.* — The Gard., 1874, p. 523, cum Ic.
— affinis (dissectæ affinis).

VITIS Lin.

SPECIES AUSTRALASICÆ.

V. antarctica *Benth.* — Australia.
Cissus antarctica *Vent.* Choix, tab. 21.

SPECIES ASIATICÆ.

V. japonica *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Cissus japonica *Willd.*
V. biternata *Hort. segrez.* — Asia minor.
Cissus orientalis *Lamk.* Ill., tab, 84; — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 113.
V. vinifera *L.* — *Duham.* Arbr. fruit. II, tab. 61. — Asia min.
var. laciniosa *Schmidel.* Icon., tab. 8.
V. laciniosa *L.*
V. apiifolia *Hort.*
Vulgo *Cioutat.*

V. vinifera.
var. italica.
— variegata.
Varietates hortenses multæ.
V. amurensis *Maxim.* — China borealis.
V. flexuosa *Thunb.* — Japonia.
V. indica *Thunb.*
V. nepalensis *Hort.*
V. parvifolia *Roxb.* — Japonia.
V. heterophylla *Thunb.* (non *Poir.*, nec *Wall.*). — Japonia.
Ampelopsis heterophylla *Sieb.* et *Zucc.*
Cissus Davidiana *Carr.* Rev. hort. 1868-69.
C. acutiloba *Carr.*
C. pinnata *Carr.*
C. major *Carr.*
var. integra.
V. humulifolia *Bnge.*
V. rubra *Carr.* (non *Desf.*).
V. intermedia *Carr.*
V. platanifolia *Carr.*?
Cissus humulifolia *Maok.* Tent. fl. ussur., tab. 3.
V. ficifolia *Bnge.* — Japonia.
V. Labrusca *Thunb.* (non *Lin.*).
V. mollis *Carr.*
var. Sieboldi.
V. Sieboldi *Van-Htte.*
— Thunbergii.
V. Thunbergii *Sieb.* et *Zucc.*—*Reg.* Gartenfl., tab. 424.
V. inconstans *Miq.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icon., tab. ined. — Japonia.
V. Roylei *Hort.*
Ampelopsis tricuspidata *Sieb.* et *Zucc.*
V. Weitchi *Hort. segrez.* — Asia septentrionalis.
V. Roylei *Aliq. Hort.*
Ampelopsis tricuspidata *var.* Weitchi *Aliq. Hort.*

SPECIES AMERICANÆ.

V. caribæa *DC.* — *Sloane.* Jam. II, tab. 210. — Florida.
var. coriacea.
V. candicans *Engelm.* — Texas.
V. Labrusca *L.* — *Jacq.* Schœnb., tab. 426; *Gray.* Gen., tab. 161. — America septentrionalis.
var. integrifolia.
V. cordifolia *Hort* (non *Michx*).
— palmata.
V. palmata *Lecomte* (non *Vahl.*).
— tiliæfolia.
V. tiliæfolia *Willd.* (non *H. B. K.*).
V. æstivalis *Michx.* — America septentrionalis.
V. virginiana *Hort. Paris.*
V. cordifolia *Michx*, (non *Hort.*). — America sept.
V. vulpina *L.* — *Jacq.* Schœnb., tab. 425.
var. Solonis.
V. Solonis *Hort.*
— riparia.
V. riparia *Michx.* — Bot. mag., tab. 2429.
V. odoratissima *Don.*
V. monticola *Beekley.* — Tesax.
var. rupestris.
V. rupestris *Scheete* Linnæa, XXI, p. 591.
V. rubra *Desf.* — America septentrionalis.
V. rotundifolia *Michx.* — America septentrionalis.
V. vulpina *Torr.* et *Gr.* (non *Lin.*).

VARIETATES AMERICANÆ (1).

§. I. *Var.* **Vitis Labruscæ :**

Black macer	fruct.	nigris.	Cambys August,	fruct.	nigris.
Bracut Amber	—	rubris.	Catawba	—	rubris.

(1) Des boutures de ces vignes ont été envoyées en 1868, de Washington; elles proviennent de la collection réunie par les soins du département de l'Agriculture du gouvernement des Etats-Unis.

Var. **Vitis labruscæ:**

Cheowa	fruct.	rubris.	Logan.	fruct.	nigris.
Christine	—	nigris.	London's Early	—	»
Cloanthe	—	»	Loomis	—	»
Columbia	—	»	Louisa	—	»
Concord	—	»	Mary Ann	—	rubris.
Creveling	—	»	Miller's Isabella	—	nigris.
Cuyahogo	—	albis.	Nothern muscadine	-	»
Diana	—	rubris.	Ottinger	—	»
Hammille	—	nigris.	Perkins	—	rubris.
Hartford prolific	—	»	Salluda	—	nigris.
Hydes Elisa	—	»	Telegraph	—	»
Iona	—	rubris.	To Kalon	—	rubris.
Isabella	—	nigris.	Union village	—	nigris.
Ives seedling	—	»	Wilders nº 6	—	»
Little geant	—	»	Woodbury	—	»

§. II. *Var.* **Vitis viniferæ :**

Clara	fruct.	albis.	Kilmington	fruct.	albis.

§. III. *Var.* **Vitis æstivalis :**

Boldwin's Lenoir	fruct.	nigris.	Herbemont	fruct.	nigris.
Purple favorite	—	»			

§. IV. *Var.* **Vitis cordifoliæ :**

Alwez	fruct.	nigris.	Oporton	fruct.	nigris.
Clinton	—	»	Taylor's Bullett	—	albis.
Gusmann	—	»			

Alt. variet. americanæ.

Alexandrina	Hetgella
Franklin	Reginia.

Var. **Vitis incertæ :**

Delaware fruct. rubris.

RUTACEÆ

RUTA Tourn.

R. graveolens *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 61. — Europa austr.
var. variegata.

ZANTHOXYLEÆ

ZANTHOXYLUM L'Hérit.

Z. fraxinifolium *Willd.* — Nouv. Duham. VII, tab. 2; *Spach*, Suites Buff., tab. 13. — America sept.
Z. fraxineum *Hort.*

Z. schinifolium *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

Z. planispinum *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

Z. piperitum *DC.* — *Maxim.* Decas IX, p. 3. — Japonia.
Fagara piperita *Thunb.*

PHELLODENDRON Rupr.

P. amurense *Rupr.* — *Maxim.* Pr. fl. Amur., tab. 4. — Amur.

P. japonicum *Maxim.* Dec. IX. — Japonia.
Phellodendron species *Hort. Van-Htte.*

PTELEA Lin.

P. trifoliata *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 84 ; Nouv. Duham. I, tab. 57. — America septentrionalis.
var. heterophylla.
— persicifolia.
— glauca.
— pubescens.
— foliis variegatis.

CNEORUM Lin.

C. tricoccum *L.* — *Jaume St-Hil.* Fl. fr., tab. 5.—Eur. mer.

AILANTHUS Desf.

A. glandulosa *Desf.* Act. Ac. par. 1786, tab. 8. — *L'Hérit.* Stirp., tab. 84; Nouv. Duham. I, tab. 35. — China.
var. macrophylla.
— purpurascens.

SKIMMIEÆ

SKIMMIA Thunb.

S. japonica *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 68; *Lem.* Illustr. hort., tab. 18; Fl. des serres VII, p. 39. Icon. xylogr. -- Japonia.
— fœmina.
— mascula.
S. Laureola *Sieb.* et *Zucc.* — Nepalia.
S. Limonia *DC.* — *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 245. — India.
S. oblata *Lindl.* — Japonia.
— fœmina.
— mascula (fragrans).
var. floribus albis.
— — roseis.
— variegata.
S. ovata *Hort.*

CORIARIEÆ

CORIARIA Lin.

C. myrtifolia *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 73. — Europ. merid.
var. rubricaulis.

STAPHYLEACEÆ

STAPHYLEA Lin.

S. trifolia *L.* — *A. Gray* Genera, tab. 172. — Amer. boreal.
S. pinnata *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 210; Engl., bot. 1560. — Europa australis.
S. colchica *Steud.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icon., tab. ined. — Asia occidentalis.
var. parviflora.
S Bumalda *Thunb.*— *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 95; *Deless.* Ic. III, tab. 51. — Japonia.

EUSCAPHIS Sieb. et Zucc.

E. staphyleoides *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 67. — Japon.
Sambucus japonica *Thunb.*

CELASTRINEÆ

EVONYMUS Lin.

E. europæus *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 131. — Europa.
var. atropurpurea.
E. atropurpureus *Hort.* (non *Jacq.*).
— latifolia (virens).
E. purpureus *Hort.*
— ovata.
— variegata.
— pallida.
— ardens.
— aucubæfolia.
— leucocarpa (fructu pallido).
— nana pumila.
— monstrosa.

E. Maakii *Rupr.* — Regio amur.

E. Hamiltonianus ? *Wall.* — Nepalia.

E. atropurpureus *Jacq.* Hort. vind. II, tab. 120. — Amer. bor.

E. macrocarpus *Hort.*

E. americanus *Hort.* (non *Lin.*).

E. americanus *L.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1322. — Amer. sept.

var. pendula.

E. obovatus *Nutt.*

E. sarmentosus *Loud.*

E europæus pendulus *Hort.*

E. verrucosus *Scop.* — *Jacq.* Fl. austr., tab. 49. — Austria.

E. alatus *Thunb.* — *Reg.* Tent. fl. ussur. tab. 7. — Japonia.

E. Thunbergianus *Blume.*

E. amurensis *Hort.*

Celastrus alatus *Thunb.* Ic. jap., tab. 33.

E. angustifolius *Pursh.* — Georgia.

E. rosmarinifolius *Hort.*

var. repens.

E. nanus *M. Bieb.* (non *Hort.*). — Caucasus.

var. pulchella.

E. linifolius *Hort.*

E. japonicus *Thunb.* — *Kæmpf.* Icon. jap., tab. 8.; Bot. reg., tab. 6. — Japonia.

var. macrophylla.

— latifolia.

— punctata.

— flavescens.

— variegata.

— tricolor.

— foliis albo-marginatis.

— calamistrata.

— microphylla.

Eurya microphylla *Hort.*

E. ovatus? *Wall.* — India orientalis.
var. foliis medio-pictis.
— — marginatis.
E. radicans *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
E. japonica crispa *Hort.*
var. viridis.
— foliis pictis.
E. gracilis *Sieb.* — Japonia.
E. radicans *Hort.* (non *Sieb.* et *Zucc.*).
var. foliis argenteis.
— — roseo-marginatis.
E. fimbriatus *Wall.* — India orientalis.

CELASTRUS Lin.

C. scandens *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 95. — Amer. sept.
C. punctatus *Thunb.* — Japonia.
C. Orixa *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Evonymus japonicus *Hort.* (non *Thunb.*).
C. paniculatus *Willd.* — *Wight*, Illustr., tab. 72.— Japon.

ILICINEÆ

ILEX Lin.

I. latifolia *Thunb.* — Bot. mag., tab. 5597. — Japonia.
I. macrophylla *Blume.*
var. Tarajo.
I. Tarajo *Sieb.*
I. chinensis *Sims*, Bot. mag., tab. 2043. — China.
I. cornuta *Lindl.* et *Paxt.* Flow. gard. I, p. 43, fig. 27. — Bot. mag , tab. 5059; Fl. des serres IX, tab. 895. — China septentrionalis.
var. furcata.
I. furcata *Fortune.*
— obtusata.
— minor.

I. Fortunei *Hort.* — Japonia.

I. dipyrena *Wall.* Pl. asiat., tab. 292. — *Brand.* Illustr. for. India, tab. 15. — China sept.

var. Cunninghami.

I. Cunninghami *Hort.*

I. crenata *Thunb.* — Japonia.

Ilex Fortunei crenata *Hort.*

var. latifolia.

— longifolia.

— rotundifolia aureo-variegata.

— foliis variegatis.

I. microcarpa *Lindl.* et *Paxt.* Flow. gard. I, p. 43, fig. 28. — China septentrionalis.

I. rotunda *Thunb.* — Japonia.

I. japonica *Hort.* (non *Thunb.*).

I. Bessoni ? *Hort.*

I. purpurea *Hassk.* — Asia.

Symplocos japonica *Hort.* (non *DC.*).

I. vomitoria *Ait.* — America borealis.

I. floridana *Lamk.* Illustr., tab. 1731.

I. religiosa *Bart.*

I. Dahoon *Walt.* — America septentrionalis.

I. Cassine *Willd.* Hort. ber. I, tab. 31 (non *Ait.*).

I. phyllireifolia *Hort.*

var. laurifolia.

I. laurifolia *Nutt.* (non *Hort.*).

I. Cassine *Ait.* — Nouv. Duham. I, tab. 3. — Carolina.

I. caroliniana *Mill.*

I. laurifolia *Hort.* (non *Nutt.*).

I. cassinoides *Lindl.*

I. castaneæfolia *Hort.*

I. serrata *Thunb.* — Japonia.

I. microphylla *Sieb.* — Japonia.

I. Doniana *DC.* — Nepalia.
I. elliptica *Don.*
I. nepalensis *Dietr.*
var. purpurea.
I. elliptica purpurea *Hort.*
I. leptocantha *Hort.*
I. magellanica *Loud.* — Magellania.
I. opaca *Ait.* — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 11. — Pensylv.
var. prinifolia.
I. prinifolia *Hort.*
I. Perado *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 549. — Madera.
I. maderensis *Lamk.* (non *Willd.*).
I. platyphylla *Webb* et *Bert.*
var. nana (maderensis nana).
I. balearica *Desf.* — Insula minorca.
I. maderensis *Willd.* (non *Lamk.*).
I. aquifolium *var.* β *Lamk.*
var. elegans.
I. Aquifolium *L.* — Nouv. Duham. I, tab. I. — Europa.

Varietates hortenses.

var. Altaclarense.
— angustifolia inermis.
— atrovirens.
— — marginata alba.
— — marginata aurea.
— aurea.
— — medio-picta. — Gard. chron. 1876, p. 78, cum Ic.
— — Auran — Gard. chron. 1876. p. 616, cum Ic.
— — picta latifolia. — Gard. chron. 1876, p. 365, cum Ic.
— — regina. — Gard. chron. 1876, p. 44, cum Ic.
— bicolor.
— calamistrata.
— — variegata.

I. Aquifolium.

var. camelliæfolia, — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
— ciliata minor.
— — aurea. — Fl. des serres, XVII, tab. 1811.
— compacta marginata aurea.
— Cookii. — Gard. chron. 1876, p. 437, cum Icon.
— crassifolia. — Gard. chron. 1874, p. 751, cum Ic.
— Doningtonensis — Gard. chron. 1874. p. 687, cum Ic.
— excortica.
— ferox.
— — argentea. — Gard. chron. 1876, p. 44, cum Ic.
— — aurea. — Gard. chron. 1876, p. 616, cum Icon.
— — — albo-marginata.
— — — aureo-variegata.
— flammea argentea.
— — aurea.
— — aureo longifolia.
— foliis aureo-marginatis.
— fructu luteo.
— fulhamensis.
— grandifolia. — Gard. chron. 1874, p. 432, cum Ic.
— harringtoniensis fol. aureo marginatis.
— heterophylla. — Gard. chron. 1874, p. 519, cum Ic.
— Hodkensoni.
— hybrida.
— integrifolia. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
— intermedia fol. aureis.
— latifolia. — Gard. chron. 1874, p. 435, cum Ic.
— latispina. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
— laurifolia.
— — aurea nana.
— — foliis argenteis.
— — foliis aureis. — Gard. chron. 1876, fig. 51.
— — sulphurea. — Gard. chron. 1876, fig. 51.

I. Aquifolium.

var. Lechtentali.
— lutescens.
— maculata.
— Madame Briot.
— marginata alba. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
— — aurea.
— myrtifolia.
— — aurea. — Gard. chron. 1876, p. 365, cum Ic.
— monstrosa. — Gard. chron. 1874, p. 751, cum Icon.
— nigricans.
— — marginata aurea.
— nobilis. — Gard. chron. 1874, p. 433.
— — foliis aureis.
— pendula.
— — argentea.
— provincialis.
— pumila marginata aurea.
— punctata.
— pyramidalis.
— recurva. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Icon.
— regina Victoria.
— rigida.
— rubricaulis aurea.
— scotica. — Gard. chron. 1874, p. 873, cum Ic.
— senescens.
— serratifolia. — Gard. chron. 1874, p. 687, cum Icon.
— — albo-marginata. — Gard. chron. 1876, p. 305.
— — argentea.
— — aurea.
— — latifolia aurea.
— — — variegata.
— Watereriana. — Gard. chron. 1876, fig. 49.
— Whittingtonensis. — Gard. chron. 1874, p. 687, cum Ic.

NEMOPANTHES Rafin.

N. canadensis *DC.* Pl. rar., tab. 3. — Amer. borealis.
Ilex canadensis *Michx* Fl. bor. amer., tab. 49.

PRINOS Lin.

P. verticillata *L.* — *Duham.* Arb., tab. 23. — Amer. sept.
P. lævigata *Pursh.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 28. — America septentrionalis.
P. lanceolata *Pursh.* — America septentrionalis.
P. glaber *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 54; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 27. — America septentrionalis.
P. prunifolia *Desf.* — Patria ignota.
P. glauca *Hort. segrez.* — Patria ignota.

RHAMNEÆ

ZIZYPHUS Tourn.

Z. vulgaris *Lamk.* Encycl., tab. 185. — Europa australis.
Z. sativa *Desf.* — Nouv. Duham., tab. 16.
Z. sinensis *Lamk*, — China.
Z. Jujuba *L.* — *Brand.* Illustr. for. India, tab. 17. — Asia.

PALIURUS Tourn.

P. aculeatus *Lamk.* — Nouv. Duh. III, tab. 210. — Eur. austr.
P. australis *Gærtn.* Carpol., tab. 43.
P. virgatus *Don.* — Bot. mag., tab. 2585. — Japonia.
P. lucidus *Hort.*

BERCHEMIA Neck.

B. volubilis *DC.* — *Gray* Gen., tab. 650. — Amer. sept.
Rhamnus volubilis *L.* — *Jacq.* Ic., tab. 339.
Zizyphus volubilis *Willd.*

RHAMNUS Lamk.

R. oleifolius *Hoock.* Fl. bor. amer. tab. 44. — America sept.

R. Alaternus *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 14. — Eur. austr.

var. balearica.

R. rotundifolius *Dum. Cours.*

— hispanica.

R. monspeliensis *Hort.*

— latifolia.

— angustifolia.

R. Clusii *Willd.*

— robusta.

— foliis aureis.

R. hybridus *L'Hérit.*

R. sempervirens *Hort.*

R. subsempervirens *Hort.*

R. americanus *Hort.*

var. Billardi.

R. Billardi *Hort.*

R. ovalifolius *Hort.*

R. californicus *Eschsch.* — California.

R. oleifolius *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 44.

R. pedunculatus *Hort.*

R. intermedius *Carr.* Rev. hort. 1868 (non *Maxim.*).

R. latifolius *L'Hérit.* Sert. angl., tab. 8. — Bot. mag., tab 2663. — Insulæ azoricæ.

var. cucullatus.

R. Frangula *L.* — Nouv. Duham., tab. 13. — Europa.

Vulg. *Bourgène.*

R. alpinus *L.* — Nouv. Duham., tab. 13; *Lodd.* Bot. cab., tab. 1077. — Europa.

var. major.

R. alnifolius *L'Hérit.* — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 42. — America septentrionalis.
R. americanus *Aliq. Hort.*

R. libanoticus *Boiss.* — Asia occidentalis.
R. imeretiæ *Hort.*
R. castaneifolius *Hort.*

R. utilis *Dcne.* Compt. rend. acad. 1857, cum Icon. — China.
R. viridis *Hort.*
R. dahuricus *Hort.* (non *Pall.*).
R. japonicus *Hort.*

R. chlorophorus *Dcne.* Compt. rend. 1857, cum Ic. — China.

R. bapticus *Dcne.* Compt. rend. 1857. — Asia sept.

R. salicifolius *Hort. segrez.* — Patria ignota.

R. catharticus *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 10. — Europa

R. intermedius *Maxim.* (non *Carr.*). — Canada.
R. rupestris *Hort.* (non *Scop.*, nec *Vill.*).
R. Wichelli *Hort.*

R. pumilus *L.* — *Jacq.* Coll. II, tab. 11; *Cav.* Ic., tab. 181. — Europa.
R. rupestris *Vill.* (non *Scop*).

R. saxatilis *L.* — *Jacq.* Fl. austr. I, tab. 53. — Europa.
R. prunifolius *Hort.* (non *Sieb.*).

R. Erythroxylon *Pall.* Fl. ross., tab. 62. — Sibiria.
R. Pallasii *Fisch.* et *Mey.*

COLLETIA Commers.

C. cruciata *Gill.* et *Hook.* — Bot. mag., tab. 5033. — Chili.
C. bictoniensis *Lindl.* — Fl. des serres XIV, tab. 1457.

C. ulicina *Gill.* et *Hook.* — *Hook.* Bot. misc., tab. 44. — Chili.

C. ferox *Gill.* et *Hook.* — Chili.
C. horrida *Brong* Ann. sc. nat. sér. 1, X, tab. 14.

CEANOTHUS Lin.

C. americanus *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 129; Bot. mag. tab. 1479. — America sept.

var. glabra.

C. glaber *Spach.*

C. tardiflorus *Horn.* — America septentrionalis.

C. tardivus *Hort.*

C. Delilianus *Spach.* — Patria ignota.

C. intermedius *Pursh.* — America septentrionalis.

C. azureus *Desf.* — Bot. reg., tab, 291. — Mexico.

C. cæruleus *Lodd.* Bot. cab., tab. 110.

VARIETATES HORTENSES.

var. Arnoldi.
— azurea latifolia.
— Bertini.
— carnea. (Présid. Réveil).
— corymbosa (albida).
— grandiflora.
var. gloire de Versailles.
— Lemoineana.
— Lucie Simon.
— Lucie Moser.
— rosea *Hort. Baum.*
— Théodore Frœbel.

C. Fontanesianus *Spach.* — America sept.?

C. ovatus *Desf.*

C. pallidus *Lindl.* Bot. reg. XXVI, tab. 20.

var. spicata.

C. ovatus hybridus *Hort.*

— thyrsiflora.

C. thyrsiflorus *Eschsch.* — Bot. reg. XXX, tab. 38.

C. divaricatus *Hort.* (non *Nutt.*).

C. velutinus *Dougl.* — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 45. — America septentrionalis.

C. Veitchianus *Hook.* — Bot. mag., tab. 5127; Fl. des serres XIII, tab. 1383. — California.

C. rigidus *Nutt.* — Belg. hort. III, tab. 16; Bot. mag. tab. 4664. — California.

C. divaricatus *Nutt.* — America septentrionalis.

POMADERRIS Labill.

P. apetala *Labill.* Nov. Holl., tab. 87. — Van Diemen.

HOVENIA Thunb.

H. dulcis *Thunb.* — Sicku. *Kæmpf.* Amœnit., p. 808, cum Icon; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 73-74.— Japonia.
H. inæqualis *Hort.* (non *DC.*).

TEREBINTHACEÆ

PISTACIA Lin.

P. Terebinthus *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 811: Nouv. Duham. IV, tab. 87. — Oriens.

P. vera *L.* — *Lamk,* Encycl., tab. 811. — Nouv. Duham. IV, tab. 17. — Syria.

P. Lentiscus *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 18; Bot. mag., tab. 1967. — Regio medit.

P. chia *Desf.* — Insula Chio.

RHUS Lin.

R. Cotinus *L.* — *Jacq.* Austr., tab. 284; Nouv. Duham. II, tab. 49. — Europa australis.
Vulg. *Fustet.*

R. Coriaria *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 46; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 136. — Europa australis.

R. semialata *Murr.* Comm. Gœtt. IV, tab. 3.— India orient.

R. Osbeckii *DC.* — Japonia.
R. semialata *Murr.* Comm. Gœtt. 1744, tab. 3. (pro parte).
R. — *var. Miq.*
R. alata *Sav.* et *Franch.* Enum. I, p. 92.
R. japonica *Hort.*

R. typhina *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 47 ; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 17 et 18. — America borealis.

var. arborescens.

— laciniata (non R. glabra laciniata).

R. viridifolia *Poir.* — America borealis.

R. canadensis *Mill.*

R. glabra *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 207; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 15. — America borealis.

R. caroliniana *Mill.*

R. elegans *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 16.

R. sanguinea *Hort.*

R. coccinea *Hort.*

var. laciniata. — Rev. hort. 1863, cum Icon.

R. copallina *L.* — *Jacq.* Hort. Schœnb., tab. 344 ; *Lamk*, Encycl., tab. 207. — America borealis.

R. leucantha *Jacq.* Hort. Schœnb., tab. 342. — Amer. sept.

R. sylvestris *Sieb.* et *Zucc.* Fam. nat., sect. I, p. 32.—Japon.

R. succedanea *L.* — *Kæmpf.* Amœn., p. 795; *Wight.* Ic., pl. Ind. or. II, tab. 560. — Japonia.

var. radicans.

R. vernicifera *DC.* — *Kæmpf.* Amœn., p. 792. — Japonia.

R. vernix *L.* (pro parte). — *Lamk*, Encycl., tab. 207 ; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 19.

R. juglandifolia *Wall.* et *Don.* (non *Willd.*).

R. venenata *DC.* — *Dill.* Elth., tab. 292. — America sept.

R. ternata *Hort. Petropol.* — Japonia.

R. radicans *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 48 ; Bot. mag., tab. 1809. — America septentrionalis.

R. Toxicodendron *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 48 ; Bot. mag., tab. 1806. — America septentrionalis.

R. varielobata *Steud.* — Carolina.

R. lobata *Hook.* (non *Poir.*) Fl. bor. amer., tab. 46.

R. Simoni *Hort.* — China.

R. suaveolens *Ait.* — America septentrionalis.
Myrica trifoliata *Hort.* an *L*?

R. ambigua *Hort. segrez.* — Japonia.
Ampelopsis japonica *Hort.*

R. aromatica *Ait.* — *Turp.* Ann. Mus. V, tab. 39. — Am. sept.
Rhus canadensis *Marsh.*
Myrica trifoliata *Aliq. Hort.*
Turpinia aromatica *Rafin.*

STYPHONIA Nutt.

S. integrifolia *Nutt.* — California.
Rhus integrifolia *Benth.* et *Hook.*

LITRÆA Miers.

L. laurina *Walp.* — California.
Rhus laurina *Nutt.*

DUVAUA Kunth.

D. dentata *DC.* — *Andr.* Bot. repos., tab. 620. — Chili.

LEGUMINOSÆ

STYPHNOLOBIUM Scht.

S. japonicum *Scht.* — Japonia et China.
Sophora japonica *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 21.
var. pendula.
— pubescens.
Sophora pubescens *Tausch.*
— violacea.
— variegata.

SOPHORA Lin.

S. angustifolia *Sieb.* et *Zucc.* Fam. nat., p. 10. — Japonia.

EDWARDSIA Salisb.

E. microphylla *Salisb.*— *Lamk*, Illustr., tab. 325.— *Rchb.* Icon., pl. cult. I, tab. 19. — Nova Zelandia.

CLADRASTIS Rafin.

C. tinctoria *Rafin.* — America borealis.
Virgilia lutea *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 3.— Herb. amat. III, tab. 197.
var. gracilis.

C. amurensis *Benth.* et *Hook.* — Regio Amur.
Maackia amurensis *Rupr.* et *Max.* Pr. fl. Amur., tab. 5.

ANAGYRIS Tourn.

A. fœtida *L.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 740. — Europa austr.

THERMOPSIS R. Br.

T. nepalensis *DC.* — *Lavall.* Arbor. segrez., Icon., tab. ined. — Nepalia.
Piptanthus nepalensis *D. Don.*

ULEX Lin.

U. europæus *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 59; *Smith* Engl. bot., tab. 743. — Europa occidentalis.
Vulg. *Ajonc; jonc marin.*
var. inermis.
— flore pleno.

U. nanus *Smith*, Engl. bot., tab. 743. — Europa occidentalis.
U. europæus nanus *L.*

U. strictus *Mackoy.* — Hibernia.
U. hibernicus *G. Don.*

SPARTIUM Lin.

S. junceum *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 22; Bot. mag., tab. 85. — Hispania.

Genista juncea *Lamk*, Encycl., tab. 619. — Nouv. Duham. II, tab. 22.

Vulg. *Genêt d'Espagne.*

var. flore pleno.

SAROTHAMNUS Wimm.

S. scoparius *Wimm.* — Gallia.

Genista scoparia *Lamk*, Encycl., tab. 619.

Cytisus scoparius *L.*

Spartium scoparium *Desf.* — Fl. danica II, tab. 313.

Vulg. *Genêt à balais.*

var. fl. albo (albido).

— ramulis variegatis.

S. purgans *Gren.* et *Godr.* — Gallia.

Genista purgans *L.* — *Bull.* Herb., tab. 115.

G. radiata *Hort.* (non *Scop.*, nec *Vil.*).

G. daurica *Hort.*

RETAMA Boiss.

R. sphærocarpa *Boiss.* Voy. Esp. — Hispania.

Genista sphærocarpa *Lamk.*

Spartium Clusii *Spach*, Suites Buff., tab. 16.

R. Duriæi *Spach.* — Numidia.

Spartium monospermum *Desf.*

GENISTA Lin.

G. radiata *Scopol.* — Europa australis.

G. horrida *DC.* — Hispania.

G. germanica *L.* — Fl. danica XI, tab. 1826. — Europa.

G. hispanica *L.* — *Cav.* Icon., tab. 211; *Lodd.* bot. cab., tab. 1738. — Hispania.

G. anglica *L.* — Fl. danica IV, tab. 619. — Europa septentrionalis.

G. ferox *Poir.* — Algeria.

Spartium heterophyllum *L'Herit.* Stirp., tab. 87.

G. Scorpius *DC.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 78.

G. sagittalis *L.* — *Jacq.* Fl. austr. III, tab. 209. — Gallia.

G. herbacea *Lamk.*

G. lasiocarpa *Spach.* — Italia.

G. æthnensis *DC.* — *Moris*, Fl. sard., tab. 28. — Sicilia.

Spartium trispermum *Smith.*

S. æthnense *Biv.* — Bot. mag., tab. 2674.

G. tinctoria *L.* — *Sow.* Engl. bot., tab. 44. — Europa.

G. germanica *Hort.* (non *Lin.*).

G. ternifolia *Hort.* (non *Loisel.*).

Carniola tinctoria *Presl.*

G. sibirica *L.* — *Jacq.* Hort. Vindob., tab. 160. — Sibiria.

Carniola sibirica *Presl.*

G. pilosa *L.* — Fl. dan. VII, tab. 1225. — Europa austr.

G. repens *Lamk.*

G. procumbens *Waldst.* et *Kit.*, tab. 180. — Bot. reg., tab. 1150. — Hungaria.

Sarothamnus procumbens *Presl.*

G. candicans *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 80. — Europa meridionalis.

G. canariensis *Lindl.* Bot. reg., tab. 217 (non *L.*, nec *DC.*).

Cytisus candicans *Lamk*, Encycl., tab. 618.

G. canariensis *L.* — Europa meridionalis.

Cytisus candicans *var. Lamk.*

G. ramosissima *Spach.* — Atlas.

G. canariensis *DC.* (non *Lin.*, nec *Lindl.*).

Cytisus ramosissimus *Poir.*

G. linifolia *L.* — Bot. mag., tab. 442. — Gallia.

Spartium linifolium *Desf.* Fl. atl., tab. 181.

G. Spachiana *Webb.* — Bot mag., tab. 4195. — Regio medit

CYTISUS Lin.

C. albus *Link.* — Lusitania.
C. multiflorus albus *Hort.*
Genista multiflora *Lois.* Nouv. Duham. II, tab. 23.
Sarothamnus albus *Presl.*
Spartium album *Desf.*
S. multiflorum *L'Hérit.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1052.

C. Everestianus *Hort.* — Rev. hort. 1873, p. 391, cum Ic. — Patria ignota.

C. argenteus *L.* — *Brot.* Phytogr., tab. 69. — Gallia merid.

C. nubigenus *Link.* — *Webb.* Canar., tab. 46. — Ins. Canaria.
C. fragrans *Lamk.*

C. triflorus *L'Hérit.* — *Rchb.* Ic., tab. 2077. — Regio medit.
C. villosus *Pour.*

C. æolicus *Guss.* — Bot. reg., tab. 1902. — Regio medit.

C. spinosus *Lamk.* — *Lob.* Ic. II, tab. 95. — Reg. medit.

C. purpureus *Scop.* — Bot. mag., tab. 1176; Nouv. Duham. V, tab. 42. — Austria.
var. incarnata (atropurpurea.).
— — major.
— superba.
— ratisbonensis.
— versicolor.

C. biflorus *L'Hérit.* — *Waldst.* et *Kit.*, tab. 166. — Austria.

C. elongatus *Waldst.* et *Kit.* tab. 183. — Hungaria.
var. longispicata.

C. speciosus *Presl.* — Patria ignota.

C. supinus *Jacq.* Fl. austr. I, tab. 20 (non *Pall.*). — Eur. mer.

C. hirsutus *L.* — *Jacq.* Obs., tab. 96. — Europa austr.
C. Tournefortianus *Loisel.*

C. capitatus *Jacq.* Fl. austr., tab. 33. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 497. — Europa australis.

C. polytrichus *Bieb.* — Europa australis.

C. uralensis *Bieb.* — Russia orient.

C. caucasicus *Hort.* — Caucasus.

C. velutinus *Hort.*

C. caramanicus *Hort. segrez.* — Oriens.

Podocytisus caramanicus *Boiss*,

P. americanus *Hort.*

LEMBOTROPIS Griseb.

L. sessilifolius *Griseb.* — Europa australis.

Cytisus sessilifolius *L.* — Nouv. Duham. V, tab. 45; Bot. mag., tab. 255.

C. quinquefolius *Hort.*

Sparothamnus sessilifolius *Presl.*

L. nigricans *Griseb.* — Europa.

Cytisus nigricans *L.* — Nouv. Duham. V, tab. 45; Bot. reg., tab. 802.

var. leucantha.

Cytisus leucanthus *Hort.* (non *Waldst.*).

— reflexa.

LABURNUM Griseb.

L. vulgare *Griseb.* — Europa centralis.

Cytisus Laburnum *L.* — Bot. mag., tab. 176; Nouv. Duham. V, tab. 44.

var. bifera (autumnale).
— bullata (involuta).
— Carlieri.
— Fauquermonti.
— foliis connatis.
— floribunda.
— grandiflora.
— leucantha
— macrophylla.
— monstrosa.
— Parksii.
var. pendula.
— quercifolia.
— ramentacea.
— rugosa.
— serotina.
— sessilifolia (non Lembotropis sessilifolius).
— variegata.
— verrucosa.
— Watereri.

L. Adami *Hort. segrez.* (stirps hybrida).
Cytisus Laburnum *var.* purpurea *Hort. brit.*—Bot.reg., tab. 1965.
C. Adami *Poit.*

L. alpinum *Griseb.* — Alpes.
Cytisus alpinus *Mill.* — *Guimp.* Holzgew., tab. 128.
var. pendula.
— annularis.
— latifolia.
— fragrans.

L. Weldeni *Griseb.* — Dalmatia.
Cytisus Weldeni *Vis.* Dalmat., tab. 39. — Bot. reg. XXIX, tab. 40.
C. tamentaceus *Sieb.*

L. Alschingeri *Hort. segrez.* — Dalmatia.
Laburnum vulgare *var.* Alschingeri *Griseb.*
Cytisus Alschingeri *Vis.* Fl. Dalmat., tab. 54.

INDIGOFERA Lin.

I. Dosua *Hamilt.* — Bot. reg. XXVIII, tab. 57. — Nepalia.
var. minor.
— major.

I. decora *Lindl.* — Bot. mag., tab. 5063. — China.
var. alba.
— rosea elegans.

I. Iwafusi *Sieb.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.

I. Roylei *Hort.* — Asia.

I. macroptera *Hort.*

AMORPHA Lin.

A. fruticosa *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 36; Hort. Clif., tab. 19. — America septentrionalis.
var. (1) crispa.

(1) Les *Amorpha* que nous avons reçus des pépiniéristes sous les noms de A. canescens, caroliniana, crocea, dealbata, elatior, emarginata, fragrans, Gardneri, glabra, Ludoviciana, marginata, nana, pubescens, tenessensis et tomentosa diffèrent si peu de l'*A. fruticosa* qu'ils ne peuvent même pas être considérés comme des variétés.

A. fructicosa.
var. Lewesii.
— pendula *Carr.* Rev. hort. 1870, p. 378.

ROBINIA Lin.

R. Pseudo-Acacia *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 16; *Michx fil.* Arb. Amer. II, tab. 1. — America sept.

VARIETATES HORTENSES.

amœna.
amorphæfolia.
angustifolia.
bella rosea.
bullata.
coluteoides.
cornigera.
crispa (undulata).
Decaisneana.— Rev. hort. 1863, p. 151, cum Ic.; Fl. des serres XIX, tab. 2027.
dissecta.
Edwarsiæfolia.
fastigiata (pyramidalis, stricta).
fastigiata nana.
formosa (formosissima).
glaucescens.
Robinia revoluta *Hort.*
Gondouini.
inermis nana.
— pabularia.
jaspidea.
latisiliqua.
macrophylla.
melanoxylon.
monophylla
monstrosa.
patula.
pendula.
procera.
Rehderii.
rubra.
sapindifolia.
sophoræfolia.
spectabilis (Utherardi).
tortuosa.

R. dubia *Fouc.* — *Lamk*, Encycl., tab. 606. — Patria ignota.
R. hybrida *Audib.*
R. intermedia *Soul. Bod.*
R. ambigua *Poir.*

R. viscosa *Vent.* Hort. Cels., tab. 4.— Nouv. Duham. II, tab. 17; *Michx fil.* Arb. am. III, tab. 2. — Amer. sept.
R. glutinosa *Curt.* Bot. mag., tab. 560.
var. alba.

R. hispida *L.* — Bot. mag., tab. 311. — America sept.
R. rosea *Loisel.* Nouv. Duham. III, tab. 18.
var. Camuseti.

R. macrophylla *Schrad.* ex *DC.* Prodr.— Amer. sept.
R. hispida inermis *Carr.* Rev. hort. 1865, p. 149.
R. glabra *Hort.*
R. complexa *Hort.*
R. spectabilis *Hort.*

CARAGANA Lamk.

C. Altagana *Poir.* — Dahuria.
Robinia Altagana *Pall.* Fl. ross., tab. 42. — *L'Hérit.* Stirp., tab. 76.
var. microphylla *Poir.*
C. microphylla *DC.* (non *Lamk*).
Robinia microphylla *Pall.* Fl. ross., tab. 42, fig. 1 et 2.
— glomerata.

C. arborescens *Lamk*, Encycl., tab. 607. — Sibiria.
Robinia Caragana *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 19; Bot. mag., tab. 1886.
var. pendula.
— nana.

C. Chamlagu *Lamk.* — China.
Robinia Chamlagu *L'Hérit.* Stirp., tab. 17. — Nouv. Duham. II, tab. 21.

C. frutescens *DC.* — *Regel*, Icon., tab. 348. — Sibiria.
Robinia frutescens *L.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 43.
R. sinensis *Hort.*
var. pendula.
— angustifolia.
— latifolia.

C. triflora *Lindl.*—*Paxt.* Flow. gard. II, fig. 212. — Nepal.
C. brevispina *Royle.*

C. spinosa *DC.* — Sibiria.
Robinia ferox *Pall.* Fl. ross., tab. 44. — Nouv. Duham. II, tab. 10.

C. pygmæa *DC.* — Bot. reg., tab. 1021. — Sibiria.
var. grandiflora.
C. grandiflora *Bieb.*
— gracilis.
— pendula.

C. jubata *Poir.* — Fl. des serres XIX, tab. 2013. — Sibiria.
Robinia jubata *Pall.* Act. Petr. X, tab. 6. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 522.

HALIMODENDRON Fisch.

H. argenteum *DC.* — Sibiria.
Robinia Halodendron *Lin. fil.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 36; Bot. mag., tab. 1016.
Caragana argentea *Lamk*, Encycl., tab. 607.

H. grandiflorum *Hort.* — Patria ignota.
H. speciosum *Carr.* Rev. hort. 1876.

CALOPHACA Fisch.

C. wolgarica *Fisch.* — Rossia meridionalis.
Cytisus pinnatus *Pall.* Fl. ross. I, tab. 47.
C. wolgaricus *Lin. fil.* — Nouv. Duham. V, tab. 18; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 83.

COLUTEA Lin.

C. arborescens *L.* — Bot. mag., tab. 81; Nouv. Duham. III, tab. 22. — Europa.
var. pygmæa (crispa).
— monstrosa.

C. cruenta *Ait.* — *L'Hérit.* Stirp. II, tab. 41. — Oriens.
C. orientalis *Lamk*, Encycl., tab. 624. — Nouv. Duham. I, tab. 23.
C. sanguinea *Pall.*
C. purpurea *Hort.*

C. halepica *Lamk*, Illustr. tab. 624, fig. 2. — Asia minor.
C. Pocockii *Ait.* — *Schmidt.* Arb., tab. 129.
C. procumbens *L'Hérit.* Stirp. II, tab. 42.
C. media *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 140. — Patr. ign.
C. frutescens *Hort.* (non *Lin.*).

ASTRAGALUS Lin.

A. Tragacantha *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 84. — Asia minor.

CORONILLA Tourn.

C. Emerus *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 630; Bot. mag., tab. 445. — Gallia meridionalis.
Emerus major *Mill.* Ic., tab. 132, fig. 1.
var. lanceolata.
C. glauca *L.* — Bot. mag., tab. 13. — Gallia meridionalis.
C. sibirica *Hort.*

DESMODIUM DC.

D. racemosum *DC.* — Japonia.
D. argyraceum *Hort.* (non *Sieb.*).
D. penduliflorum *Oudem.* — Fl. des serres XVIII, tab. 1888. — Japonia.
D. racemosum *Hort.* (non *DC.*).
D. incanum *Hort.*
D. japonicum *Miq.* Prol. Fl. jap. — Japonia.
D. Dillenii *Darlingt.* — America borealis.
Hedysarum trifoliatum *Dill.* Elth., tab. 144.
D. villosum *Hort. segrez.* — Patria ignota.
Lespedeza villosa *Hort.* (non *Pers.*).

LESPEDEZA Michx.

L. bicolor *Turcz.* — L'Hort. franç. 1869, tab. 11. — Regio amur.
var. alba.
— purpurea.
— rosea.

L. cyrtobotrya *Miq.* — *Maxim.* Lesped., p. 31. — Japonia.
L. virgata *DC.* — Japonia.
Hedysarum virgatum *Thunb.*
L. argyracea *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

CAMPYLOTROPIS Bnge.

C. chinensis *Bnge.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — China borealis.
Lespedeza macrocarpa *Bnge.*

WISTERIA Nutt.

W. frutescens *DC.* — America septentrionalis.
Glycine frutescens *L.* — Bot. mag., tab. 2103; Nouv. Duham. III, tab. 55.
var. magnifica. — L'Hort. fr. 1855, tab. 19; Fl. desser., tab. 1151.
— purpurea.
— Backousiana. — Rev. hort. 1862, p. 12, cum Icon.
— alba (nivea).
W. chinensis *DC.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 44. — China.
W. floribunda *DC.*
Glycine sinensis *Curt.* Bot. mag., tab. 2083.
var. alba.
— macrobotrys.
W. brachybotrys *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 45. — Fl. des serres IX, tab. 880. — Japonia.
W. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 43. — Japonia.
W. multijuga *Sieb.* — Fl. des ser. XIX, tab. 2002. — Japon.
Wisteria grandiflora *Hort.*

CERCIS Lin.

C. Siliquastrum *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 7; Bot. mag., tab. 1138. — Europa australis.
var. alba.
— carnea.
— variegata.
— fructu rubro.
— steriliis.

C. canadensis *L.* — *Guimp.* Holzgew, tab. 92.— Amer. sept.
C. chinensis *Bnge.* — China.
C. japonica *Sieb.* — Fl. des serres VIII, tab. 849.
C. californica *Hort. segrez.* — America sept.?

GLEDITSCHIA Lin.

G. triacanthos *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 105; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 138; *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 10. — America septentrionalis.
Acacia triacanthos *Hort.*
var. inermis (lævis).
G. latifolia *Hort.*
— Bujoti (pendula).
G. sinensis *Lamk.* — China.
G. horrida *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 75.
G. indica *Hort.*
var. nana (purpurea).
G. japonica *Hort.*
G. ferox *Desf.* — China.
G. orientalis *Bosc.*
var. subinermis.
G. macracantha *Desf.* — China.
G. Fontanesii *Spach.*
G. caspica *Desf.* — Asia occidentalis.
G. monosperma *Walt.*— *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 10 — America septentrionalis.
G. aquatica *Bieb.*
G. caroliniensis *Lamk*, Encycl., tab. 857.

GYMNOCLADUS Lamk.

G. canadensis *Lamk*, Encycl., tab. 823. — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 51; Nouv. Duham. VI, tab. 19. — America septentrionalis.
Guilandina dioica *L.*
G. chinensis *Baill.* Journ. soc. hort. France 1875, p. 165. cum Icon. — China.

ALBIZZIA Durraz.

A. Julibrissin *Durraz.* Memor., cum Ic. — Oriens.
Acacia Julibrissin *Willd.*
Mimosa Julibrissin *Forsk.* — *Scop.* Insubr., tab. 19.

A. Nemu *Hort. segrez.* — China et Japonia.
A. rosea *Carr.* Rev. hort. 1870-71.
Acacia Julibrissin *var. Benth.*
A. mollis *Wall.* Pl. asiat. rar. II, tab. 177.
A. Nemu *Van-Hutte.* Fl. des serres XXI, tab. 2199.
Mimosa speciosa *Thunb.* Linn. Trans. II.
M. arborea *Thunb.* — *Banks*, Kæmpf. Ic. jap., tab. 19.

ROSINEÆ

AMYGDALUS Tourn.

A. nana *L.* — Bot. mag., tab. 161 ; Nouv. Duham. IV, tab. 30.
— Rossia meridionalis.
var. virgata (non Armeniaca Mume *var.*).
— tortuosa.
— divaricata.
— dumosa.
— crassa.
— fl. pleno albo.
— — — rubro.
— — — carneo.

A. georgica *Desf.* — Flor. et Pom. franç., tab. 364. — Georgia.

A. pedunculata *Pall.* Nov. act. Petr. VII, tab. 89. — Sibiria.
A. Pallasii *Ledeb.*

A. incana *Pall.* Fl. ross., tab. 7. — Bot. reg. XXV, tab. 58.
— Caucasus.

A. campestris *Besser.* — Hungaria.
A. Besseriana *Schott.*
A. Gessleriana *Hort.*

A. sibirica *Lodd.* Bot. cab., tab. 1599. — Sibiria.

A. orientalis *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1137. — Oriens.
A. argentea *Lamk.*

A. glandulosa *Hook.* Icon., tab. 288. — Texas.

A. communis *Lamk.*—Nouv. Duham. IV, tab. 29.—Asia min.
var. dulcis.
— flore pleno.
— macrocarpa. — Bot. reg., tab. 1160.
— persicoides. — *Dcne*, Jard. fruit. Mus.

A. amara *Hayn.* Arzn. IV, tab. 39, fig. 1. — Oriens.
var. pendula.
— pyramidata.

PERSICA Tourn.

P. vulgaris *Mill.* — Nouv. Duham. VI, tab. 2-3; *Spach*, Suites Buff., tab. 5. — Persia.
Amygdalus Persica *L.*
Vulg. *Pêcher.*
var. nana.— *Duham.* Arb. fruit. II, tab. 32; *Dcne* Jard. fruit.
— pendula.
— pyramidata.
— rubrifolia (atropurpurea).— Fl. des serres XIX, tab. 1986.
— flore pleno roseo.
— — — albo.
— ramulis albis. — *Lindl.* Bot. reg., tab. 1586.
— — flavis.
— — rubris.
— caucasica.
Varietates hortenses multæ.

P. lævis *DC.* — Patria ignota.
Amygdalus Persica *var.* nectarina *Ait.*
Vulg. *Brugnonier.*
Varietates hortenses diversæ.

P. ispahanensis *Thouin* Ann. Mus. VIII, p. 425. — Persia.
P. vulgaris *var.* ispahanensis *Loisel.*
var. flore pleno.

P. chinensis *Hort. segrez.* — Asia septentrionalis.
Amygdalus cochinchinensis *Lour.*
A. sinensis *Hort.*
var. flore pleno roseo (rosæflora).
P. pumila flore pleno *Hort.*
— — semi pleno albo. — Fl. des serres X, tab. 969.
Amygdalus Fortunei *Hort.*
— flore pleno rubro. — Fl. des serres X, tab. 969.
— camelliæflora. — Fl. des serres X, tab. 1299.
— dianthiflora. — Fl. des serres X, tab. 1300.
— radiata.
— versicolor. — Fl. des serres X, tab. 1319.
P. Simoni *Dcne.* — China septentrionalis.
Prunus Simoni *Carr.* Rev. hort. 1872, p. 111, cum Ic.
P. platycarpa *Dcne.* — China.
Vulg. *Flat peach* Hort. transact. IV, tab. 19.
— *Pêche plate* Rev. hort. 1870-1871, p. 111, cum Ic.
P. Davidiana *Carr.* Rev. hort. 1871, p. 75. — China.
var. nana.
— alba.
P. lancæfolia *Hort. segrez.* — Patria ignota.
Amygdalus lancæfolia *Hort.*

ARMENIACA Tourn.

A. vulgaris *Lamk*, Encycl., tab. 431; — Nouv. Duham. V, tab. 49 et 50. — Asia minor.
Vulg. *Abricotier.*
var. amygdalifolia.
— caucasica (an species propria?).
— pendula.
— salicifolia.
— variegata.
Varietates hortenses diversæ.

PRUNUS Tourn.

P. Mume *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 11. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones. tab. ined. — Japonia.

var. præcocissima.

— virgata flore pleno.

— — — roseo pleno.

Prunus virgata *Aliq. Hort.*

Amygdalopsis virgata *Hort.* (non Amygdalus nana *var.*).

P. dasycarpa *Ehrh.* — Bot. reg., tab. 1243. — China.

Armeniaca dasycarpa *Pers.*

Prunus armeniaca nigra *Desf.*

var. persicæfolia. — Nouv. Duham. V, tab. 52.

P. spinosa *L.* — Fl. danica VI. tab. 926 ; Nouv. Duham. V, tab. 54. — Europa.

Vulg. *Prunelier; Épine noire.*

var. flore pleno.

— — rubro.

— sterilis.

— fructu ovato.

P. neglecta *Hort. segrez.* — Patria ignota.

P. insititia *L.* — Engl. bot. XII, tab. 841. — Gallia.

P. exigua *Bechst.*

P. præcox *Tournef.*

P. domestica *L.* — Nouv. Duham. V, tab. 50-62; Engl. bot. XXV, tab. 1783. — Europa australis.

P. communis *Huds.*

Vulg. *Prunier.*

var. flore pleno.

— armenioides. — *Duham.* Arb. fr. II, tab. 13.

Vulg. *P. abricotée.*

— claudiana. — *Duham.* l. c. II, tab. 11.

Vulg. *P. Reine Claude.*

P. domestica.

var. damascena. — *Duham.* l. c. II, tab. 20, fig. 3.
Vulg. *P. de Damas.*

— turonensis. — *Duham.* l. c. II, tab. 20, fig. 1.
Vulg. *P. de Tours.*

— pruneautiana. — *Duham.* l. c. II, tab. 7.
P. pyramidalis *DC.*
P. æconomica *Borkh.*
Vulg. *P. à pruneaux.*

— apyrena.

— pendula.

— persicæfolia.

P. Mirobolana *Lois.* Nouv. Duham. V, tab. 57. — Amer. sept.
Prunus cerasifera *Ehrh.* — Bot. mag., tab. 5934.
P. domestica *var.* Myrobolana *L.*

var. arbutifolia.

— gigantea.

— ligustrifolia.

— serotina.

P. ursina *Kotschy*, Verhandl. Bot. Vind. 1864. — Oriens.

P. divaricata *Ledeb.* Ic. Fl. ross., tab. 13. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Caucasus.

P. Cocomilio *Ten.* — *Dcne.* Jard. fruit. Mus. — Italia.

P. brigantiaca *Vill.* — Gallia.
Vulg. *P. de Briançon.*

var. pendula.

P. maritima *Wangh.* — America septentrionalis.

P. nigra *Ait.* — Bot. mag., tab. 1117. — Amer. sept.
P. americana *Hort.* (non *Marsh.*).
Cerasus nigra *Lois.*

P. borealis *Poir.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1598. — Amer. sept.
Cerasus borealis *Mich.x fil.* Arb. amer. III, tab. 8.

P. pygmæa *Willd.* — America septentrionalis.
Cerasus pygmæa *Loisel.*

P. americana *Marsh.* — Texas.

P. hyemalis *Michx.* — America septentrionalis.
P. acinaria *Desf.*
Cerasus hyemalis *Seringe.*

P. acuminata *Michx.* (non *Wall.*). — America sept.
P. reclinata *Bosc.*

P. depressa *Pursh.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1607. — Amer. sept.
P. susquehanæ *Willd.*
P. pumila *Hort.* (non *Lin.*; nec *Michx*).
P. hybrida pumila *Hort.*
P. canadensis *Hort.* (non *Willd.*; nec *Mill.*).
Cerasus depressa *Seringe.*

P. pumila *L.* — *Guimp.* Holzgew. tab. 119. - America sept.
Cerasus pumila *Michx.*
C. glauca *Mœnch.*
C. canadensis *Mill.* Ic., tab. 89. fig. 2. (non *Lin.*).
Vulg. *Ragouminier.*

P. prostrata *Labill.* Syr. I, tab. 6. — Nouv. Duham. V, tab. 83, fig. 2; Bot. reg., tab. 6; Rev. hort. 1870-71, p. 370, cum Icon. — Liban.
Cerasus prostrata *Seringe.*
C. incana *Stev.* — Rev. hort. 1853, tab. 15.
Amygdalus incana *Pall.* Fl. ross., tab. 7.

P. Chicasa *Michx.* — Carolina.
P. candicans *Willd.* — Bot. reg., tab. 1135.
Cerasus Chicasa *DC.*

P. tomentosa *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. I, tab. 22; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.
P. trichocarpa *Bnge.*

P. triloba *Lindl.* — L'Hort. franç. 1865, tab. 10. — China.
Amygdalopsis Lindleyi *Carr.* Rev. hort. 1862, p. 91, cum Icon. — Fl. des serres XV, tab. 1532.

P. japonica *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 10; Bot. reg., tab. 27 et 1801. — Japonia.

P. sinensis *Pers.*

P. persica alba *Hort.*

Cerasus japonica *Loisel.*

C. chinensis *G. Don.*

var. multiplex (fl. pleno). — Rev. hort. 1870-71, p. 290, cum Ic.

P. japonica *Lindl.* Bot. reg., tab. 27.

Amygdalus pumila *L.* — Bot. mag., tab. 2176.

P. sinensis Althæa *Hort.*

P. flore albo pleno *Hort.*

— pendula.

P. insignis *Hort.*

P. canadensis hybrida *Hort.*

CERASUS Tourn.

§. CERASOPHORA.

C. serrulata *Loud.* — China.

C. serratifolia fl. pleno *Hort.*

C. serrulata fl. pleno *Hort.*

C. serotina fl. pleno *Hort.*

C. depressa *Hort.* (non *Ser.*)

Prunus serrulata *Lindl.*

C. Pseudo-cerasus *Lindl.* — China.

C. Sieboldi *Carr.* Rev. hort. 1866, p. 371, cum Icon.

C. pseudo-cerasus flore roseo *Hort.*

C. hortensis flore roseo pleno *Hort.*

C. carneo pleno *Hort.*

Prunus pseudo-cerasus *Steud.*

P. serratifolia fl. roseo pleno *Hort.*

P. paniculata *Ker.* (non *Thunb.*).

var. pendula.

C. Sieboldi pendula flore roseo *Hort.*

— flore pleno.

C. Avium *Mœnch.* — Nouv. Duham. V, tab. 3; Fl. danica X, tab. 1647. — Gallia.

Prunus Cerasus avium *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 432.

P. nigra *Mill.* (non *Ait.*).

P. sylvestris *Pers.*

P. effusa *Hort.* (non *Host.*).

Vulg. *Merisier.*

var. multiplex.

— præmorsa.

— salviæfolia.

— laciniata.

C. vulgaris laciniata *Hort.*

— aspleniifolia.

— longifolia.

— rubrifolia.

— pendula.

C. Juliana *DC.*

Vulg. *Guignier.*

C. duracina *DC.* — Patria ignota.

Prunus Cerasus Bigarella et duracina *L.*

Vulg. *Bigarreautier.*

var. macrophylla.

C. nicotianæfolia *Hort.*

C. decumana *Delaun.*

— salicifolia.

C. vulgaris salicifolia *Hort.*

C. caproniana *DC.* — Europa.

C. acida *Mill.*

Prunus acida *Ehrh.*

P. austera *Ehrh.*

Vulg *Cerisier* ; *Griottier.*

C. caproniana.
var. multiplex.
C. Rhexii *Hort. Booth.*
C. caproniana ranunculiflora *Hort.* — Fl. des serres XVII, tab. 1805.
C. serotina flore pleno *Hort.*
— polygyna. — *DC.* Pl. rar. Genev., tab. 18.
Vulg. *Griottier à bouquets.* — *Duham.* Arb. tab. 3.
— umbraculifera.
— salicifolia.
— pumila.
C. acida pumila *Hort.*
— humilis.
C. acida humilis *Hort.*

C. Chamæcerasus *Lois.* Nouv. Duham. V, tab. 5.— Europa.
Prunus Chamæcerasus *L.* — *Jacq.* Ic., tab. 90.
P. fruticosa *Pall.* Fl. ross. I, tab. 8.
var. umbraculifera. (non C. caproniana *var.*).
C. amygdalifolia *Hort.* (non *Wehb.*).
— floribunda.
Prunus pumila *Aiiq. Hort.* (non *Michx*).

C. semperflorens *DC.*—Nouv. Duham. V, tab. 9; Rev hort. 1877, p. 50, cum. Icon. —Europa.
Prunus semperflorens *Ehrh* —*Wats.* Dendr. II, tab. 131.
P. serotina *Roth*, (non *Ehrh.*, nec *Willd.*).

C. persicifolia *Lois.* — America septentrionalis.
Prunus persicifolia *Desf.*

C. Mahaleb *Mill.* — Nouv. Duham. V, tab. 2. — Europa.
Prunus Mahaleb *L.* — *Jacq.* Fl. austr. III, tab. 287.
var. fructu albo.
— — luteo.
— monstrosa.
— cerasifera.

C. Fontanesiana *Spach.* — Græcia.
Prunus græca *Desf.*

§. PADUS.

C. glaucifolia *Wall.* — India Orient.

C. cornuta *Wall.* — *Royle* Illustr. Him., tab. 38. — Himalaya.
Prunus cornuta *Steud.*
Padus cornuta *Carr.* Rev. hort. 1869, fig. 64.

C. mollis *Dougl.* — *Nutt.* North-Am. sylv. II, tab. 46. — Oreg.

C. Padus *DC.* — Nouv. Duham. V, tab. 1. — Europa.
Prunus Padus *L.* — Fl. danica II, tab. 205.
Vulg. *Merisier à grappes; Bois de Ste Lucie.*

var. racemosa rotundifolia.
— — fimbriata.
— aucubæfolia.
— latifolia.
Cerasus cornuta *Aliq. Hort.* (non *Wall.*).
— bracteosa.
var. cucullata monstrosa.
— rubra. *Willd.* Arb., tab. 4.
— heterophylla.
— longifolia.
— aspleniifolia.
— flore pleno.

C. virginiana *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6; *Wild.* Arb. tab. 5. — America sept.
Prunus virginiana *L.* — *Guimp.* Holzgew. tab. 36.
P. rubra *Ait.* — *Guimp.* Holzgew. tab 78.
var. micropyrena.

C. serotina *Loisel.* — America septentrionalis.
Prunus serotina *Willd.* Arb., tab. 5. (non *Roth.*). — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 48.
P. virginiana *Mill.* (non *Lin.*; nec *Ehrh.*).
P. cartilaginea *Lehm.*

C. Capuli *DC.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icon, tab. ined. — Mexico.
Prunus Capuli *Ser.*

§. LAURO-CERASUS.

C. lusitanica *Loisel.* — *Mill.* Icon., tab. 195; *Dill.* Hort. Eltham., tab. 159. — Iberia.

C. lusitanica.
Prunus lusitanica *L.*
Vulg. *Laurier de Portugal*; *Azaréro.*
var. angustifolia.
— crassifolia.
— ormistoniensis.
— foliis variegatis.

C. Lauro-Cerasus *Loisel.* — *Guimp.* tab. 64. — Europa austr.
Prunus Lauro-Cerasus *L.* — *Bull.* Herb., tab. 153.
Vulg. *Laurier-Cerise.*

var. erecta.
— latifolia.
— longifolia.
— microphylla.
— myrtifolia.
— rotundifolia.

var. Otini.
— azorica.
— caucasica.
— kamtschatica.
— intermedia.
— foliis variegatis.

C. caroliniana *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 7. — Amer. sept.

C. ilicifolia *Nutt.* North-Amer. sylv. I, tab. 47. — *Hook.* Beechey voy. tab. 83. — California.

KERRIA DC.

K. japonica *DC.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 98; Bot. reg., tab. 1873. — Japonia.
Corchorus japonica *Thunb.*
Spiræa japonica *Camb.*
var. flore pleno. — Bot. mag., tab. 1296.
— foliis variegatis.
— ramulis aureo-vittatis.

RHODOTYPOS Sieb. et Zucc.

R. kerrioides *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 99. — Bot. mag., tab. 5205; *Lavall.* Arbor. segr. Icon, tab. ined. — Japon.

SPIRÆA Lin.

§. FLORES PANICULATI.

S. sorbifolia *L.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 24 et 29. — Sibiria.
S. pinnata *Mœnch.* — *Gmel.* Fl. sib , tab. 401.
S. alpina *Pall.* Fl. ross., tab. 20. — Sibiria.
S. sorbifolia *var.* alpina *DC.*
S. Pallasii *Hort. petrop.*
S. Tobolskia *Lodd.* — Sibiria.
S. Lindleyana *Wall.* — Bot. reg., tab. 33. — Nepalia.
S. Humboldii *Hort.*
S. ariæfolia *Smith.* — Bot. reg., tab. 1365. — America bor.
S. lævigata *L.*— *Lamk,* Illustr., tab. 436, fig. 3. — Sibiria.
S. altaica *Pall.* Fl. ross. I, tab. 23.
S. salicifolia *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 439 ; *Gmel.* Fl. sibir. III, tab. 49. — Sibiria et America sept.
var. carpinifolia. — *Pall.* Fl. ross , tab. 22.
S. carpinifolia *Ehrh.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 66.
S. amœna *Rafin.*
S. alba *Pers.* (non *Ehrh.*).
— major (latifolia). — *Pall.* Fl. ross., tab. 21.
S. obovata *Rafin.* (non *Waldst.* et *Kit.*).
— paniculata alba.
S. paniculata *Willd.*
S. alba *Ehrh.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 183.
S. Rigoldi *Hort.*
S. salicifolia fl. albo *Hort.*
— undulata.
S. cuneifolia *Rafin.* (non *Wall.*).
— rubro-viridis.
— Bethlehemensis.
— Regeliana (Sanssouciana).
— grandiflora rosea.

S. salicifolia.
var. pensylvanica.
— carnea(S. nepalensis carnea *Hort.*).
— roseola (S. sinensis *Hort.*).
— alba-lilacina.
— rosea (S. pruinosa *Hort.*).
— Fontenaysi rosea.
— incarnata.
— polystachys.
— floribunda.
— Billardi. — L'Hort. franç. 1855, tab. 6.
— — longepedunculata *Hort. Billard.*
— rubra.
S. nepalensis *Hort.*
S. Douglasii *Hook.* — Fl. des serres II, tab. 2; Bot. mag., tab. 5151; Rev. hort. 1846, tab. 6. — Oregon.
S. argentea *Hort.* (non *Lin.*, nec *Loud.*).
var. pachystachys.
S. tomentosa *L.*— *Pluck.* Phyt., tab. 321. — America sept.
S. Menziesii *Hook.* — America septentrionalis.
S. eximia *Hort.*
S. Nobleana *Hook.* Bot. mag., tab. 5169. — California.
var. pachysandra.
S. californica *Hort.*
— intermedia.
S. Nobleana *Hort.*

§. FLORES CYMOSO-CORYMBOSI.

S. Fortunei *Planch.* Fl. des serres IX, tab. 871; Bot. mag. tab. 5164. — China.
S. callosa *Lindl.* Fl. gard. II, tab. 113, (non *Thunb.*).
var. Foxii.
— Fortunei paniculata.
— macrophylla.
— corymbiflora (bella coccinea).
— semperflorens.
S. Regeliana *Aliq. Hort.*

S. Fortunei.
— hybrida rosea.
— — Van-Houttei.
— syringæflora.
— atrosanguinea.
S. callosa *Thunb.* (non *Lindl.*). — Belg. hort. III, tab. 37.
— Japonia.
var. alba.
— superba.
S. bella *Sims*, Bot. mag., tab. 2426. — Nepalia.
S. ovata *Hort.*
S. expansa? *Wall.* — India orientalis.
S. species du Kamaon *Hort.*
S. montana *Hort.*
var. nivea.
S. opulifolia *L.* — Nouv. Duham. VI, tab 14. — Amer, sept.
var. lutea.

§. FLORES CORYMBOSI.

S. decumbens *C. Koch* in *Sturm.* Fl. XIV, tab. 62; — *Lindl.* Fl. gard. I, tab. 15. — Austria.
S. pubescens *Bnge.* — Bot. reg. XXXIII, tab. 38. — China.
S. arctica *Hort.*
S. rupestris *Sieb.* — Japonia.
S. ulmifolia *Scop.* Fl. carn., tab. 22 *bis.* — Nouv. Duham. VI, tab. 13. — Sibiria.
S. chamædrifolia *Jacq.* Hort. vind., tab. 140. (non *Lin.*).
S. foliosa *Poir.*
S. betulæfolia *Pall.* Fl. ross. III, tab. 16.
var. parvifolia.
S. thalictroides *Hort.* (non *Pall.*).
S. chamædrifolia *L.* (non *Jacq.*). — *Pall.* Fl. ross., tab. 15; Bot. reg, tab. 1222. — Sibiria.
S. flexuosa *Hort.* (non *Fischer*).
S. cana *Waldst* et *Kit.* Fl. hung. III, tab. 227. — Croatia.

S. flexuosa *Fisch.* (non *Reichb.*) — *Combes.* Ann. sc. nat. 1re sér. I, 365. — Sibiria.

S. alpina *Hort. Paris.* (non *Pall.*).

S. inflexa *Hort.*

S. tenuissima *Hort.*

S. trilobata *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, 68. — Altaï.

S. thalictroides *Hort.* (non *Pall.*).

S. lobata *Hort.* (non *Murr.*).

S. intermedia *Hort.*

S. media *Hort.* (non *Pursh*).

S. grossulariæfolia *Hort.*

S. adiantifolia *Aliq. Hort.*

var. fl. rubro.

S. cratægifolia *Link.* — *Guimp.* Fr. Holzg., tab. 82. — Sibiria.

S. betulæfolia *Wats.* Dendr. brit. tab. 67.

S. japonica vel californica *Hort.*

S. pruinosa *Hort.*

S. corymbosa *Rafin.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 671.

S. ceanothifolia *Horn.*

S. Reevesiana *Lindl.* Bot. reg. tab. 10. — China.

S. cantoniensis *Lour.*

S. chamædrifolia oblongifolia *Hort.*

S. flexuosa *Hort.* (non *Fisch.*).

var. fl. pleno. — L'hort. franç., 1855, tab. 11.

S. robusta *Hort.*

S. hypericifolia *L.* — *Ledeb.* Icon., tab. 428-430. — Europa.

S. foliosa *Poir.*

S. Pikoviensis *Aliq. Hort.* (non *Bess.*).

var. obovata.

S. crenata *Hort.* (non *Pall.* nec *Thunb.*).

— brevifolia.

S. acuta *Hort.*

S. acutifolia *Hort.* (non *Willd.*).

— oblongifolia major.

S. hypericifolia.
var. nutans *Hort.*
S. nutans *Hort.*
S. rhombifolia *Hort.*
— nana,
S. nana *Hort.*
S. decumbens *Hort*, (non *C. Koch.*).
S. cuneifolia *Hort.* (non *Wall.*).
S. californica *Hort.*
S. flagellata *Hort.*
— adiantifolia ?
S. adiantifolia *Hort.*
— vacciniifolia ?
S. vacciniifolia *Hort.* (non *Don.*).
S. flagelliformis *Hort.*
S. confusa *Hort.*
S. canescens *Don.* — Nepalia.
S. Pikoviensis *Hort.* (non *Bess.*).
S. Thunbergii *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 69. — Japon.
S. Thompsoni *Hort.*
S. prunifolia *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 70. — Japonia
S. Blumei *G. Don.* — Japonia.

SPECIES VEL VARIETATES DUBIÆ.

S. oblongata *Hort.*
S. fissa *Hort.*
S. formosa *Hort.*
S. Hookeri *Hort.*
S. mexicana *Hort.*
S. himalayea *Hort.*

EXOCHORDA Lindl.

E. grandiflora *Lindl.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — China borealis.
Spiræa grandiflora *Hook.* Bot. mag., tab. 4795.
Amelanchier racemosa *Fortune.*

NUTTALLIA Torr. et Gr.

N. cerasiformis *Torr.* et *Gr.* — *Hook.* et *Arn.* Bot. Beech. tab. 82. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — America septentrionalis.

Exochorda Davidiana *Baill.* Adans. IX, p. 149.

LINDLEYA H. B. K.

L. mespiloides *H. B. K.* — *Paxt.* Fl. gard. II, tab. 212. Rev. Hort. 1854, tab. 5. — Mexico.

DRYADEÆ

MARGYRICARPUS Ruiz et Pav.

M. setosus *Ruiz* et *Pav.* Fl. Per. I, tab. 8. — Chili.

Ancistrum barbatum *Lamk.*, Ill. I, p. 77.

CHAMÆBATIA Benth.

C. foliolosa *Benth.* — Bot. mag., tab. 5171. — California.

RUBUS Lin.

SPECIES EUROPEÆ.

R. Idæus *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 23. — Gallia.

R. cæsius *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 22. — Gallia.

R. fruticosus *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 22. — Gallia.

var. inermis (R. inermis *Willd.*).

— cruciata.

— laciniata. (R. laciniatus *Willd.* non *Wats.*).

— rotundifolia.

— variegata.

— pomponia flore pleno. — *Savi*, Fl. ital. tab. 28.

— flore semi-pleno. (R. discolor *Weihe*, Rubus tab. 28.).

— fructu viridi.

R. tomentosus *Willd.* — *Weihe*, Rubus tab. 8. — Gallia.

var. flore pleno.

SPECIES ASIATICÆ.

R. rosæfolius *Smith.* — Fl. des Ser. tab. 1714. — Ind. orient.
var. coronaria. — Bot. mag., tab. 1783.
R. sinensis *Hort.*

R. triphyllus *Thunb.* — Japonia.

R. cratægifolius *Bnge.* — *Reg.* Tent. fl. ussur. tab. 5. — China bor.

R. parvifolius *L.* — Bot. reg. tab. 496. — Chin. et Japon.
var. floribus roseis.

R. trifidus *Thunb.* — Japonia.
R. japonicus *Hort.*

R. phænicolasius *Maxim.* — Japonia.

SPECIES AMERICANÆ.

R. nutkanus *Moç.* — Bot. reg., tab. 1368. — California.

R. deliciosus *Torr.* — Bot. mag., tab. 6062. — Canada.

R. occidentalis *L.* — Canada.

R. leucodermis *Dougl.* — Orégon.
R. biflorus *Dene.* (non *Don.*).

R. spectabilis *Pursh*, Fl. bor. amer. I, tab. 16. — Amer. sept.
— flore subflavo.
— fructu flavo.

R. nobilis *Hort. angl.*

R. odoratus *L.* — *Mill.* Icon., tab. 223. — Amer. sept.
R. edulis *Hort.*
— flore albo.
— — roseo pleno.

R. canadensis *L.*

R. parviflorus *Nutt.*

R. Ristonii *Hort.*

R. Lawtonii *Hort.*

R. rosæflorus *Hook.* Icon., tab. 46. — Peruvia.

SPECIES AUSTRALASICA.

R. australis *Forst.* — *Hook.* Fl. Nov. Zel., I, tab. 44 — Nova Zelandia.

STIRPS INCERTA.

R. Hoffmeisterianus *Kth.* et *Bouché.* — Himalaya.

ROSACEÆ

POTENTILLA Lin.

P. fruticosa *L.* — Alpes et Europa septentrionalis.
var. dahurica. — Sibiria, Asia borealis et Amer. sept.
P. davurica *Nestl.*
P. floribunda *Pursh.*
P. tenuifolia *Schlcht.*

ROSA Lin.

R. microphylla *Roxb.* — (§. Platyrhodon *Dcne*, Bon jard. 1850). *Lindl.* Bot. reg. II tab. 119. — China.
R. bracteata *Wendl.* — *Redout.* Les Roses tab. 6. — China.
R. indica *L.* — *Redout.* Les Roses tab. 50. Vulg. *Rosier Thé.* — China.
R. fragrans *Redout.* et *Th.*
R. indica odoratissima *Lindl.*
Varietates hortenses multæ.
R. borboniana *Redout* — Vulg. *Rosier de l'île Bourbon.*
Varietates hortenses multæ.
R. hybrida *Hort.* (non *Schleich.*). — Vulg. *Rosier hybride remontant.*
Varietates hortenses multæ.
R. Noisettiana *Redout.* et *Th.* — Vulg. *Rosier de Noisette.*
R. indica *var.* Noisettiana *Ser.*
Varietates hortenses multæ.
R. multiflora *Thunb.* — *Redout.* Les Roses, tab. 70. — Japon
R. sinica *Ait.* — Bot. mag., tab. 2847. — Japonia.

R. diversifolia *Vent.* Jard. Cels tab. 35. — Vulg. *Rosier du Bengale.*
R. semperflorens *Curt.* Bot. mag., tab. 284.
R. bengalensis *Pers.*
R. indica *var.* semperflorens *Ser.*
var. viridiflora. — L'Hortic. franç., 1856 tab. 19.
R. Russeliana *Hort. Loud.* — Sibiria.
R. rubifolia *R. Br.* — Amer. sept.
R. hystrix *Lindl.* Monogr. tab. 17. — China et Japonia.
R. kamtschatica *Vent* Jard Cels. tab. 67. — Kamts. et Tauria.
R. horrida *Bess.*
R. rugosa *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 28. — Japonia.
R. ferox *Lawr.* (non *M. Bieb.*).
R. Regeliana *Ed. Andr.* Illustr. hortic. 1871.
var. fl. albo. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.
R. Zuccariniana *Lavall.* Arbor. segr. Ic. tab. ined. — Japon.
R. rugosa *var.* flore pleno *Sieb.*
R. acicularis *Lindl.* Monogr. tab. 8. — Japonia.
R. spinosissima *L.* — Fl. dan. III, tab. 398. — Europa.
R. coruscans *Link.* — Asia.
R. Fischeriana *Link.* — Rossia.
R. Fortuneana *Paxt.* Flow. gard., tab. 171. — China.
Varietates hortenses diversæ.
R. Eglanteria *L.* — *Sw.* Bot. tab. 463. — Asia occidentalis.
R. lutea *Willd.* — Bot. mag. tab. 363.
var. punicea. — Vulg. *Rosier capucine.*
— Persian yellow.
R. sulphurea *Ait.* — *Redout.* Les Roses, tab. 3. — Oriens.
R. rubrifolia *Vill.* — *Redout.* Les Roses, tab. 4. — Europa.
R. lutescens *Pursh.* — *Lindl.* Monogr. tab. 9. — Sibiria.
R. pimpinellifolia *L.* — *Pall.* Fl. ross. tab. 75. — Europa.
R. alba *L* — Fl. dan. VII, tab. 1215; Nouv. Duham. VII tab. 16 — Europa centralis.
R. alpina *L.* — *Redout.* Les Roses, tab. 113. — Alpes.

R. Banksiæ *R. Br.* — L'hort. franç. 1851, tab. 7. — China.
var. Fortunei.
R. anemoneflora *Lindl.* — China?
R. Lawrenceana *Sweet.* Bot. reg. tab. 588. — Vulg. *Rosier pompon.* — China.
R. sempervirens *L.* — Bot. reg. tab. 465. — Eur. austr.
R. moschata *Mill.*—*Redout.* Les Roses V, tab. 37. — Mauritania.
R. Ayreshirea *Lindl.* — Europa?
R. Manetti *Hort.*
R. portlandica *Hort.* — Vulg. *Rosier perpétuel; R. du roi*
Varietates hortenses multæ.
R. damascena *Mill.* — Syria.
R. centifolia *L.* — *Redout.* Les Roses tab. 1. — Vulg. *Rosier à cent-feuilles.* — Oriens?
Varietates hortenses multæ.
R. muscosa *Ait.* — *Guimp.* Fr. Holzgew. tab. 39. — Vulg *Rosier moussu.* (flor. simpl.).
Variet. hort. flor. pleno multæ.
R. gallica *L.* — *Jacq.* Fl. austr. tab. 198. — Vulg. *Rosier de Provins.* — Gallia.
R. lucida *Ehrh.* — *Redout.* Les Roses, tab. 11. — Amer. sept.
R. carolina *L.* — *Lindl.* Monogr. tab. 4. — Amer. sept.
R. cinnamomea *L.* — *Lindl.* Monogr. tab. 4. — Europa.
R. sericea *Lindl.* Monogr. tab. 12. — *Royale* Ill. Him. tab. 2. — Himalaya.
R. polyantha *Sieb. et Zucc.* — Japonia.
R. Iwara *Sieb.* et *Zucc* — Japonia.
R. Woodsii *Lindl.* Bot. reg. tab. 976. — Missouri.
R. californica *Lindl.* — California.
R. platyphylla *Rau* — Europa.
R. gracilis *Woods.* — Europa.
R. arvensis *Huds.* — Gallia.
R. Chaboissæi *Gren.* — Gallia.
R. arvina *Krock.* — Europa.
R. pendula *Redout*
R. hybrida *Schleich* — Europa.

R. Jundzilliana *Bess.* — Gallia.
R. macrantha *Desp.* — Gallia.
R. tenuicarpa *Deségl.* — Gallia.
R. arvatica *Pug.* — Gallia.
R. saxatilis *Stev.* — Tauria.
R. obtusifolia *Desv.* — Gallia.
R. bibracteata *Bast.* — Gallia.
R. uncinella *Bess.* — Gallia.
R. pendulina *Ait.* — Europa.
R. Deseglisei *God.* — Gallia.
R. Guepini *Desv.* — Gallia.
R. Reuteri *God.* — Gallia.
R. ramealis *Pug.* — Gallia.
R. Haberiana *Pug.* — Gallia.
R. obscura *Pug.* — Gallia.
R. Blondæana *Rip.* — Gallia.
R. malmundariensis *Lejeune* - *Redout.* Les Roses, tab. 74. — Europa.
R. dumetorum *Thuill.* — *Redout.* Les Roses, tab. 100. — Gallia.
R. caroliniana *Michx.* — America septentrionalis.
R. glandulosa *Bess.* — Gallia.
R. montivaga *Deségl.* — Gallia.
R. lugdunensis *Deségl.* — Gallia.
R. leucochroa *Desv.* Journ. II, tab. 15. — Gallia.
R. setigera *Michx.* — Amer. sept.
R. Brunonii *Lindl.* Monogr. tab. 14 — Nepalia.
R. Brownii *Spreng* — Fl. des serres IX, tab. 366 et 367.
R. sphærica *Gren.* — Gallia.
R. sepium *Thuill.* — Engl. bot. tab. 2653. — Gallia.
R. sylvatica *Rau.* — Gallia.
R. Boreana *Rip.*
R. similata *Pug.* — Gallia.
R. Camellia *Sieb.* — Japonia.
var. floribus albis.

POMACEÆ

MESPILUS Lin.

M. germanica *L.* Vulg. *Néflier.* —Nouv. Duham. IV, tab. 38.
— Europa.
var. macrocarpa.
— apyrena.
M. Smithii *DC.* Prodr. II, p. 633. —*Lavall.* Arbor. segrez., Icones, tab. ined.
M. grandiflora *Smith.* Exot. Bot. I, tab. 18.
Cratægus lobata *Desf.* — *Jaume St-Hil.*, Pom. franç., tab. 360.
C. acanea *Hort.*
C. intermedia *Hort.*
C. capitata Smithii *Hort.*

PYRACANTHA Spach.

P. coccinea *Rœm.* Vulg. *Buisson ardent* — Europa australis
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Mespilus Pyracantha *L.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 13, fig. 1.
var. fructibus luteis.
— Lalandii.
— implexa.
P. crenulata *Rœm.* — Nepalia.
Cratægus crenulata *Roxb.* — Bot. reg. 1844 tab. 52.
C. Pyracantha *var.* crenulata *Hort.*
Mespilus crenulata *Don.*

CRATÆGUS Lindl.

C. linearis *Pers.* — America septentrionalis.
C. Crus-galli *var.* linearis *L.*
C. stipulacea microphylla *Hort.*
Mespilus linearis *Desf.*

C. salicifolia *Medic.* — Amer. sept.
C. Crus-galli *var.* salicifolia *Hort.*
C. Boscii *Hort.*
Mespilus salicifolia *C. Koch.*

C. pyracanthifolia *Ait.* — America septentrionalis.
Mespilus Watsoniana *Spach.*
M. Crus-galli *Wats.* Dendr. brit., tab. 56. (non *Poir.*).

C. lucida *Mill.* — *Wangenh.* Beitr. 53, tab. 17. — Amer. sept.
C. Crus-galli *L.*
C. Crus-galli *var.* lucida *Regel.*
C. Crus-galli *var.* splendens *Ait.*
C. laurifolia *Medic.*
Mespilus Crus-galli *Poir.* (non *Wats.*).
M. lucida *Ehrh.*
Azarolus lucida *Hort.*
var. macracantha.
Azarolus macracantha *Hort.*

C. ovalifolia *Hornem.* — America septentrionalis.
C. Crus-galli ovalifolia *Lindl.* Bot reg., tab. 1860.
C. prunellifolia *Bosc.*
Mespilus prunellifolia *Poir.*

C. prunifolia *Bosc.* — Bot. reg., tab. 1868. — Amer. sept.
C. Crus-galli *var.* prunifolia *Aza Gray.*
C. ingestria *Lodd.*

C. Bosciana *Stend.* — America septentrionalis.
C. Bosceana *Hort.*
C. splendens *Hort.*
Mespilus Bosciana *Spach*, Suit. Buff., tab. 10, F.
M. badiata *Bosc.*

C. Fontanesiana *Lavall.* — Amer. sept.
Mespilus Fontanesiana *Spach* Suit. Buff., tab. 10, fig. K
M. Crus-galli *Desf.* (non *Lin.*).
M. glandulosa *Bosc* (non *Willd.*).
M. elliptica *Ait.*

C. leucophlæos *Mœnch.* Wereich, tab. 2. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — America sept.
C. pirifolia *Ait.* (non *Hort. Paris.*). Bot. reg. tab. 1860.

C. punctata *Jacq.* Hort. vind. I, tab. 281. — *Wats.* Dendr. brit., I, tab. 57. — America septentrionalis.
var. fructibus rubris.
C. punctata rubra *Hort.*
C. pirifolia *Hort. Paris.* (non *Ait.*).
Mespilus cuneifolia *Ehrh.*
— fructibus aureis.
C. punctata aurea *Hort.*
C. flava *Hort.* (non *Ait.*).
C. turbinata *Hort.* (non *Pursh.*).
C. triloba *Hort.* (non *Lindl.* Bot. reg.).
C. neapolitana *Hort.*
Mespilus pirifolia *Wats.* Dendr. brit., tab. 61.
M. cornifolia *Poir.*
Azarolus pirifolia *Hort.*

C. latifolia *Pers.* (non *Hort. Paris.*). — America sept.
Mespilus latifolia *Poir.*

C. stipulacea *Lodd.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Ic. tab. ined.
Mespilus stipulacea *Desf.*
M. Loddigesiana *Spach.*

C. mexicana *Moç.* et *Sess.* — Bot. reg., tab. 1910; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones tab. ined. — Mexico.

C. flava *Ait.* — Bot. reg., tab. 1939. — America sept.
C. glandulosa *Michx.* (non *Willd.*).
C. caroliniana *Poir.*
Mespilus flava *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit., tab. 59.
M. Michauxii *Pers.*
var. lobata *Lindl.* Bot. reg., tab. 1932.
C. lobata *Bosc* (ex *Lindl.*).
Mespilus lobata *Poir.* — Bot. mag. tab. 3142.
— Mac-Nabiana.
C. Mac-Nabiana *Hort.*

C. tomentosa *L.* — *Kerner* Ockan. Gew., tab. 699; *Lavall* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Amer. sept.

C. uniflora *Duroi* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones tab. ined. — Amer. sept.

Mespilus tomentosa *Poir.*

M. uniflora *Mœnch.*

C. parvifolia *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. tab. 65. — Am. sept.

Mespilus virginiana *Mill.*

M. parvifolia *Willd.*

C. betulæfolia *Lodd.* — *Lavall.* Arbor. segrez., Icones, tab. ined. — America septentrionalis.

C. Pinschaw *Hort.*

C. cuneata *Sieb.* et *Zucc* — Japonia.

C. spathulata *Hort.* (non *Michx.*, nec *Pursh.*).

C. atropurpurea *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.

C. alnifolia *Hort.* (non *Sieb.*).

C. glandulosa *Mœnch.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1012 — America septentrionalis.

Mespilus glandulosa *Willd.*

var. rotundifolia.

C. glandulosa *Lodd.* Bot. cab., tab. 1002.

C. glandulosa purpurea *Hort.*

C. viridis *Willd.*

C. virginiana Oxyacantha *Hort.*

Mespilus rotundifolia *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 58.

M. viridis *C. Koch.*

— flabellata.

Mespilus flabellata *Bosc.* — *Spach*, Suit. Buff. tab. 10.

— succulenta.

— macracantha *Lindl.* Bot. reg., tab. 1912.

C. macracantha *Lodd.*

C. coccinea *Lindl.* Bot. reg., tab. 1957 (non *Lin.*).

C. pruinosa *Wendl.*

C. sanguinea *Pall.* Flor. ross., tab. 11. — Sibiria.
C. purpurea *Loud.*
Mespilus sanguinea *Spach*, Suit. Buff., tab. 10.
M. purpurea *Poir.* — *Wats.* Dendr. brit., tab. 60.

C. Douglasii *Lindl.* Bot. reg., tab. 1810. — America sept.
C. sanguinea *var.* Douglasii *Torr.* et *Gray.*

C. coccinea *Wangh.* — Bot. mag., tab. 3432. — America borealis.
C. coccinea *L.* (ex parte.).
C. corallina *Loud.* (non *Desf.*).
Mespilus coccinea *Poir.* — *Wats.* Dendr. brit. I, 62.
var. cordata. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.
— macrocarpa.
C. macrocarpa *Hort.*

C. Wendlandi *Hort.* — America septentrionalis.
C. coccinea *var.* mollis *Torr.* et *Gray.*
C. coccinea *var.* pruinosa *Hort.*
C. subviliosa *Hort.*
C. sanguinea *var.* villosa *Rupr.* et *Maxim.*
C. pruinosa *Hort.* (non *Wendl.*).
Mespilus pubescens *Wendl.*
M. tiliæfolia *C. Koch.*

C. cordata *Mill.* — Bot. reg., tab. 1151. — America sept.
C. populifolia *Walt.*
Mespilus cordata *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 63.
M. corallina *Desf.*
M. caroliniana *Poir.*
M. acerifolia *Poir.*

C. Celsiana *Bosc.* — America septentrionalis.
Mespilus Celsiana *Dum.-Cours.*

C. nigra *Wald.* et *Kit.* Hung. rar. tab. 61. — Hungaria.
Mespilus nigra *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit., tab. 64.
M. tomentosa *Hort.* (non *Lin.*).

C. tanacetifolia *Pers.* — Bot. reg., tab. 1884. — Oriens.
Mespilus tanacetifolia *Poir.* — *Smith*, Exot. bot., tab. 58; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.
Cratægus apiifolia *Hort.* (non *Michx.*).
var. monstrosa.
Cratægus monstrosa *Hort.*
— glabra.
Cratægus glabra *Hort.* (non *Thunb.*).

C. odoratissima *Lindl.* Bot. reg. tab. 1885. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Oriens.
C. odorata *Bosc.*
C. orientalis *Pall.* — Bot. reg., tab. 1852.
Mespilus odoratissima *Andr.* Bot. rep., tab. 590.
M. orientalis *Poir.*

C. Azarolus *L.* — Rev. Hort. 1856, tab. 23; *Spach*, Suit. Buff., tab. 10, fig. M; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Oriens.
Mespilus Azarolus *Poir.* — Nouv. Duham. II, tab. 42.
Cratægus pectinata *Bosc.*

C. Aronia *Bosc.* — Bot. reg., tab. 1897; *Lavall.* Arbor. segrez Icones, tab. ined. — Oriens.
Mespilus Aronia *Willd.* — *Spach*, Suit. Buff., tab. 10, fig. B.
M. Azarolus *DC.* Flore franç. (non *Poir.*).

C. heterophylla *Flugg.* Ann. Mus. XIV, tab. 38. — Bot. reg. tab. 1847. — Amer. sept.
Mespilus heterophylla *Poir.*
Cratægus Azarolus *var.* heterophylla *Regel.*

C. maroccana *Lindl.* Bot. reg., tab. 1855. — Mauritania.

C. pentagyna *Wald.* et *Kit.* — Oriens.
Mespilus pentagyna *C. Koch.*

C. fissa *Bosc.* — America septentrionalis.
C. incisa *Hort.*
Mespilus fissa *Poir.*

C. Oliveriana *Bosc.* — Asia minor.

C. Oxyacantha *var.* Oliveriana *Lindl.* Bot. reg., tab. 1933.

C. melanocarpa *Bieb.*

C. platyphylla *Lindl.* Bot. reg., tab. 1874.

C. fissa *L.* (non *Poir.* nec *Lodd.*).

Mespilus Oliveriana *Dum--Cours.*

M. melanocarpa *Poir.* (non *Fisch.*).

C. Oxyacantha *L.* — *Jacq.* Fl. austr. III, tab. 292. Vulg. *Aubépine.* — Gallia.

C. oxyacanthoides *Thuill.* -- Bot. reg., tab. 1128.

Mespilus Oxyacantha *Willd.*

var. monogyna. — *Pallas* Fl. ross. tab. 12.

C. monogyna *Jacq.*

C. triloba *Pers.*

— flore albo.

— flore roseo. — Fl. des serres. XV, tab. 1509.

— flore puniceo.

— flore pleno albo.

— flore pleno roseo.

— flore pleno rubro. — Fl. des serres XV, tab. 1509.

— flore pleno puniceo. — Ann. de Gand , 1847

— flore pleno coccineo William Paul. — Illustr. Hort. XIV, tab. 536.

— eriocarpa.

— flexuosa.

— foliis tricoloribus.

— Gumperi bicolor. — Fl. des serres XVI, tab. 79.

— laciniata pendula.

— pectinata.

— præcox.

— quercifolia.

— spinosissima (horrida). -- Fl. des serres XIV, tab. 1468.

C. ferox *Hort.*

C. Oxyacantha.
var. stricta.
C. punctata stricta *Hort.*
Azarolus stricta *Hort.*
A. rubra stricta *Hort.*
— Sutheriana.
— tortuosa.

C. pinnatifida *Bge.* — *Regel.* Gartenfl., tab. 366; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — China borealis.
Mespilus pinnatifida *C. Koch.*

C. pteridifolia *Hort.* (non C. Oxyacantha *var.*). — Patr. ign.
C. chinensis *Hort.*
C. californica *Hort.*
C. Layii *Hort.*

C. piriformis *Jacques.* — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones., tab. ined. — Patria ignota.

COTONEASTER Medic.

C. vulgaris *Lindl.* — *Curt.* Lond. V, tab. 209. — Europa.
Cratægus Cotoneaster *Borkh.*
Mespilus Cotoneaster *L.*
Pirus Cotoneaster *Mœnch.*

C. melanocarpa *Lodd.* Bot. cab., tab. 1531. — Europa.
C. vulgaris *var.* melanocarpa.
Mespilus melanocarpa *Fisch.*

C. tomentosa *Lindl.* — *Guimp.* Holtz. tab. 105. — Europa.
Mespilus tomentosa *Willd.* (non *Lamk.*).
M. eriocarpa *DC.*

C. Fontanesii *Spach.* — Rev. hort. 1867. — Patria ignota.
Mespilus racemiflora *Desf.*

C. laxiflora *Jacq.* — Bot. mag., tab. 3519; Bot. reg. tab. 1305. — Sibiria.
C. vulgaris *var.* laxiflora *Lindl.*

C. uniflora *Bunge.* — *Ledeb.* Icon., tab. 269. — Sibiria.

C. bacillaris *Wall.* — Nepalia.

C. frigida *Wall.* — Bot. reg., tab. 1229. — Nepalia.

C. himalayensis *Hort.*

C. acuminata *Lindl.* Lin. Transact. XIII, tab. 9. — Nepalia.
Mespilus acuminata *Lodd.* Bot. cab., tab. 919.
C. sinensis *Hort.*
var. Simonsii.
C. Simonsii *Hort.*

C. affinis *Lindl.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1522. — Nepalia.
Mespilus affinis *Don*, Fl. nepal., p. 238.

C. nummularia *Fisch.* — Asia min., Mauritan.

C. buxifolia *Wall.* — *Wight*, Icon. plant. ind. rar. III, tab. 992. — Nepalia.
C. repens *Hort.*
C. Welheri *Hort.*
C. Royleana *Hort.*

C. rotundifolia *Wall.* — Bot. reg., tab. 1187. — Nepalia.
C. microphylla *var.* Uva-Ursi *Lindl.*
C. nepalensis *Hook.*
C. Hookeriana *Hort.*

C. microphylla *Wall.* — Bot. reg., tab. 1114. — Nepalia.

C. thymifolia *Booth.* — *Schlecht.* Linn., 1854, p. 546. — Nepalia.

STRANVÆSIA Lindl.

S. glaucescens *Lindl.* Bot. reg., tab. 1956. — Asia.
Cratægus glauca *Wall.*

ARIA Host.

A. nivea *Host.* — Engl. bot. XXVI, tab. 1858. — Europa.
Mespilus Aria *Scop.*
Pirus Aria *Ehrh.*
P. edulis *Willd.* (non *Wats.*).
Cratægus Aria *L.* — Fl. danica. III, tab. 301 et 302.
Sorbus Aria *Crantz.*

A. nivea

var. elliptica.

Aria latifolia *var.* elliptica *Hort.*

— latifolia. (non *Spach.*).

— longifolia.

Cratægus Hostii *Hort.* (non *Jacq.*).

C. Aria edulis *Hort.*

Sorbus macrophylla *Hort.*

S. Aria edulis *Hort.*

— glabrata.

Sorbus glabrata *Hort.*

— lanata.

Sorbus monstrosa macrophylla *Hort.*

— quercoides.

Sorbus quercoides *Hort.*

— undulata.

A. græca *Spach.* — Asia, Græcia.

Sorbus græca *Lodd.*

Pirus Aria *Sibth.* Flor. græc., tab. 474.

Sorbus nivea *Hort.* (non *Host.*).

S. argentea *Hort.*

S. Aria rotundifolia *Hort.*

A. obtusifolia *DC.* — Fl. danica, tab. 302. — Europa.

Pirus obtusata *Steud.*

Cratægus Aria obtusata *Spach.*

Aria rotundifolia græca *Hort.* (non A. græca *Spach.*).

Cratægus Aria latifolia rotundifolia *Hort.*

A. majestica *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.

Sorbier du Népaul *Aliq. Hort.*

A. flabellifolia *Spach.* — Asia minor.

Cratægus Aria flabelliformis *Spach.*

C. corymbosa *Desf.*

Pirus edulis *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 52, (non *Willd.*).

A. flabellifolia.

Sorbus corymbosa *Lodd.*

S. Aria rotundifolia *Aliq. Hort.* (non A. græca *Spach.*).

S. flabellata *Hort.*

A. lanata *Dcne.* — Nepalia.

Pirus lanata *Don.*

P. nepalensis *Lodd.*

Sorbus vestita *Lodd.*

S. nepalensis *Hort.*

Cratægus Aria cuspidata *Spach.*

Aria pseudo-vestita *Hort.*

A. latifolia *Spach.* — (Vulg. *Alisier de Fontainebleau*). — Europa.

Cratægus latifolia *Lamk.*

C. dentata *Thuill.*

Sorbus latifolia *Pers.*

var. rotundifolia.

A. Hostii *Host.* — Suecia, Delphinatus.

Sorbus Hostii *Jacq.*

Pirus sudetica *Tausch.*

Aronia Aria Chamæmespilus *Reichb.*

Sorbus arioides *Michal.*

S. Aria *var.* suecica *L.*

S. Mougeoti *Hort.* (non *Godr.* et *Soy. Wilm.*).

Cratægus Pseudaria *Spach.*

A. scandica *Dcne.* — Europa boreal.

Sorbus scandica *Fries.*

Cratægus Aria *6* et scandica *L.*

Pirus intermedia *Ehrh.*

Sorbus Mougeoti *Godr.* et *Soy. Wilm.* Acad. Stanisl. 1858. (non *Hort.*).

S. dentata *Hort.*

A. Chamæmespilus *Host.* Fl. aust. II, p. 8. — Europa.
Cratægus Chamæmespilus *Jacq.* Fl. austr , tab. 231.
Sorbus Chamæmespilus *Crantz*, Stirp. austr. II, tab. I.
Pirus Chamæmespilus *L.* — *Hartig.*, tab. 75.
Aronia Chamæmespilus *Pers.*
var. bicolor.
Sorbus Hostii *Hort.* (non *Host.*).

TORMINARIA DC.

T. Clusii *Ræm.* — Europa.
T. vulgaris *Schr.*
Pirus Torminalis *DC.* — Engl. bot. V, tab. 298.
Cratægus Torminalis *L.* — *Jacq.* Fl. austr., tab. 4'3
Nouv. Duham. IV, tab. 83.
Sorbus Torminalis *Crantz.*
var. pubescens.

SORBUS Tourn.

S. Aucuparia *L.* — *Crantz*, Austr., bot. tab. 1. — (Vulg. *Sorbier des oiseleurs.*) — Europa borealis.
Pirus Aucuparia *Gærtn.*
Mespilus Aucuparia *Scop.*
var. fastigiata.
— nana.
— pendula.
— saturejifolia.
— pubescens.
— variegata.
— Lord Fifes.
— fructu luteo.
S. lanuginosa *Kit.* — Hungaria.
Pirus lanuginosa *DC.*

S. americana *Pursh.* — America septentrionalis.
S. Aucuparia *Michx.* (non *L.*).
S. micrantha *Hort.*
Pirus americana *DC.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 54.

S. hybrida *L.* — (Vulg. *Sorbier de Laponie.*) — Europ. sept.
Cratægus fennica *Kalm.*
S. Aria et fennica *L.*
Pirus hybrida *Ehrh.* — Engl. bot., tab. 2331.
S. fennica *C. Koch.*
var. laciniata.
S. longifolia laciniata *Hort.*
— quercifolia *Hort.*
— monstrosa macrocarpa *Hort.*
— pinnatifida.
Aria pinnatifida *Hort.*
Pirus pinnatifida *Ehrh.*
S. sambucifolia *Hort.* (non *Cham.*).

CORNUS Spach.

C. domestica *Spach.* — Engl. bot. V, tab. 350. — Vulg. *Cormier.*) — Europa.
Pirus domestica *Smith.*
P. Sorbus *Gærtn.*
Sorbus domestica *L.* — Nouv. Duham., I, tab. 47.
S. sativa *Bauh.*
var. maliformis (macrocarpa.).
— microcarpa.
— piriformis.
— fructu cinereo.
— — fulvo.
— — rubro.

C. florentina *Dcne.* — Italia septentrionalis
Cratægus florentina *Savi.*
Pirus cratægifolia *Savi.*

C. trilobata *Dcne.* — Libanus.
Cratægus trilobata *Labill.* Icon. Pl. syr. rar., tab. 10.
Pirus (Eriobolus) trilobata *DC.*

MALUS Tourn.

M. communis *Lamk.* — Europa.
M. sylvestris *Mill.*
Pirus Malus *L.* — Flor. danica. XII, tab. 2118.
Poma paradisiaca *Ruel.*
M. baccata fructu maximo *Hort.*
var. paradisiaca. (Vulg. *Pommier Paradis.*).
M. paradisiaca *Borkh.*
M. præcox *Pall.*
M. pumila *Mill.*
— pusilla. (Vulg. *Pommier Doucin.*).
— monstrosa.
— upsaliensis.
— foliis contortis purpureis.
— — tricoloribus.
— aucubæfolia.
M. acerba *Mérat* — Nouv. Duham. VI, tab. 44. — Eur. bor.
Pirus acerba *DC.*
M. Ringo *Sieb.* — Japonia.
Pirus Ringo *Maxim.*
M. Sieversii *Ledeb.* — Sibiria.
Pirus Sieversii *Ledeb.*
M. spectabilis *Desf.* — Bot mag., tab. 267. — China.
M. sinensis *Dum-Cours.*
M. chinensis *Hort.*
Pirus spectabilis *Ait.* — *Wats.*, Dendr. brit. I, tab. 50.
var. Toringo.
Pirus Toringo *Sieb.*
P. Sieboldi *Regel.*

M. spectabilis.
var. Toringo major.
— Kaido.
— flore roseo pleno.
— Riversii.

M. baccata *Desf.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 10. — Sibiria.
Pirus baccata *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 51.
P. microcarpa *Wendl.*

M. orthocarpa *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia?
M. edulis *Hort.*

M. diversifolia *Bongard.* — America et Asia borealis.

M. coronaria *Mill.* — Bot. mag., tab. 2609]; *Michx.* Arb. am. III, tab. 10. — America sept.
Pirus coronaria *L.* — Bot. reg. tab. 651.
Malus odorata *Hort.*

M. prunifolia *Spach*, Suites Buff., tab. 9. — Sibiria?
Pirus prunifolia *Willd.* non *Desf.*) — Bot. mag. tab. 6158.
Malus hybrida *Loisel.* Nouv. Duham. VI, tab. 42. (non *Desf.*).
var. fructu dulci.
— pulverulenta.

M. heterophylla *Spach*, Suites Buff., tab. 8, fig. V. — Patria ignota.
Pirus heterophylla *Steud.*

M. Fontanesiana *Spach*, Suites Buff. tab. 8. — Sibiria?
M. hybrida *Desf.* (non *Loisel.*).
M. astracanica *Dum.-Cours.*
M. expansa *Hort.*
Pirus Fontanesiana *Steud.*

M. cerasifera *Spach*, Suites Buff., tab. 10. — Patria ignota.
M. baccata *Lois.* (non *Desf.*). — Bot. mag. tab. 6112.
M. prunifolia *Desf.* Hort. Paris. (non *Willd.*).
Pirus cerasifera *Tausch.*

M. cerasifera.
var. jenensis.
— fructu albo.
— — atropurpureo.
— — cœruleo.
— — nigro.
— — oblongo.
— — purpureo.
— — rubro.
— — striato.

M. denticulata *Lavall.* — China borealis?
M. baccata tatarica *Hort.*

M. dioica *Mœnch* Werzeich. Ausland., tab. 5.
Pirus dioica *Willd.*
P. divisa *Link.*
P. apetala *Mœnch.* Werzeich. Ausl. V. p. 247.

M. armeniacæfolia *Hort.*

Subgenus : CHLOROMELES *Dcne.*

M. angustifolia *Michx.* — Carolina.
M. sempervirens *Mill* — Nouv. Duham. VI, tab. 43.
Pirus angustifolia *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 132
M. coronaria *var.* angustifolia *Hort.*

PIRUS Tourn.

P. cordata *Desv.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus , tab. 3; *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined — Gallia.
P. azarolifera *Dur.*

P. longipes *Coss.* et *Dur.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus. tab. 4. — Algeria.

P. communis *L.*—*Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 1. — Europa.
var. fascicularis.
— pendula.
— præcox.
— monstrosa.
— linearis.
— quercifolia.
— variegata.
— Achras.
P. Achras *Gærtn.* Fruct., tab. 87.

P. parviflora *Desf.* Ann. Mus. XII, tab. 4. — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 13. — Europa oriental.
P. eriopleura *Reichb.*
P. amygdaliformis *Vill.*
P. cuneifolia *Guss.* Pl. rar., tab. 39.
P. nivalis *Lindl.* (non *Jacq.*).
P. salicifolia *Lois.* (non *Pall.* nec *DC.*).
P. sylvestris *Magn.*

P. oblongifolia *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 14. — Gallia merid.

P. glabra *Boiss.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 11. — Syria.

P. sinaica *Thouin.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 15.— Asia?

P. Michauxii *Bosc.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 16. — Asia?
P. præcox *Hort.*

P. elæagrifolia *Pall.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus , tab. 17. — Taurica.
P. orientalis *Horn.*
P. persica *Pers.*
P. salicifolia *Kotschy* (non *Pall.* nec *DC.*).

P. nivalis *Jacq.* Fl. austr. II, tab. 107. —Vulg. *Poirier Sauger.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus , tab. 21. — Asia min.
P. salvifolia *DC.*— Bot. reg., tab. 1482.

P. salicifolia *Pall.* Flor. ross., tab. 9. — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 12. — Caucasus.

P. canescens *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 19.

P. Pashia *D. Don.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 12. — Nepalia.

P. variolosa *Wall.*

P. heterophylla *Hort.*

P. nepalensis *Hort.* (non *Lodd.*).

P. Balansæ *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 6. — Lasistan.

P. sinensis *Lindl.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 8; *Lavall.* Arbor. segrez. Icon , tab. ined. — China.

P. chinensis *Roxb.* — Gard. chron. 1875, p. 457, cum Icon. xyl.

P. communis Sieboldi *Hort.*

P. ussuriensis *Maxim.*

P. Simoni *Carr.* Rev. hort. 1872. p. 28. fig. 3.

Varietates hortenses japonicæ multæ.

STIRPES HYBRIDÆ.

P. malifolia *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 32.

P. Polwilleriana *J. Bauh.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 31.

P. Pollveria *L.* — *Spach*, Suites Buff., tab. 8.

P. Bollwilleriana *DC.* — Bot. reg., tab. 1437.

STIRPES INCERTÆ.

P. sphærocarpa *Wender.*

P. candidissima *Hort.*

P. lutea *Hort.*

P. pellucida *Hort.*

P. pubescens *Hort.*

P. scandinavica *Hort.*

POURTHIÆA Dcne.

P. arguta *Dcne* Nouv. Arch. Mus. X, tab. 10. — Himalaya.
Photinia arguta *Wall.*

ERIOBOTRYA Lindl.

E. japonica *Lindl.* Bot. reg., tab. 365. — China et Japonia
Cratægus Bibas *Lour.*
Mespilus japonica *Thunb.* — *Vent.* Malm., tab. 19.
var. latifolia.

HETEROMELES J. Rœm.

H. arbutifolia *Rœm.* — California.
Cratægus arbutifolia *Ait.*
Photinia arbutifolia *Lindl.* Bot. reg., tab. 491.

PHOTINIA Lindl.

P. serrulata *Lindl.* — China.
Cratægus glabra *Thunb.* — Bot. mag., tab. 2105.
var. rotundifolia *Hort.*
P. dentata *Hort.*
P. glabra rotundifolia *Hort.*
— rubra.

PERAPHYLLUM Nutt.

P. ramosissimum *Nutt.* — Orégon.

ARONIA Pers.

A. melanocarpa *Nutt.* — America septentrionalis.
Pirus arbutifolia *Nutt.*
P. melanocarpa *Willd.*
Mespilus arbutifolia *var.* melanocarpa *Michæ*
A. arbutifolia *Pers.*
A. pubens *Spach.* — Patria ignota.
Pirus pubens *Lindl.*
P. capitata *Hort.*
A. grandifolia *Ell.* — America septentrionalis?
Pirus grandifolia *Lindl.* Bot. reg., tab. 1151.

A. arbutifolia *Ell.* (non *Pers.*). — America septentrionalis.
var. rubra.
Pirus arbutifolia *L. fil.* — Bot. mag., tab. 3668.
A. pirifolia *Pers.*

A. floribunda *Spach.* — China.
Pirus floribunda *Lindl.* Bot. reg., tab. 1006.

A. sorbifolia *Spach.* (Stirps hybrida).
Pirus hybrida *Mœnch* Weirs., tab. 6.
P. spuria *DC.* — Bot. reg., tab. 1196.
Sorbus spuria *Pers.*
Cratægus sorbifolia *Hort.*
Mespilus sorbifolia *Poir.* Encycl., tab. 4.

AMELANCHIER Medic.

A. vulgaris *Mœnch.* — Europa.
Mespilus Amelanchier *L.* — *Jacq.* Fl. austr. III, tab. 300.
Pirus Amelanchier *Willd.* — Bot. mag., tab. 2430.
Aronia rotundifolia *Pers.*
A. Amelanchier *Rchb.*
Cratægus rotundifolia *Lamk.* — *Mœnch* Weissenst, tab. I,
Sorbus Amelanchier *Crantz.*
Cratægus Amelanchier *Desf.*
A. spicata *Hort.*

A. integrifolia *Boiss.* — Asia occident.
A. japonica *Hort.* (non *Miq.*).

A. asiatica *Endl.* — Japonia.
A. canadensis *var.* japonica *Miquel.*
Aronia asiatica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 42.

A. alnifolia *Nutt.* — America septentrionalis.
Aronia alnifolia *Nutt.*
Amelanchier canadensis *var.* alnifolia *Walp.*
A. montana *Hort.*
A. japonica *Hort.* (non *Miq.*).

A. sinensis *Hort.*?

A. ovalis *Lindl.* — America septentrionalis.
Pirus ovalis *Willd.*
Aronia ovalis *Pers.*
Mespilus canadensis *var.* rotundifolia *Michx.*
A. sanguinea *Lindl.* Bot. reg. 1171.
Cratægus spicata *Lamk.*

A. Botryapium *DC.* — America septentrionalis.
Mespilus canadensis *L.*
M. canadensis *var.* cordata *Michx.*
Cratægus racemosa *Lamk.*
Pirus Botryapium *Lin. fil.* — *Guimpel* Holzger., tab. 79.
Aronia Botryapium *Pers.*
A. arborea *Michx.* Arb. for. III, tab. 11.
A. canadensis *var.* Botryapium *Walp.*
A. lancifolia *Hort.*
A. canadensis *Hort.*

A. oblongifolia *Nutt.* — America septentrionalis.
Mespilus canadensis *var.* obovalis *Michx.*
A. canadensis *var.* oblongifolia *Walp.*
A. intermedia *Spach.*

A oligocarpa *Nutt* — America septentrionalis.
Mespilus canadensis *var.* oligocarpa *Michx.*
A. canadensis *var.* oligocarpa *Walp.*

A. florida *Lindl.* Bot. reg. tab. 1589. — America bor.
A. uniflora *Hort.*

RAPHIOLEPIS Lindl.

R. indica *Lindl.* Bot. reg., tab. 652. — China.
R. pheostemon *Lindl.*
Cratægus indica *L.* — Bot. mag., tab. 1726.

R. rubra *Lindl.* Bot. reg., tab. 400. — China.
Cratægus rubra *Lour.*

R. salicifolia *Lindl.* Bot. reg. tab. 652. — Rev. hort. 1874. — China.

R. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 83 — Bot. mag. tab. 550. — Japonia.

R. integerrima *Hook.* et *Arn.*

R. ovata *Hort.*

CHÆNOMELES Lindl.

C. japonica *Lindl.* — Japonia.

Cydonia japonica *Pers.* — *Savi* Fl. ital. I, tab. 13.

C. lagenaria *Duham.*

Pirus japonica *Thunb.* — Bot. mag., tab. 692.

Malus japonica *Hort.*

var. Bugeauti.

— fastigiata.

— flore roseo.

— gigantea.

— Maillardi.

— macrocarpa.

— Maulei.

Pirus Maulei *Mast.* Gard. Chron. 1874, pag. 159 cum. icon.

— umbilicata. — Fl. des serres V, tab. 510-512.

Pirus umbilicata *Hort.*

DOCYNIA Dcne.

D. indica *Dcne.* Nouv. archiv. Mus. X, tab. 8. — Sikkim.

Cydonia indica *Spach.*

Pirus indica *Wall.* Pl. asiat. rar. II, tab. 173.

CYDONIA Tourn.

C. sinensis *Thouin*, Ann. Mus. XIX, tab. 8. et 9. — Bot. reg. tab. 905. — China.

Pirus sinensis *Poir.* (non *Lindl.*).

C. chinensis *Hort.*

C. vulgaris *Tourn.* — *Kerner* Gener., tab. 214 et 215. — Europa australis.
C. europæa *Savi.*
Pirus Cydonia *L.*
var. macrocarpa (Vulg. *Cognassier d'Angers*).
— maliformis. — *Duham.* Arb. I, tab. 83.
— oblonga (piriformis). — *Duham.* Arb. I, tab. 83.
— Bourgeana.
— algeriensis.
— constantinopolitana.
C. lusitanica *Mill.* (Vulg. *Cognassier de Portugal*) — Armenia et Boukharia.
C. latifolia Lusitanica *Tourn.*

CALYCANTHEÆ

CALYCANTHUS Lin.

C. floridus *L* — Bot. mag., tab. 503; Nouv. Duham. I, tab. 47. — Florida.
C. sterilis *Walt.*
var. ovata. — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined.
— inodora.
— asplenifolia.
C. lævigatus *Willd.* — Bot. reg., tab. 481. — Amer. sept.
C. ferax *Michx.* — Herb. amat. III, tab. 172 *bis.*
C. fertilis *Andr.* Bot. reposit., tab. 539 (non *Walt.*).
C. nanus. *Lois.* Nouv. Duham. I, tab. 48.
var. angustifolia.
— elongata.
C. glaucus *Willd.* — *Guimp.* Fr. holzg., tab. 5. — Amer. sept.
C. fertilis *Walt.* (non *Andr.*). Bot. reg., tab. 404.
C. nana *Hort.* (non *Lois.*).
C. occidentalis *Hook.* et *Arn.* — Bot. mag., tab. 4808. — Amer. sept.
C. macrophyllus *Hort.*

CHIMONANTHUS Lindl.

C. fragrans *Lindl.* — Hort. Kew. II, tab. 10. — Japonia.
Calycanthus præcox *L.* — Bot. mag., tab. 466; Nouv. Duham. I, tab. 49.
var. grandiflora *Lindl.* Bot. reg., tab. 451.
— lutea.
— japonica.
— parviflora.

GRANATEÆ

PUNICA Tourn.

P. Granatum *L.* — *Poit.* et *Turp.* Arb. fruit., tab. 22
— Regio mediterr.
var. albescens. — *Andr.* Bot. repos., tab. 96.
— — flore pleno.
— flava.
— — flore pleno.
— Legrellei. (flore variegato.).
— prolifera.
— rubra. — Bot. mag., tab. 1832.
— — flore pleno. — *Ehret.*, tab. 71.
— nana. — Bot. mag., tab. 934.
P. nana *L.*
P. sinensis *Hort.*

TAMARISCINEÆ

TAMARIX Lin.

T. africana *Poir.* — Europ. merid.
T. anglica *Webb.* — *Hook* Journ. 1841, tab. 15. — Europa occidentalis.

T. gallica *L.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 291. — Europa orientalis.
T. canariensis *Willd.*
T. chinensis *Lour.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab., 71. — China et Japonia.
T. gallica *var.* chinensis *Ehrnb.*
T. japonica *Thunb.*
T. plumosa *Hort.*
T. tetrandra *Pall.* — Tauria.
var. purpurea.
T. indica *Willd.* — India orientalis.
T. parviflora *DC.* — Fl. des serres XIX, tab. 898.
T. tetrandra *Griseb.* (non *Pall.*).

MYRICARIA Desv.

M. germanica *Desv.* — Europa.
Tamarix germanica *L.* — Fl. danica. II, tab. 234.
Tamariscus germanicus *Scop.* — *All.* Fl. pedem. II, p. 87; Icon. taurin. II, tab. 142.

ALANGIEÆ

MARLEA Roxb.

M. begoniæfolia *Roxb.* — Bot. reg., tab. 91. — China et Himalaya.
M. bryoniæfolia *Hort.*
M. platanifolia *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia

LYTHRARIEÆ

NESÆA Comm.

N. salicifolia *H. B. K.* — *Rchb.* Hort. tab. 166. — Mexico.

LAGERSTRŒMIA Lin.

L. indica *L.* — Bot. mag., tab. 405; Herb. amat. II, tab. 122. — India.

var. japonica.
— rosea.
— rubra.

PHILADELPHEÆ

PHILADELPHUS Lin.

P. coronarius *L.* — Bot. mag., tab. 391; Nouv. Duham. I, tab. 20. — Eur. austr.

var. nana.
P. parviflorus *Hort.*
— pyramidata.
— cochleata.
— cucullata.
— pendulifolia.
— dianthiflora.
— flore semipl. candidissimo.
— nivea.

P. inodorus *L.* — Bot. mag., tab. 1478. — Carolina.
P. colombarius myrtiflorus *Hort.*
P. cordatus *Hort.*
P. cordifolius *Hort.*
P. coronarius nivalis *Hort.*
P. multiflorus *Hort.*
P. floribundus *Hort.* (non *Schrad.*)
P. Grahami *Hort.*
P. Zeyheri multiflorus *Hort.*
Deutzia corymbosa *Hort.*

var. foliis variegatis.

P. globularis *Hort.*

P. lucidus *Hort.*

P. Satzumi *Sieb.* — *Paxt.* Fl. gard. Icon. xyl. 188. — Japonia

P. coronarius, *var.* Satzumi *Maxim.*

P. Satzumanus *Hort.*

P. Ledebourii *Hort.*

var. Schrenkii.

P. Schrenkii *Rupr.*

P. Godohokerii *C. Koch.* Dendr. I, p. 346. — Amer. sept?

Deutzia Godohokerii *Hort. Booth.*

P. hirsutus *Nutt.* — Bot. reg. XXIV, tab. 14. — America septentrionalis.

P. Zeyheri *Schrad.* — America borealis.

P. trinervius *Hort.* (non *Schrad.*).

P. gracilis *Hort.*

P. verrucosus *Schrad.* — America bor.

P. grandiflorus *Lindl.* Bot. reg., tab. 570. (non *Willd.*).

P. mexicanus *Schlchtd.* — Bot. reg. XXVIII, tab. 38. — Mexico.

P. latifolius *Schrad.* — America septentrionalis,

P. pubescens *Lois.* Herb. amat., tab. 208.

P. grandiflorus *Willd.* (non *Lindl.*). — America septentrionalis.

Deutzia sinensis *Hort.*

var. speciosissima.

— foliis variegatis.

P. nepalensis variegatus *Hort.*

P. laxus *Schrad.* (non *Hort.*). — Bot. reg. XXV, tab. 39. — America septentrionalis.

P. humilis *Hort.*

P. speciosus *Schrad.* — Bot. reg., tab. 2002. — America septentrionalis.

P. grandiflorus laxus *Hort.*

P. Yokohama *Sieb.* — Japonia.

P. sinensis thyrsiflorus *Hort*

P. triflorus *Wall.* — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined. — Nepalia.

P. Keteleêri *Hort.*

P. Gordonianus *Lindl.* Bot. reg. XXV, tab. 32 — California.
P. columbeanus *Hort.*

P. Deyrolleanus *Lavall.* — Europa orientalis.

P. californicus *Benth.* — California.
P. lucidus *Hort.*
Deutzia californica *Hort.*

P. Lewisii *Pursh.* — America septentrionalis.

P. pubescens *Rafin.* — America septentrionalis.
P. globulus *Hort.*

P. myrtifolius *Hort.*

DEUTZIA Thunb.

D. scabra *Thunb.* Fl. jap., tab. 24. — *Sieb.* et *Zucc.* fl. jap., tab. 7; Bot. reg., tab. 1718. — Japonia.
var. foliis variegatis.

D. crenata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 6. — Japonia.
var. fl. puniceo.
— fl. purpureo pleno. — *Morren*, Belg. hort. 1864, tab. 19.
— fl. albo pleno. — Fl. des serres XVIII, tab. 1850.
D. candidissima *Hort.*
— foliis variegatis.
— Fortunei.
D. Fortunei *Hort.*
— Sieboldi.
D. Sieboldi *Hort.*

D. gracilis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. I, tab. 8. — L'Hort. franç., 1851., tab. 5, *Morren*, Belg. hort. I, tab. 53. — Japon.
var. foliis variegatis.

D. dentata *Hort.*

D. staminea *R. Br.* — *Wall.* plant. asiat. II, tab. 191. — India orientalis.

DECUMARIA Lin.

D. barbara *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 403. — Carolina.
D. Forsythia *Michx.*
D. radicans *Mœnch.*
D. sarmentosa *Bosc.*

MYRTACEÆ

EUGENIA Lin.

E. apiculata *DC.* — Chili.
Myrtus apiculata *Bert.*
E. Ugni *Hook.* et *Arn.* — Bot. mag., tab. 4626; Fl. des serres VII, tab. 734. — Chili.
Myrtus Ugni *Mol.*

MYRTUS Lin.

M. communis *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 43. — Europa australis.
var. flore pleno.
— italica.
— mucronata.
— romana.

NITRARIACEÆ

NITRARIA Lin.

N. Schoberi *L* — *Pall.* Fl. ross., tab. 50. — Rossia

PASSIFLOREÆ

PASSIFLORA Juss.

P. cærulea *L.* — Bot. mag. tab. 28; L'Hort. franç. 1864, tab. 1. — America sept.

P. Lauranseana *Lavall.* — Louisiana.

GROSSULARIEÆ

ROBSONIA Berl.

R. speciosa *Spach.* — California.

Ribes speciosum *Pursh.* — Bot. mag., tab. 3530; Bot. reg., tab. 1557.

R. stamineum *Smith.*

R. fuchsioides *Berl.* Mem. Genev. III, tab. 3.

R. Hookeri *Hort.*

RIBES Lin.

§. GROSSULARIA *Mill.*

R. lacustre *Poir.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 881. — Amer. sept

R. oxyacanthoides *Michx.* (non *L.*).

R. grossularioides *Michx.*

R. echinatum *Dougl.*

R. Menziesii *Hort.* (non *Pursh.*).

R. Menziesii *Pursh.* — Bot. reg. XXXIII, tab. 50. — America septentrionalis.

R. ferox *Smith.*

R. hystrix *Nutt.*

R. Grossularia *L.* — Engl. bot. XVIII, tab. 1293. — Europa.

Grossularia vulgaris *Spach.*

var. inermis.

R. Uva-crispa *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 58.— Europ. et Asia sept.
R. Uva-crispa *L.*
R. spinosum *Lamk.*
var. spinosissima.
— macrocarpa.
— foliis variegatis.

R. aciculare *Smith.—Ledeb.* Fl. alt. Icon., tab. 230.—Sibiria.

R. divaricatum *Dougl.* — Bot. reg., tab. 1359 — America septentrionalis.
R. gracile *Hort.* (non *Michx.*).

R. subvestitum *Hook.* et *Arn.* — Bot. mag., tab. 4931. — California.

R. rotundifolium *Michx.* — Carolina.
R. gracile *Pursh.* (non *Michx.*).

R. gracile *Michx.* (non *Pursh.* nec *Hort.*). — America sept.

R. Cynosbati *L.— Jacq.* Hort. vind., tab. 123.—Amer. sept.

R. triflorum *Willd.* Hort. berol., tab. 61. —Amer. sept.
R. Cynosbati *Hort.* (non *L.*).
R. Hogtoni *Hort.*

R. niveum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1692. —Amer. sept.

R. cereum *Dougl.*— Bot. mag., tab. 3008; Bot. reg., tab. 1263. — Pensylvania.
R. inebrians *Lindl.* Bot. reg., tab. 1471.
R. pumilum *Nutt.*

§. BERISIA.

R. orientale *Desf.* — Syria.
Berisia orientalis *Spach.*
R. punctatum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1298.
R. resinosum *Sims*, Bot. mag., tab. 1583.

R. saxatile *Pall.* — *Ledeb.* Icones, tab. 239. — Sibiria.
R. Diacantha *var. Spach.*

R. Diacantha *Pall.* Fl. ross. tab. 66. — Sibiria.

R. opulifolium *Hort. Lond.* — Rossia.

R. alpinum *L.* — Fl. danica. VI, tab. 968. — Europa.
R. dioicum *Mœnch.*
var. sterilis.
R. sterile *Hort.* (Specim. masc.).
R. opulifolium *Hort.*
R. recurvum *Hort.*
— laciniata.

§. RIBESIA.

R. triste *Pall.* — Sibiria.
R. altaicum *Lodd.*
R. atropurpureum *C. A. Mey.*
R. petræum *Wulf.* in *Jacq.* Misc. austr. II, tab. 3. — Europa.
R. rigens *Hort.* (non *Michx.*).
R. glaciale *Wall.* — Nepalia.
R. procumbens *Pall.* Flor. ross., tab. 65. — Dauria.
R. multiflorum *Kit.* — Bot. mag., tab. 2368. — Europ. orient.
R. spicatum *Schultz.* (non *Robs.*).
R. vitifolium *Host.*
R. prostratum *L'Hérit.* Stirp., tab. 2. — America sept.
R. glandulosum *Ait.*
R. rigens *Michx.* (non *Hort.*).
R. laxiflorum *Rich.*
R. trifidum *Michx.*
R. rubrum *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 57; *Dcne.* Jard. fruit. Mus. — Gallia.
var. laciniata.
— variegata.
— hortensis (dulcis).
— sylvestris.
— alba.
— carnea.
— macrocarpa.
— striata. (*Gloire des Sablons.*) — L'hort. franç. 1856, tab. 15
R. Gayanum *Walprs.* — Chili.
Rebis Gayana *Spach.*
Ribes Chilense *Hort.*
R. Hodgesii *Hort.*

§. BOTRYOCARPUM.

R. nigrum *L.* — Fl. danica. IV, tab. 556. — Asia et Eur. bor.

var. nana.
— aconitifolia (acerifolia).
— heterophylla.
— reginæ.
— variegata.
— Bactoni.
R. Bactoni *Hort.*
— fructu albo.
— — flavescente.
— — viridi.
— — magno.

R. floridum *L'Hérit.* — America septentrionalis.
R. pensylvanicum *Lamk.*
R. americanum *Mill.*

§. CALOBOTRYA.

R. malvaceum *Smith.* — *Sweet.* Fl. gard. II, tab. 340. — Calif.
R. sanguineum *var.* malvaceum *Hort.*

R. sanguineum *Pursh.* — Bot. mag., tab. 3335 — Amer. sept.
Calobotrya sanguinea *Spach.*

var. fol. laciniatis.
— fl. pleno. — Fl. des serres I, tab. 44.
— albida. — *Paxt.* Mag. of bot. X, p. 217.
— splendens.
— atrovirens.
— Fontaneti.

R. Gordonianum *Lem.* Fl. des serres II, tab. 165.
R. Loudoni *Hort.*
R. Bactoni *Aliq. Hort.*

R. Billardi *Hort.*

§. CHRYSOBOTRYA.

R. fragrans *Lodd.* Bot. cab., tab. 1533 — America sept.
R. palmatum *Desf.*
R. odoratum *Hort.*

R. revolutum *Lindl.* — America septentrionalis.
R. palmatum aureum *Hort.*
R. aureum *Pursh.* — Bot. reg., tab. 125.
Chrysobotrya revoluta *Spach.* Ann. sc. nat. IV, tab. 1.
var. intermedia.
Chrysobotrya intermedia *Spach.* Ann. sc. nat. IV, tab. 1.
R. oregoni *Hérincq*, L'Hort. franç. 1872, tab. 8. — Orégon.
R. revolutum *var.* oregoni *Hort.*
R. tenuiflorum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1574. — Amer. sept.
R palmatum fœmineum *Hort.*
R. longiflorum *Hort.*
Chrysobotrya Lindleyana *Spach.* Ann. sc. nat. IV, tab. 1.
R. Benthami *Hort.*

SAXIFRAGEÆ

ESCALLONIA Mutis.

E. macrantha *Hook.* Bot. mag., tab. 4473. — Chili.
E. organensis *Hook.* Bot. mag., tab. 4272. — Brasilia austr.
E. pterocladon *Hook* Bot. mag., tab. 4827. — Patagonia.

ITEA Lin.

I. virginica *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 9. — Carolina.
I. caroliniana *Hort.*

JAMESIA Torr. et Gr.

J. americana *Torr.* et *Gr.* — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones., tab. ined. — Nov. Mexico.

PLATYCRATER Sieb. et Zucc.

P. arguta *Sieb* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 27. — L'hort. franç. 1870, tab. 7. — Japonia.

HYDRANGEA Lin.

§. SPECIES AMERICANÆ.

H. arborescens *L.* — Bot. mag., tab. 437. — Pensylvania.
H. arborea *Hort.*

H. cordata *Pursh* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 42. — Carolina.

H. nivea *Michx.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 43.
H. radiata *Walt.*
H. glauca *Hort.*
var. canescens.
H. canescens *Hort.*

H. quercifolia *Bartram.* It. ed. germ., tab. 7. — Florida.
H. radiata *Smith.* Icon. pict., tab. 12.

H. urticæfolia *Hort.*

§. SPECIES ASIATICÆ.

H. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 53. — Jap. et China.
H. sinensis *Hort.*
var. macrophylla.
H. fimbriata *Sieb.*
— elegans maculata.
— latifolia albo-variegata.
— cærulescens.
— floribus albis.
— — roseis.
— floribunda (Impératrice Eugénie). — An species propria ? — Rev. hort. 1868, p. 469.
— rosalba. — Fl. des serres XVI, tab. 1649 et 1650.
— versicolor.

H. japonica.
var. Asizai.
H. Asizai *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. I, tab. 51.
— Asizai foliis variegatis.
— Hortensia.
H. Hortensia *DC.*
H. hortensis *Smith*, Icon. pict., tab. 12.
— Hortensia foliis variegatis.
— — variabilis.
H. Otaksa *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 52.— Fl. des serres XVII, tab. 1732-33. — Japonia.
H. Lindleyana *Aliq. Hort.*
H. paniculata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 61. — Japonia.
var. grandiflora. — Fl. des serres XVI, tab. 1665.
H. Thunbergii *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 58. — Japonia.
H. acuminata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 56 et 57. — Rev. hort. 1874, p. 91. — Japonia.
H. involucrata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 63 et 64. — Japonia.
H. pubescens *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. tab. 61. — Japonia.
H. stellata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 59 — Japonia.
var. prolifera (flore pleno).— Fl. des serres XVIII, tab. 1890.
H. Cyanema *Nutt.* — Bot. mag., tab. 5058. — Himalaya.
H. cyanea *Hort.*
H. altissima *Wall.* Tent. Fl. nepal. II, tab. 50.— Himalaya.

CARDIANDRA Sieb. et Zucc.

C. alternifolia *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. I, tab. 65 et 66. — Japonia.
Hydrangea alternifolia *Sieb.*

NEILLIA Don.

N. thyrsiflora *Don.* — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined. — Nepalia.

UMBELLIFERÆ

BUPLEURUM Lin.

B. fruticosum *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 14; Nouv. Duham. VI, tab. 34 — Europa meridionalis.

ARALIACEÆ

ARALIA Tourn.

A. spinosa *L.* — *Commel.* Hort. amst. tab. 47. — Carolina.

A. chinensis *L.* — China.

A. japonica *Hort.* (non *Thunb.*).

var. canescens.

A. canescens *Hort.* (non *Sieb.* et *Zucc.*).

— intermedia.

A. intermedia *Hort.*

— elata.

Dimorphanthus elatus *Miquel.*

D. mandshuricus *Maxim.*

A. canescens *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

A. hybrida *Hort.*

A. Mitsde *Sieb.* — Japonia.

A. pentaphylla *Thunb.* — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.

Panax spinosum *L.*

var. foliis variegatis. — Fl. des serres XX, tab. 2079.

OREOPANAX Dcne et Planch.

O. xalapense *Dcne* et *Planch.* — Mexico.

Aralia xalapensis *H. B. K.*

A. mexicana *Hort.*

ACANTHOPANAX Dcne et Planch.

A. ricinifolium *Dcne* et *Pl.* Rev. hort. 1854. —Japon. sept?
Panax spinosissimum *L. fil.*
Aralia ricinifolia *Sieb.* et *Zucc.*
A. Maximowiczii *Van-Htte.* Fl. des serres, XX, tab. 2067.

FATSIA Dcne et Planch.

F. japonica *Dcne* et *Pl.* — Japonia.
Aralia Sieboldi *Henders.*
A. japonica *Thunb.* (non *Hort.*).
var. undulata.
— albo-marginata.
— aureo-variegata.
— aureo-reticulata. — Illustr. hort. 1870, tab. 22.

HEDERA Lin.

H. Helix *L.* — *Bull.* Herb., tab. 133. — Gallia.
var. algeriensis.
— — foliis variegatis.
— canariensis.
— — foliis variegatis.
— chrysocarpa.
H. Helix *Wall.*
H. poetica *C. Bauh.*
— hibernica.
— — elegans.
— — foliis variegatis.
— japonica.
H. japonica *Sieb.*
— japonica foliis variegatis.
— Rœgneriana.
H. caucasica *Hort.*
H. colchica *C. Koch.*

H. Helix.
var. cochleata.
— conglomerata.
— dentata.
— donerailensis.
— lanceolata.
— palmata.
— sagittæfolia.
— foliis argenteis.
— — aureis.
— — maculatis.
— — tricoloribus.
— pulchella.
H. rhombea *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
var. variegata.

HAMAMELIDEÆ

HAMAMELIS Lin.

H. virginica *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 114. — Canada.
H. androgyna *Walt.*
H. caroliniana *Walt.*
H. dioica *Walt.*
H. monoica *Walt.*
H. arborea *Sieb.* — Gard. chron. 1874, p. 187. — Japon.
H. japonica *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

PARROTIA C. A. Mey.

P. persica *C.A. Mey.* — Bot. mag., tab. 5743. — Persia.
Hamamelis persica *DC.*

FOTHERGILLA Lin.

F. alnifolia *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 26. — Virginia.
F. Gardeni *Michx.*
F. tomentosa *Hort.*

DISTYLIUM Sieb. et Zucc.

D. racemosum *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. I, tab. 10. — Japonia.
var. foliis variegatis.

CORYLOPSIS Sieb. et Zucc.

C. spicata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. tab. 19; — Bot. mag. tab. 5458; Fl. des serres XX, tab. 2135. — Japonia.
C. arborea *Sieb.* — Japonia.

RHODOLEIA Hook.

R. Championi *Hook.* Bot. mag. 4509. — Fl. des serres, VI, tab. 561. — China.

EUPTELEA Sieb. et Zucc.

E. polyandra *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. tab. 72. — Japonia.

GARRYACEÆ

GARRYA Dougl.

G. elliptica *Dougl.* Bot. Reg., tab. 1686; L'hort. franç. 1865. tab. 13. — California.
G. macrophylla *Benth.* — Mexico.
Fadyenia macrophylla *Endl.*
G. Fadyeni *Hook.* Icones, tab. 333. — Amer. merid.
Fadyenia Hookeri *Griseb.*

STIRPS HYBRIDA.

G. elliptico-Fadyeni *Thur.*
G. Thureti *Carr.*

CORNEÆ

BENTHAMIA Lindl.

B. japonica *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 16. — Japonia.
Cornus japonica *Thunb.*?
B. chinensis *Hort.*

B. fragifera *Lindl.* Bot. reg., tab. 1579. — Belg. hortic., II, tab. 62. — Nepalia.
Cornus capitata *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 214.

CORNUS Tourn.

C. alternifolia *L. fil.* — *L'Hér.* Corn., tab. 6. — America septentrionalis.
C. alaternifolia *Hort.*

C. paniculata *L'Hér.* Corn., tab. 5.— America sept.
C. racemosa *Lamk.*
C. fœmina *Mill.*
C. citrifolia *Hort. Paris.*
C. citrina *Hort.*

C. stricta *Lamk.*— *L'Hérit.* Corn., tab. 4. —Amer. sept.
C. fastigiata *Michx.*
C. canadensis *Hort. Paris.*

C. sanguinea *L.* — Fl. danica, III, tab. 481. —Europa.
C. fœmina *Lob.* Icon. II, tab. 160.
var. variegata.

C. alba *L.* — *Pall.* Fl. ross. tab. 34. — Sibiria, America septentrionalis.
C. stolonifera *Michx.*
C. tatarica *Mill.*

C. australis *C. A. Meyer.* — Dahuria et Tauria.

C. sibirica *Lodd.* — Sibiria.
var. variegata.

C. sericea *L'Hér.* Corn., tab. 2. — Sibiria et America sept.
C. cærulea *Lamk.*
C. lanuginosa *Michx.*
C. Amomum *Mill.*
C. ferruginea *Hort. Paris.*
var. variegata.
— asperifolia.
C. circinnata *L'Hér.* Corn., tab. 3. — America sept.
C. rugosa *Lamk.*
C. virginiana *Hort. Paris.*
C. Theleyriana *Hort.*
C. acuminata *Hort.*
C. japonica *Hort.* — Japonia?
C. Mas *L.* — Europa.
C. mascula *L'Hér.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 151.
var. angustifolia.
— crispa.
— fructu luteo.
— heterophylla.
— lanceolata.
— macrocarpa.
— nana.
— variegata.
C. officinalis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 50. — Asia.
C. florida *L.* — *Michx.* Arb. am. III, tab. 3; L'Hort. franç. 1843, tab. 14. — Carolina.
C. Nuttalli *Audubon*, Birds of Amer., tab. 367. — Nutt. North-Am. sylv. II, tab. 97. — Amer. sept.

AUCUBA Thunb.

A. japonica *Thunb.* Icones Fl. jap., tab. 12 et 13. — Japonia.
var. arborea mascula.
— — fœmina.
— bicolor mascula.

A. japonica.
var. elegans fœmina.
— grandidenta maculata fœmina.
— — — viridis.
— hermaphrodita.
— latimaculata.
— — fœmina.
— longifolia.
— — mascula.
— — fœmina.
— — maculata mascula.
— — striata.
— fructu luteo fœmina.
— grandidentata mascula.
— macrophylla.
— — dentata fœmina.
— maculata fœmina.
— — mascula.
— marginata aurea.
— ovata fœmina.
— — mascula.
— — aureo-punctata mascula.
— picta fœmina.
— pygmea mascula.
— salicifolia Sieboldi fœmina.
— — Standishi fœmina.
— sulphurea mascula.
— — fœmina.
— viridis mascula.
— — longifolia mascula.
— — — fœmina.

A. himalayca *Hook.* Illustr. Himalaya, tab. 12. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Asia.
— mascula et fœmina.

MONOPETALÆ

LONICEREÆ

SAMBUCEÆ.

SAMBUCUS Tourn.

S. canadensis *L.* — America septentrionalis.
S. virginica *Hort.*
S. racemosa *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 66. — Europa.
var. spectabilis.
— laciniata.
— variegata.
S. pubens *Michx.* — America septentrionalis.
S. pubescens *Pers.*
S. glauca *Hort.* (non *Nutt.*).
S. californica *Carr.*
var. Fontaneti.
S. nigra *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 65. — Europa?
S. vulgaris *Lamk.*
var. monstrosa (fasciata.). — Vulg. *Sureau à tiges plates.*
— stricta. (S. pyramidata *Hort.*).
— plantierensis.
— heterophylla.
— laciniata.
— — foliis variegatis.
— rotundifolia.
— foliis luteis.
— — marginatis.
— — pulverulentis.
— — tricoloribus.

S. nigra.
var. foliis variegatis.
— flore pleno.
— roseflora.
— semperflorens.
— — flore pleno.
— fructu albo.
— virescens.

VIBURNEÆ.

VIBURNUM Lin.

V. Tinus *L.* — Bot. mag. tab. 38. — Europa meridionalis.
V. lauriforme *Lamk.*
var. rotundifolia.
— — foliis variegatis.
— lucida.
V. lucida *Mill.*
— — Towardi.
— — variegata.
— variabilis.
— foliis variegatis.
V. rugosum *Pers.* — Bot. mag., tab. 2082. — Canaria.
V. Tinus *var.* stricta *Ait.*
V. rigidum *Vent.* Malm., tab. 98.
V. strictum *Link.*
V. Sieboldi *Hort.*
V. Awafuski *Lindl.* — China.
V. odoratissimum *Ker.* — Bot reg., tab. 456.
var. foliis variegatis.
V. suspensum *Hort.*
V. caucasicum *Hort.*
V. pirifolium *Poir.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 22. — Pensylv.
V. prunifolium *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 38. — Carol.

V. Lentago *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 21. — Carolina.
V. acuminatum *Hort.* (non *Wall.*).

V. nudum *L.* — Bot. mag., tab. 2281; *Mill.* Icon., tab. 274. — Carolina.
V. amethystinum *Hort.*
V. anglicum *Hort.*

V. obovatum *Walt.* — *Lodd.* Bot., tab. 1476. — Carolina.
V. cassinoides *Michx.* (non *Lin.*).

V. punicifolium *Desf.* — Carolina.
V. obovatum *var.* punicifolia *Desf.*

V. lævigatum *Willd.* — Carolina.
V. asiaticum *Hort.* (non *Wall.*).

V. mexicanum *Hort.* — Mexico?

V. odoratissimum *Ker.* — Bot. reg., tab. 456. — China.
V. chinense *Zeyh.* in coll. Hort. rip. (non *Hook.*).

V. nepalense *Hort.* — Asia?

V. Keteleêri *Hort.*

V. himalayense *Hort.* — Asia?
V. Fortunei *Hort.*

V. Lantana *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 103. — Europa.
V. tomentosum *Lamk.* (non *Thunb.* nec *Oudem.*).
var. Burejætica.
V. Burejæticum *Regel* et *Herd.*
— lanceolata.
— foliis punctatis.
— minor foliis variegatis.

V. lantanoides *Michx.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1370. — America septentrionalis.
V. grandifolium *Smith.*
V. Lantana *var.* grandifolia *Ait.*
V. L. indica *Hort.*
V. indicum *Hort.*
V. Lantana *var.* canadensis *Pers.*

V. cotinifolium *Don.* — Bot. reg., tab. 1650. — Nepalia.
V. multratum *Hort.*

V. stellulatum *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 169. — Nepalia.

V. tomentosum *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. tab. 38. — Japonia.

V. macrocephalum *Fortune.* — Flore des serres III, tab. 263-264. — China.

V. dilatatum *Thunb.* — Bot. mag., tab. 6215. — Japonia.

V. plicatum *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 37; Bot. reg. 1847, tab. 51. — Japonia.
V. dentatum *Thunb.* (non *Lin.*).

var. tomentosa.
V. tomentosum *Oudem.* (non *Thunb.* nec *Lamk.*).

V. macrophyllum *Thunb.* — Japonia.

V. dahuricum *Pall.* Fl. ross. II, tab. 58. — Dahuria.
Lonicera mongolica *Pall.* It. III, p. 424.

V. grandiflorum *Wall.* ? — Nepalia.

V. erosum *Thunb.* — Japonia.

V. reticulatum *Sieb.* — Japonia.

V. acerifolium *L.* — *Vent.* Hort. Cels, tab. 72. — Carolina.

V. orientale *Pall.* Fl. ross. tab. 58, fig. H. — Iberia.

V. Oxycoccos *Pursh.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1123. — Am. sept.
V. Opulus *var.* americana *Ait.*
V. trilobum *M. Bieb.*
V. opuloides *Muhl.*

V. edule *Pursh.* — America septentrionalis.
V. Opulus *var.* edulis *Michx.*

V. Opulus *L.* — Fl. Danica. IV, tab. 661. — Europa.
V. lobatum *Lamk.*

var. Hartwegi *Hort.* (non V. Hartwegi *Bth.*).
— nana.
— pygmæa.
— pygmæa crispa *Hort.*
— foliis variegatis.

V. Opulus.
var. sterilis (Vulg. *Boule de neige*).
— floribus roseis.

CAPRIFOLIACEÆ.

DIERVILLA Tourn.

D. acadiensis *Tourn.* — America septentrionalis.
D. canadensis *L.*
D. lutea *Pursh.*
D. Tournefortii *Michx.*
D. humilis *Pers.* — Bot. mag., tab. 1796.
Lonicera Diervilla *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 18.
D. sessilifolia *Buckl.—Lavall.* Arb. segr. Ic. t. ined.— Carol.
D. splendens *Hort.*
D. floribunda *Sieb.* et *Zucc.* Fl. Jap., tab. 32. — Japonia.
Weigela floribunda Hort. — Rev. hortic. 1874.
D. multiflora *Lem.* Illustr. Hort., tab. 383.
var. flavo-fusca *Sieb.*

§. Weigela (Weigela *Thunb.*).

D. japonica *Thunb.* Fl. jap., tab. 16. — Japonia.
D. versicolor *Sieb* et *Zucc.* Fl. Jap., tab. 33.
var. longifolia.
— aurea.
D. rosea *Herincq*, L'Hort. franç. 1854, tab. 21. — China.
Weigela rosea *Lindl.* Journ. of. Hort. Soc. I, tab. 6.
var. nana.
— — aurea.
— striata.
— Desboisi.
— Kosteriana.
— Sieboldi.
— Stelzneri.
— aureo variegata.
— intermedia.

D. hortensis *Sieb* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 29. — Japonia.
var. floribunda.
— rubra.
— — foliis marginatis.
— nivea.
— alba. — Rev. hortic. 1861.
D. grandiflora *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 31. — Japonia.
D. amabilis *Hort.* — Fl. des serres, VIII, tab. 855.
var. Grœnewegeni.
— Isolinæ. — Fl. des serres XIV, tab. 1445.
— striata. — Fl. des serres XIV, tab. 1446.
— versicolor.
— Van-Houttei. — Fl. des serres XIV, tab. 1447.
— foliis variegatis — Fl. des serres XII, tab. 1189.
D. purpurata *Hort.*

STIRPES HYBRIDÆ?

D. extus coccinea *Hort.*
D. Lavallei *Lemoine.* — L'Hort. franç. 1870.
D. Lemoinei *Hort.*
D. Lowii *Hort.*

LONICERA Lin.

§. *Caprifolium.*

L. Caprifolium *L.* — Engl. bot., tab. 799. — Europ. australis.
Caprifolium hortense *Lamk.* Encycl., tab. 150.
C. italicum *Rœm* et *Sch.*
L. hortensis *Hort.*
var. rubella.
L. Caprifolium italicum *Schmidt.*
L. italica flore rubro *Hort.*
— rubella flore piloso.

L. Caprifolium.
var. pallida.
L. hortensis pallida *Hort.*
L. Caprifolium *var.* præcox. — *Duham.* Arb. I, tab. 48.
L. italica flore albo *Hort.*
L. Caprifolium flore albo *Hort.*
L. Magnevillei *Hort. Gall.*
— verna.
L. verna *Hort.*
— villosa.
— erosa.
— variegata.
L. hortensis erosa variegata.
— atrosanguinea.

L. Etrusca *Santi*, Viagg. tab. 1. — Gartenflora., tab. 38. — Europa meridionalis.
Caprifolium etruscum *Rœm.* et *Sch.*
L. atrosanguinea *Hort.*

L. Periclymenum *L.*— Fl. danica., VI, tab. 908.—Europa.
Caprifolium sylvaticum *Lamk.*
var. germanica *Ait.*
L. serotina *Ait.*
Periclymenum germanicum *Mill.*
— belgica.
— quercifolia.

L. pubescens *Sweet* Exot. Fl., tab. 27. — Amer. sept.
L. Goldii *Spreng.*
L. villosa *Hort.*

L. hirsuta *Eaton.* — Bot. mag., tab. 3103. — Amer. sept.
L. orientalis *Hort.* (non *Lamk.*).
L. Douglasi *Hort.* (non *DC.*).
L. Frazeri *Hort.*
var. flore pallido.
L. flava, L'Hort. franç. 1863, tab. 20, (non Bot. mag.).
L. occidentalis *Hort.* (non *Steud.*).

L. hirsuta.
var. involucrata.
L. involucrata *Hort.* (non *Banks.*).
L. parviflora *Lamk.* — America septentrionalis.
L. gibbosa *Michx.*
L. dioica *L.* — Bot. reg. II, tab. 138.
L. glauca *Hort.*
L. prolifera *Hort.*
Caprifolium parviflorum *Pursh.*
C. bracteosum *Michx.*
C. glaucum *Mœnch.*
L. hispida *Pall.* — *Ledeb.* Icon., tab. 212. — Sibiria.
L. grata *Ait.* — America septentrionalis.
L. virginiana *Marsh.*
L. macrophylla *Hook.* — America septentrionalis.
L. occidentalis *Steud.* — America septentrionalis.
Caprifolium occidentale *Lindl.* Bot. reg., tab. 1457.
C. ciliosum *Dougl.*
var. Plantierensis. — Illustr. hortic. 1871, tab. 86.
L. sempervirens *Ait.*—Bot. mag., tab. 781 et 1753. —America septentrionalis.
L. coccinea *Pers.*
Caprifolium sempervirens *Mill.*
var. major. —Bot. mag., tab. 781; Fl. des serres, XI, tab. 1120.
— minor. — Bot. mag., tab. 1753.
— fuchsioides.
— Browni. — Fl. des serres, XI, tab. 1133.
— Shepherdi.
— Youngii.
— superba (speciosa). — Fl. des serres, XI, tab. 1128.
L. coccinea superba *Hort.*
— sanguinea.
L. coccinea sanguinea *Hort.*
L. punicea *Sims* Bot. mag., tab. 2469. — Patria ignota.

L. confusa *DC.* — China et Japonia.
L. japonica *Thunb.* — *Andr.* Bot. repos., tab. 583.
L. macrantha *DC.*

L. chinensis *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 117. — China.
L. japonica *Thunb.* (non *Andrew.*).—Bot. reg., tab. 70.
L. flexuosa *Lodd.* Bot. cab., tab. 1037.
L. sinensis flexuosa *Hort.*

L. diversifolia *Wall.* — Bot. reg. XXXIII, tab. 33. — Nepalia.

L. brachypoda *DC.* — Japonia.
var. repens.
— reticulata. — Belg. hort. 1871, tab. 5.

L. discolor *Hort.* (non *Lindl.*).

L. affinis *Hort.*?

§§. *Chamæcerasus et Xylosteum.*

L. tatarica *L.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 36; Bot. reg., tab. 31. — Tataria.
Xylosteum tataricum *Dum.-Cours.*
var. nana.
— angustifolia.
— microphylla.
— præcox.
— albiflora.
— — foliis acutis.
— — foliis obtusis.
— virginalis grandiflora.
— bicolor.
— discolor.
— elegans.
— gracilis.
— rubra.
L. sibirica *Hort.*
— rubra grandiflora.

L. tatarica.
var. speciosa.
— splendida.
— baccis luteis.

L. ciliata? *Mühl.* — *Torr.* New-York, tab. 42. — Amer. sept.
L. tatarica *Michx.* (non *L.*).
L. canadensis *Rœm.* et *Sch.*
Xylosteum ciliatum *Pursh.*

L. orientalis *Lamk.* — Iberia.
L. caucasica *Pall.* — *Jaub.* et *Spach* Illustr., tab. 71.

L. Xylosteum *L.* — Fl. danica V, tab. 808; Engl. bot. XIII tab. 916. — Europa.
Caprifolium dumetorum *Lamk.*
var. baccis nigris.
L. melanocarpa *Hort.*

L. caprifolioides *C. Koch.* — Patria ignota.
Xylosteum Philomelæ *Hort.*
var. Magnevillei.

L. uniflora *Blm.* — Japonia.
L. acuminata *Hort.* (non *Wall.*).
L. philomenæ *Aliq. Hort.*

L. chrysantha *Turcz.* Bull. Soc. nat. Mosc. XI, 93. — Ussuri
Xylosteum gibbiflorum *Rupr.* et *Max.*

L. Ruprechtiana *Reg.* Gartenfl. XIX, tab. 645. — Regio Amur.
L. gibbosa *Hort.* (non *Willd.* nec *Michx.*).

L. Regeliana *Kirschn.* — Rossia.

L. iberica *M. Bieb.* Cent. pl. rar., tab. 13. — Iberia.

L. Mouraviæ *Hort.*

L. pyrenaica *L.* (non *Pall.*). — Nouv. Duham. I, tab. 115. — Gallia.
Caprifolium pyrenaicum *Lamk.*

L. pubens *Hort.*
L. Aucheri *Hort.*

L. cærulea *L.*—Nouv. Duham. I, tab. 17; Bot. mag., tab. 1965. — Europa et Amer. sept.
Caprifolium cæruleum *Lamk.*
Xylosteum Solonis *Eat.*
var. præcox.

L. Maximowiczii *Rupr.* Bull. Acad. Petersb. XV, 370. — Sibiria.

L. Standishii *Lesc.* L'Hortic. franç. 1862, tab. 10. — China.
L. fragrantissima *Carr.* (non *Paxt.*). — Fl. des serres XIII, tab. 63.

L. fragrantissima *Paxt.* (non *Carr.*). Fl. gard. III, tab. 75. China.
L. Niagarelli *Hort.*

L. segreziensis *Lavall.* — Patria ignota.
L. diversifolia *Hort.* (non *Wall.*).

L. Webbiana *Wall.* — Himalaya.

L. alpigena *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 16. — Europa.
Caprifolium alpinum *L.*

L. microphylla *Willd.* — *Ledeb.* Icon. tab., 213. — Sibiria orientalis.

L. altaica *Pall.* Fl. ross., tab. 37. — Sibiria.

L. Ledebourii *Eschsch.*—Gartenflora, tab. 64. — California.

L. spectabilis *Hort.* — China?

SYMPHORICARPOS Dill.

S. racemosus *Michx.* — Dict. sc. nat., tab. 136. —Am. sept.
Symphoria racemosa *Pursh.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 7; Bot. mag., tab. 2211.
S. leucocarpa *Hort.*
var. macrophylla.
— macrocarpa.
S. macrocarpa *Hort.*
— glauca.
S. glauca *Hort.*
— foliis variegatis.

S. montanus *H. B. K.* Nov. gen., tab. 296. — The botanist., tab. 20. — Mexico.
S. mexicanus *Hort.*
S. microphyllus *H. B. K.* — Bot. mag., tab. 4975.
Symphoria mexicana *Lodd.*
S. vulgaris *Michx.* — *Guimpel* Fr. Holzgew., tab. 133. — America septentrionalis.
S. parviflora *Desf.*
S. à petites fleurs rouges.
var. foliis aureis.
— glomerata.
S. glomerata *Pursh.*

LEYCESTERIA Wall.

L. formosa *Wall.* — Bot. reg. 1839, tab. 2. — Nepalia.

ABELIA R. Brown.

A. rupestris *Lindl.* Bot. reg. 1846, tab. 8. — Japonia.
var. grandiflora alba *Veitch.*
A. triflora *R. Br.* — Rev. hortic. 1870-71. — Himalaya.
A. uniflora *R. Br.* — Belg. hortic. I, p. 338. — China.
A. floribunda *Dcne* — Fl. des serres II, tab. 1846. — Mexico.
Vesalia floribunda *Mart.* et *Galeot.*
A. chinensis *R. Br.* — China.

RUBIACEÆ

CEPHALANTHUS Lin.

C. occidentalis *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 54; Herb. amat. IV, tab. 272. — America septentrionalis.
var. angustifolia.

PINCKNEYA Michx.

P. pubens *Michx.* Arb. am. II, tab. 24. — Fl. des serres XIX, tab. 13. — Georgia.
P. officinalis *Hort.*

PÆDERIA Lin.

P. fœtida *L.* — *Lamk.* Dict., tab. 166. — China et Japonia.

SERISSA Comm.

S. fœtida *Comm.* — China et Japonia.
Lycium fœtidum *L.*
L. japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 17. — Bot. mag., tab. 361.

COMPOSITÆ

IVA Lin.

I. frutescens *L.* — *Lamark.* Illustr., tab. 166. — Florida.

SWAMMERDAMIA DC.

S. Antennaria *DC.* — Van-Diemen.

OZOTHAMNUS R. Br.

O. rosmarinifolius *DC.* — Van-Diemen.

ARTEMISIA Lin.

A. Abrotanum *L.* — *Hayne* II, tab. 22. — Europa australis. *var.* tobolskiana.

A. arborescens *L.* — Oriens.
Absinthium arborescens *Gærtn.*—*Sibth.* Fl., gr., tab. 856.
A. italica *Ræusch.* — Italia.
A. procera *Willd.* — Europa orientalis.
A. Roelzii *Ortgies.* — Nov.-Mexico.

SANTOLINA Lin.

S. Chamæcyparissus *L.* — Europa australis.
S. viridis *Willd.* — Europa australis.

EURYBIA Cass.

E. erubescens *DC.* — Nov.-Hollandia.
Aster ilicifolius *Cunng.*
E. ilicifolia *Hort.*

OLEARIA Mœnch.

O. Haastii *Hook.* — Nov.-Zeland.
Eurybia parvifolia *Hort. angl.*

BACCHARIS Lin.

B. halimifolia *L.* — America septentrionalis.
— lutescens *Hort.* (est individ. mascul.).

GESNERIACEÆ

MITRARIA Cav.

M. coccinea *Cav.* — Bot. mag., tab. 4466; Fl. des serres IV, tab. 385. — Chili.

VACCINIEÆ

VACCINIUM Lin.

V. Vitis-idæa *L.* — Fl. danica. I, tab. 40. — Europa.
V. punctatum *Lamk.*
V. Myrtillus *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 19. — Europa.

V. pensylvanicum *Lamk.* — Bot. mag., tab. 3434. — Pensylvania.
V. tenellum *Ait.*

V. obovatum *Hort.*

V. stamineum *L.* – *Pluk.* Alm., tab. 339, fig. 3. — America septentrionalis.

OXYCOCCUS Pers.

O. macrocarpus *Pers.* — Bot. mag., tab 25. — America septentrionalis.
Vaccinium macrocarpum *Ait.*
V. Oxycoccos, *var.* oblongifolia *Michx.*

O. palustris *Pers.* — Europa.
Vaccinium Oxycoccos *L.* — Fl. danica, I, tab. 80.

O. erectus *Pursh.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 31. — Carolina.

ERICACEÆ

ARBUTUS Lin.

A. Unedo *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 21. — Eur. occ'd.
var. crispa.
— myrtifolia.
— quercifolia.
— salicifolia.
— flore rubro.
— — pleno.
— Croomii.

A. Andrachne *L.* — Bot. mag., tab. 2024; Nouv. Duham. tab. 22. — Asia min.
var. floribunda.
— longifolia.
— magnifica.

A. Andrachne.
var. Rollissoni.
— rotundifolia.
A. procera *Dougl.* — Bot. reg., tab. 1753. — Amer. sept.
A. andrachnoides *Link.*
var. turbinata.
A. oleifolia *Hort.*
A. formosa *Hort.*

ARCTOSTAPHYLOS Gal.

A. Uva-ursi *Spreng.* — Europa.
Arbutus Uva-ursi *L.* — Fl. danica, I, tab. 33.

PERNETTYA Gaud.

P. microphylla *Gaudich.* — America australis.
Andromeda prostrata *Cav.* Icon. VI, tab. 562.
A. Myrsinites *Lamk.*
P. mucronata *Gaudich.* — Magell.
Arbutus mucronata *L.* fil. — Bot. mag., tab. 3093.
P. speciosa *Hort.*

CLETHRA Gærtn.

C. alnifolia *L.* — Nouv. Duham. V, tab. 129. — Virginia.
C. dentata *Ait.*
C. tomentosa *Lamk.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 39. — Virginia.
C. alnifolia *var.* tomentosa *Michx.*
C. incana *Pers.*
C. pubescens *Willd.*
C. glauca *Hort.*
C. paniculata *Ait.* — Carolina.

C. acuminata *Michx.* — *Bart.* Fl. Bor. am. III, tab. 71. — Carolina.

C. barbinervis *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

EPIGÆA Swartz.

E. repens *L.* — *Loisel.* Herb. amat., tab. 239; Belg. hort. IX, p. 321. — Canada.

GAULTHERIA Kalm.

G. procumbens *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 113. — America septentrionalis.

G. Shallon *Pursh.* — Bot. mag., tab. 2843. — Amer. sept

ZENOBIA D. Don.

Z. speciosa *D. Don.* Brit. fl. gard., tab. 330. — Virginia.

Andromeda pulverulenta *Loisel.* Nouv. Duham. I, tab. 193.

A. cassinefolia *Vent.* Jard. Cels, tab. 60.

A. speciosa *Michx.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 126. *var.* pulverulenta.

A. pulverulenta *Bartr.* — Bot. mag., tab. 667.

A. dealbata *Lindl.* Bot. reg., tab 1010.

A. cassinefolia *var.* pulverulenta *Vent.* Malm., tab. 79.

A. speciosa glauca *Wats.* Dendr. brit. II,, tab. 126.

Z. floribunda *DC.* — Carolina.

Andromeda floribunda *Pursh.* — Bot. mag., tab. 1566.

Leucothoe floribunda *D. Don.*

PIERIS D. Don.

P. formosa *D. Don.* — Nepalia.

Andromeda formosa *Wall.* — *Wigth*, Ic. Ind or. IV, tab. 1200.

P. japonica *Don.* — *Loud.* Arb. p. 115, fig. 913. — Japonia.
Andromeda japonica *Thunb.* Fl. jap., tab. 22.

P. Rolissoni *Hort.*
Andromeda Rolissoni *Hort.*

LYONIA Nutt.

L. ligustrina *DC.* — America septentrionalis.
Andromeda ligustrina *Mühl.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1123.
A. globulifera *Hort.*
A. pilulifera *Hort.*
A. paniculata *Willd.*

L. frondosa *Nutt.* — Virginia.
Andromeda frondosa *Pursh.*
L. frondosa *Don.*

L. rubiginosa *G. Don.* ? — Insula Sancti Thomasu.
Andromeda pubescens *Poir.*
A. rubiginosa *Pers.*

OXYDENDRON DC.

O. arboreum *DC.* — Florida.
Andromeda arborea *L.* — *Michx.* Arb. am. III. tab. 7; Bot. mag., tab. 905.
Lyonia arborea *G. Don.*

LEUCOTHOE G. Don.

L. axillaris *G. Don.* — *Loud.* Arb. p. 1113, fig. 908. — Carol.
Andromeda axillaris *Ait.* — *Lamk.* Encycl., tab. 365; Nouv. Duham. I, tab. 39.

L. coriacea *DC.* — Carolina.
Andromeda lucida *Lamk.*
A. coriacea *Ait.* — Bot. mag., tab. 1045.
A. nitida *Michx.*
A. marginata *Loisel.* Nouv. Duham. I, tab. 40.
Lyonia marginata. *Don.*

L. Mariana *DC.* — Florida.
Andromeda Mariana *L.* — Bot. mag., tab. 1579 ; Nouv. Duham. I, tab. 37.
Lyonia Mariana *Don.*

ANDROMEDA Lin. (partim).

A. polifolia *L.*—Fl. danica I, tab. 54; Nouv. Duham I, tab. 38 — Europa.
var. latifolia *Ait.*
A. canadensis *Hort.*
A. americana *Hort.*
— glaucophylla.
A. glaucophylla *Link.*

A. glauca *Hort.*
A. pensylvanica *Hort.*
A. augusta *Hort.*

CASSANDRA D. Don.

C. calyculata *Don.* — Europ. boreal.
Andromeda calyculata *L.* — Bot. mag , tab. 1286; Nouv. Duham. I, tab. 41.

C. angustifolia *Don.* — *Loud* Arb. p. 1108, fig. 897. — Carol
A. angustifolia *Pursh.*
A. calyculata *var.* angustifolia *Ait.*
A. crispa *Desf.*
C. calyculata ? *Hort.*

CASSIOPE D. Don.

C. tetragona *Don.* — Europa borealis.
Andromeda tetragona *L.* — Fl. danica, VI, tab. 1030; Bot. mag., tab. 3181.

CALLUNA Salisb.

C. vulgaris *Salisb.* — *Curt.* Fl. lond. III, tab. 84. — Europa.
C. Erica *DC.*
Erica vulgaris *L.*
var. dumosa.
— nana.
— Foxii.
— Alportii.
— Serli.
— variegata.

ERICA Lin.

E. cinerea *L.* — Fl. danica, I, tab. 38. — Gallia.
var. alba major.
— rubra.
E. codonodes *Lindl.* Bot. reg., tab. 1698. — Eur. merid.
E. herbacea *L.* — Bot. mag., tab. 11. — Europa borealis.
E. carnea *L* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1452.
var. alba.
E. Mackayi *Hook.* — Iberia et Hibernia.
E. mediterranea *L.* — Bot. mag., tab. 471. — Eur. austr.
var. alba.
— hibernica.
E. multiflora *L* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1572 — Europa
var. alba.
— rubra

E. stricta *Andr.* The Heath., tab. 92. — Europa meridionalis.
E. corsica *DC.* Ic. rar., tab. 17.

E. Tetralix *L.* — *Curt.* Fl. lond., tab. 21. — Europa.
var. alba.

E. vagans *L.* — Engl. bot., tab. 3; *Spach*, Suit. Buff., tab. 88. — Eur.
var. rubra.

E. Watsoni *Benth.* — (*stirps hybrida.*).

BRYANTHUS S. G. Gmel.

B. Gmelini *D.* et *G. Don.* — Kamtschatka.
B. repens *Gmel.*
Menziesia bryantha *Swartz*, Trans. Lin. soc. X, tab. 30.
Andromeda Byantha *L.* — *Pall.* Fl. Ross., tab. 74.

B. erectus *Lindl.* — Fl. des serres VII, tab. 659. — Patria ignota.

PHYLLODOCE Salisb.

P. empetriformis *D.* et *G. Don.* — America borealis.
Menziesia empetriformis *Smith*, Bot. mag., tab. 3176.

P. taxifolia *Salisb.* Parad. lond., tab. 56. — Eur. bor,
Andromeda taxifolia *Pall.* Fl. ross., tab. 72.
A. cærulea *L.* Fl. lapp., tab. 1.

DABŒCIA D. Don.

P. polifolia *D.* et *G. Don.* Brit. flov. gard., tab. 276. — Pyrenées occid.
Menziesia polifolia *Juss.* Ann. Mus. I, tab. 4, fig. 1.
M. Dabœci *DC.* — Engl. bot. I, tab. 35.
Erica Dabœcia *L.* — *Smith*, Engl. Bot, tab. 35.
Andromeda Dabœcia L.
var. alba. — *Sweet*, Fl. gard. II, tab. 276.

MENZIESIA Smith.

M. globularis *Salisb.* Parad. lond., tab. 44. — Virginia.
M. ferruginea *var.* β. Bot. mag., tab. 1571.
M. Smithii *Michx.*

LOISELEURIA Desv.

L. procumbens *Desv.* Dict. sc. nat., tab. 71. — Alpes.
Azalea procumbens *L.* — Fl. danica, I, tab. 9.

AZALEA Desv. (1).

§. SPECIES AMERICANÆ.

A. viscosa *L.* — America septentrionalis.
Rhododendron venustum *Salisb.*
R. viscosum *Torr.* Cat. New-York, tab. 66.
Azalea fragrans *Raff.* (non *Adans.*). — *Catesb.* Carol. I, tab. 57.
var. ornata (*stirps hybrida*).
Rhododendron ornatum *Sweet*, Brit. flow. gard., tab. 137
Azalea pontica rubescens *Gowen.*
— floribus rubris. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 441.

A. glauca *Lamk.* Encycl., tab. 110. — America borealis.
Rhododendron glaucum *G. Don.* (non *Hook.*).
R. viscosum glaucum *Torr.*
Azalea viscosa glauca *Michx.*
var. flore pleno.

A. nudiflora *L.* — Bot. mag., tab. 189; Herb. amat. IV, tab. 213. — America septentrionalis.
Varietates hortenses diversæ.

A. calendulacea *Michx.* — Bot. mag., tab. 1721. — Virginia.

(1) Le groupe entier des Azalées a été réuni aux Rhododendron; mais afin de ne pas rompre avec d'anciennes habitudes horticoles, j'ai considéré comme distinctes des Rosages, les espèces américaines et celles que l'on désigne improprement par le nom d'Azalées de l'Inde.

A. calendulacea.

var. crocea. — Bot. mag., tab. 1721.

— flammea. — Bot. reg., tab. 145.

— cuprea — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1391.

— cuprea maxima.

— fulgida — Bot. mag., tab. 3439; Nouv. Duham. V, tab. 63.

— bicolor (hybrida bicolor).

§. SPECIES ASIATICÆ.

A. pontica *L.* — Bot. mag., tab. 433. — Asia minor.

Rhododendron flavum *G. Don.*

Varietates hortenses diversæ.

A. sinensis *Lodd.* Bot. cab., tab. 885. — China.

A. mollis *Blum.* — Illustr. hort., tab. 68.

A. japonica *Asa Gray.*

Rhododendron sinense *Sweet*, Fl. gard. I, tab. 290 —

R. molle *Sieb.* et *Zucc.*

var. glabrior, Fl. des serres XIX, p. 177-183.

— coccinea.

A. obtusa *Lindl.* Bot. reg., tab. 37. — China.

Varietates hortenses diversæ.

A. amæna *Hook.* Bot. mag., tab. 4728. — *Paxt.* Fl. gard. III, tab. 89. — China.

var. alba.

— rosea.

A. indica *L.* — *Lamk.* Dict. sc. nat., tab. 70. — Asia. bor.

Rhododendron indicum *Sweet.* — *Maund*, Bot. IV, tab. 160.

Varietates hortenses diversæ.

A. lateritia *Hort.* — China.

A. indica *var.* lateritia *Lindl.* Bot. reg., tab. 1700.

var. phœnicea.

Rhododendron indicum speciosum *Sweet*, Brit. Fl. gard. II, tab. 284.

A. ledifolia phœnicea *Hook.* Bot. mag., tab. 3239.

A. ledifolia *Hook.* Bot. mag., tab. 2901. — China.
Rhododendron ledifolium *DC.*
A. liliiflora *Poit.*
A. liliiflora indica *Hort.*

RHODODENDRON Lin.

§. SPECIES EUROPEÆ, AMERICÆ VEL SIBIRIÆ.

R. ponticum *L.* — Bot. mag., tab. 650; Nouv. Duham. I, tab. 41. — Asia min.
var. rubra.
R. myrtifolium *Lodd.* Bot. cab. tab., 908. (non *Schott* et *Kotschy*). — Iberia.
R. ponticum myrtifolium *Don.*
R. maximum *L.* — Bot. mag., tab. 951; *Michx.* Arb. Am. III tab. 4. — America septentrionalis.
R. procerum *Salisb.*
var. elegans.
R. catawbiense *Michx.* — Bot. mag., tab. 1671. — Carolina.
var. Altaclarense. — Bot. reg., tab. 1414.
Varietates hortenses diversæ.
R. chrysanthum *Pall.* Fl. ross., tab. 30. — Dahuria.
R. officinale *Salisb.* Parad. lond., tab. 80.
R. brachycarpum *G. Don.* — Japonia.
R. caucasicum *Pall.* Fl. ross. I, tab. 31. — Caucasus
var. grandiflora.
— hybrida.
R. hirsutum *L.* — Bot. mag., tab. 1853; Nouv. Duham. II, tab. 40. — Europa.

R. ferrugineum *L* -- *Lodd.* Bot. cab., tab. 65.— Europa.
var. floribus albis. — *Sweet*, Brit. flow. gard. ser. 2, tab. 258.
— foliis variegatis.

R. dahuricum *L.* — *Pall.* Fl. ross , tab. 42. — Sibiria.
var. sempervirens. — Bot. mag., tab. 1888.

SPECIES HIMALAYENSES, JAPONICÆ VEL CHINENSES.

R. Metternichii *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap , tab. 9.— Japonia.
R. maximum *Thunb.* (non *Lin.*).

R. rhombicum *Miq.* — Japonia.

R. ovatum *Planch.* — Asia.
Azalea ovata *Lindl.* Journ. hort. soc. II, tab. 2.

R. Falconeri *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 10 ; Fl. des serres V, 477.
R. superbum *Hort.*

R. argenteum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 9 ; Fl. des serres V. 473.

R. Hodgsoni *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 15.

R. Aucklandii. *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 11.

R. Thomsoni *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 12. — Fl. des serres VII, tab. 688.

R. Dalhousiæ *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 1 et 2. — Fl. des serres V, tab. 460.
var. Lindleyana.
R. Lindleyanum *Hort.*

R. Nuttalii *Booth.* — Fl. des serres XIII, tab. 326.

R. Boothii *Nutt.*

R. barbatum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 3. — Fl. des serres V, tab. 469.
var. lancifolia.
R. lancifolium *D. Hook*, Rhod. of Sik. Him., tab. 4.

R. Edgeworthii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 21.

R. ciliatum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 24. — Fl. des serres VIII, tab. 766.

var. rubra.

R. arboreum *Smith.* — Bot. mag., tab. 3290. — Ind. or.
R. puniceum *Roxb.*

var. alba. — Bot. reg., tab. 1681.

— cinnamomea. — Bot. reg. tab. 1982.

Varietates hortenses multæ.

R. Campbelliæ *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 6.
R. nilagiricum *Hook.* — Bot. mag., tab. 4381 (non *Zenh.*).

R. niveum *D. Hook.*

R. formosum *Wall.* — Bot. mag., tab. 4457. — Nepalia.
R. Gibsoni. *Hort.* — Fl. des serres I, tab. 18.
R. splendens *Hort.*

R. campanulatum *Don.* — Bot. mag., tab. 1944.

var. robusta.

R. Wallichii *D. Hook.* Rhod, of Sik. Him., tab. 5.

R. Wightii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 27. — Fl. des serres VIII, tab. 792.

R. fulgens *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab, 25. — Fl. des serres VIII, tab. 789.

R. campylocarpum *D. Hook.* Rhod. of. Sik. Him., tab. 30.

R. Maddeni *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 18. — Fl. des serres IX, tab. 912; L'hort. franç. 1865. tab. 20.

R. Roylii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 7.

R. camelliæflorum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 28.

R. eximium *Nutt.*

R. anthopogon *Don.* — Bot. mag., tab. 3947.
R. aromaticum *Wall.*

SPECIES DUBIÆ.

R. Russelianum *Sweet*, Brit. fl. gard. ser. 2, I, tab. 91.
R. arboreum Russelianum *Hort.*
R. aureum splendens *Hort.*
R. azaleoïdes *Desf.* — Ann. de Gand 1845, tab. 4.
R. ponticum deciduum *Andr.* Bot. repos., tab. 329.
R. kalmiæfolium *Hort.*
R. pelargoniiflorum. — Fl. des serres X, tab. 1063.
R. rosalba — Fl. des serres X, tab. 1038.
R. dona Maria. — Fl. des serres X, tab. 1040.
R. campanulatum hybridum *Hort.*
R. spectabile grandiflorum *Hort.*
R. Bilsianum *Hort.*
R. daphnoides *Hort.*
R. Thompsonianum hybridum *Hort.*
R. Wilsonianum *Hort.*
R. Cartonianum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1449.
R. Gowenianum *Sweet*, Fl. gard., tab. 253.
R. Torlonianum *Hort.*
R. cheiranthifolium *Hort.*
R. Hamondi *Hort.*
R. tenellum *Hort.*

RHODORA Duham.

R. canadensis *L.* — *L'Hér.* Stirps., tab. 68; Nouv. Duham. III, tab. 53; Bot. mag., tab. 474. — America sept.

RHODOTAMNUS Reichb.

R. Chamæcistus *Reichb.* — Europa et Asia.
Rhododendron Chamæcistus L. — Bot. mag., tab. 488.

KALMIA Lin.

K. latifolia *L.* — Bot. mag., tab. 331; *Michx.* Arb. III, tab. 5; Nouv. Duham. I, tab. 44. — Amer. sept.
var. nana (minor.).
— alba.

K. angustifolia *L.* — Bot. mag., tab. 331. — Amer. sept.
var. pumila.
— lucida.
— variegata.

K. glauca *Ait.* — Bot. mag., tab. 177; Nouv. Duham. I, tab. 45. — America septentrionalis.
K. polifolia *Wangenh.* Schrift. naturf. Fr. VIII, tab. 5.
var. stricta.
— rosmarinifolia.
K. rosmarinifolia *Dum.-Cours.*
— præcox.

LEIOPHYLLUM Pers.

L. buxifolium *Ell.* — America septentrionalis.
Ledum buxifolium *Berg.* Act. Petrop. 1777, tab. 3.
L. thymifolium *Lamk.* Illustr., tab. 363.
Ammyrsine buxifolia *Pursh.* — Bot. reg., tab. 531.
var. variegata.

LEDUM Lin.

L. palustre *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 67. — Europa borealis.

L. latifolium *Ait.* — *Delaun.* Herb. amat., tab. 241. — America septentrionalis.
L. palustre *var.* latifolia *Michx.*

L. canadense *Lodd.* Bot. cab., tab. 1049. — Amer. sept.
L. latifolium *var.* canadensis *DC.*

L. angustifolium *Hort.*

MYRSINEÆ

ARDISIA Swartz.

A. crenulata *Vent.* Choix de pl., tab. 5. — Hispaniola.

A. crispa *A. DC.* — China.

Bladhia crispa *Thunb.* — *Banks*, Ic. Kæmpf., tab. 7.

A. crenulata *Lodd.* Bot., cab. tab. 2. (non *Vent.*).

A. crenata. — Bot. mag., tab. 1950.

A. lentiginosa. — Bot. reg., tab. 553.

A. japonica *Bl.* — Japonia.

Bladhia japonica *Thunb.* Fl. jap., tab. 18.

var. Belgorum.

A. odontophylla *Lindl.* Bot. reg., tab. 1892. (non *Wall.*).

— latimaculata.

— picta.

SAPOTEÆ

BUMELIA Swartz.

B. lycioides *Gærtn.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 90. — Georgia.

Sideroxylon spinosum *Duham.* Arb. II, tab. 68.

B. syderoxyloides *Hort.*

B. tenax *Willd.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 91. — Carolina.

Sideroxylon tenax *L.*

S. chrysophylloides *Michx.*

EBENACEÆ

DIOSPYROS Dalech.

D. Kaki *L. fil.* — *Kæmpf.* Amœn., Icon. p. 806. — China.

D. Schi-Tse *Bnge* Enum. p. 237. — China borealis.

D. Kaki *Carr.* (non *L.*). Rev. hort. 1869.

var. costata.

D. costata *Carr.* Rev. hort. 1870-71, p. 410. — *Hiern.* Cambr. Phil. Trans. XII, p. 227 cum Icon.

— Mazeli.

D. Mazeli *Carr.* Rev. hort. 1874, p. 70.

D. Lotus *L.* — *Pall.* Fl. ross. tab. 58; Nouv. Duham. VI, tab. 27. — Europa australis.

D. virginiana *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 146; *Michx.* Arb. am. II, tab. 12. — America septentrionalis.

var. angustifolia *Hort. Audibert.*

— glabra.

— calycina *Hort. Audibert.*

— intermedia.

— lucida.

— microcarpa.

D. pubescens *Pursh.*

STYRACEÆ

STYRAX Tourn.

S. officinale *L.*—*Duham.* Arb. II, tab. 79.—Europa australis.

S. Obasia *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 46. — Japonia.

Halesia Obasia *Hort.*

S. japonicum *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 23.— Japonia.
S. californicum *Torr.* — California.

PTEROSTYRAX *Sieb.* et *Zucc.*

P. hispidum *Sieb.* et *Zucc.* — Rev. hort. 1875, p. 307, cum Icon. — Japonia.

HALESIA Ellis.

H. tetraptera *L.*—*Lamk.* Encycl., tab. 404; Bot. mag., tab. 910. — Carolina.
var. grandiflora ?
H. diptera *L.*— *Lodd.* Bot. cab., tab. 1172. — Carolina.
H. parviflora *Michx.* — Bot. reg., tab. 952. — Florida.

OLEACEÆ

FRAXINUS Tourn.

§. SPECIES EUROPEÆ VEL ASIATICÆ

F. Ornus *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 15; *Sibth.* Fl. græc. I, tab. 4. — Europa australis.
F. florifera *Scop.*
Ornus europæa *Pers.* — *Hayne*, Darstell. XIII, tab. 11.
var. nana.
Ornus nana *Hort.*
— latifolia.
Ornus europæa latifolia *Hort.*
F. pseudornus *Steud.*
— corymbosa.
Ornus corymbosa *Hort.*
var. globifera.

F. Ornus.

Ornus globifera *Hort.*

O. glomerata *Hort.*

— superba.

F. rotundifolia *Lamk.* — *Willd.* Baumz., tab. 2. — Oriens.

O. rotundifolia *Pers.* — *Hayne*, Darstell. XIII, tab. 12.

F. mannifera *Hort.*

F. floribunda *Hort.* (non *Wall.*).

F. zanthoxyloides *Wall.* — India orientalis,

Ornus zanthoxyloides *G. Don.*

F. longicuspis *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

F. Sieboldiana *Blum.*

F. dimorpha *Coss.* — Mauritania.

F. incana *Carr.*

var. dumosa.

F. excelsior *L.* — Fl. Danica, VI, tab. 969 ; *Lamk.* III, tab. 858. — Europa.

F. apetala *Lamk.*

var. atrovirens.

F. crispa *Bosc.*

F. — fœmina *Hort.*

F. — mascula *Hort.*

— horizontalis.

F. horizontalis *Desf.*

— monstrosa.

— nana polemonifolia (non F. nana *Pers.*).

F. humilis *Hort.*

— pyramidalis.

— pendula.

F. pendula *Vahl.*

— foliis variegatis.

— Wentworthi.

— spectabilis.

F. excelsior.

var. verticillata.

— verrucosa.

F. verrucosa *Hort.*

F. fungosa *Hort.*

— jaspidea.

F. jaspidea *Desf.*

— aurea.

F. aurea *Willd.*

F. cinerea *Hort.* (non *Bosc*).

— pendula.

— cucullata.

— erosa (edentata).

— glabra (glauca).

— glomerata.

— heterophylla.

F. heterophylla *Wahl.* — Engl. bot., tab. 2476.

F. monophylla *Willd.*

F. simplicifolia *Wall.*

F. imbricaria monophylla *Hort.*

F. rotundifolia *Hort.* (non *Lamk.*).

F. integrifolia *Hort.*

Frène de Crimée *Hort.*

— longifolia.

F. longifolia *Bosc.*

— lyrata.

— linearis (laciniata).

— — variegata.

— scolopendrifolia.

F. myrtifolia *Hort.*

— variegata.

— viridis (nobilis).

F. sinensis *Hort.* (non *Roxb.*).

— intermedia.

F. excelsior.
var. elegans (superba).
— officinalis.
F. officinalis *Hort.*
— elegantissima.
— argenteo-variegata.
F. reticulata *Hort.*
F. oxyphylla *Bieb.* — Asia minor.
F. oxycarpa *Willd.*
F. elonzæ *Hort.* (sic!)
F. rostrata *Guss.* Pl. rar., tab. 63. — Italia meridionalis.
F. angustifolia *Vahl.* — Hispania.
F. salicifolia *Hort.*
var. brachystachya *DC.*
F. calabrica *Hort.*
F. Theophrasti *Hort.* (non Ornus *var. Lois.*).
F. parvifolia *Willd.* Baumz. p. 155, tab. 2. (non *Lamk.*).
F. parvifolia *Lamk.* (non *Willd.*). — Gallia meridionalis.
F. lentiscifolia *Desf.*
F. tamariscifolia *Vahl.*
F. angustifolia *Hort.* (non *Vahl.*).
F. corymbosa *Hort.*
F. pannosa *Hort.* (non *Bosc*).
F. pallida *Hort.* (non *Bosc*).
F. oxyphylla *Hort.* (non *Bieb.*).
var. nana.
— pendula.
F. chinensis *Roxb.* — China.
F. mandshurica *Regel.* — Mandshuria.
F. jasminifolia *Hort.*

SPECIES AMERICANÆ.

F. americana *L.* — *Michx*, Arb. am. III, tab. 8. — Amer. bor.
F. discolor *Muhl.*

F. americana.

var. acuminata.

F. acuminata *Lamk.* — *Torr.*, Fl. New-York, tab. 89.

— coriacea.

F. coriacea *Hort.*

— lucida.

F. lucida *Bosc.*

— novæ-angliæ.

F. Novæ-angliæ *Wangenh.* Beiträg.

— nigra.

F. nigra *Bosc.*

— rubicunda.

F. rubicunda *Bosc.*

F. arbutifolia *Hort.*

F. platycarpa *Michx fil.*, Arb. am. III, tab. 13. — Carolina.

F. caroliniana *Lamk.*

F. caroliniensis *Hort.*

F. platyphylla *Hort.*

F. epiptera *Michx.* — Carolina.

F. canadensis *Gærtn.* Frut. I, tab. 49.

F. lancea *Bosc.*

F. americana longifolia *Hort.*

F. juglandifolia *Lamk.* — Nouv. Duham. IV, tab. 16. — America septentrionalis.

F. viridis *Michx*, Arb. amer. III, tab. 10.

F. concolor *Muhl.*

var. subserrata *Willd.*

F. subintegerrima *Vahl.*

— serratifolia.

F. serratifolia *Hort.*

F. expansa *Willd.* — America septentrionalis.

F. caroliniana *Hort.* (non *Lamk.*).

F. Richardi *Bosc.* — America borealis.

F. juglandifolia subserrata *Hort.* (non *Willd.*).

F. alba *Bosc.* — America borealis.

F. pubescens *Walt.* — *Torr.*, Fl. New-York, tab. 90. — America septentrionalis.

F. tomentosa *Michx*, Arb. amer. III, tab. 9.

var. longifolia *Vahl.*

F. longifolia *Bosc.*

— latifolia *Willd.*

— subpubescens *Pers.*

F. subvillosa *Bosc.*

F. cerasifolia *Hoffm.*

F. sambucifolia *Lamk.* — *Michx*, Arb. amer. III, tab. 12. — America septentrionalis.

F. quadrangularis *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 11. — America septentrionalis.

F. tetragona *Cels.*

F. cinerea *Bosc.* — America septentrionalis.

F. elliptica *Bosc.* — America borealis.

F. mixta *Bosc.* — America borealis.

F. hispida *Hort.*

F. aucubæfolia *Hort.*

F. nana *Pers.* — America borealis.

F. polemonifolia *Poir.*

F. nana *Bosc.* (non *Hortul.*).

F. Bosci *Don.*

F. rufa *Bosc.* — America borealis.

FONTANESIA (1) Labill.

F. phyllyræoides *Labill.* — *Turpin*, Dict. sc. nat. IV, tab. 37; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 2. — Syria.

F. Fortunei *Carr.* Rev. *Hort.* 1859, fig. 9. — China.

(1) L'arbuste cultivé sous les noms de *Fontanesia californica* ou *F. grandiflora* ne paraît pas appartenir à ce genre; il n'a pas encore fleuri à Segrez.

FORSYTHIA Vahl.

F. suspensa *Valh.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 3; Belg. hort. VIII, tab. 1. — Japonia et China.
Syringa suspensa *Thunb.* Fl. jap., tab. 3.
Lilac perpensa *Lamk.*

F. Fortunei *Lindl.*— China borealis.

F. Sieboldi *Hort.*

F. viridissima *Lindl.* — L'Hort. franç. 1852, tab. 12; Bot. mag., tab. 4587. — China.
var. foliis variegatis.

SYRINGA Lin.

S. persica *L.* — Bot. mag., tab. 486. (Vulg. *Lilas à feuilles de Persil.*) — Persia?
Lilac persica *Lamk.* — Nouv. Duham. II, tab. 62.
S. laciniata *Hort.*
S. capitata *Gmel.* Itin. III, tab. 32.
var. pteridifolia (laciniata). — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1107; *Schmidt*, Arb. tab. 79.
— alba.

S. dubia *Pers.* — (Vulg. *Lilas Varin* et fals. *L. de Perse.*)
S. chinensis *Willd.*
S. correlata *A. Braun.*
S. Saugeana *Hort.*
S. speciosa *Hort.*
Lilac Varina *Dum-Cours.*
S. persica rothomagensis *Loisel.* Nouv. Duham. II, t. 63.
var. sanguinea.
— alba.
— Gloire de Moulins.

S. vulgaris *L.* — Europa.
Lilac vulgaris *Lamk.* — Nouv. Duham. II, tab. 61.
var. violacea. — Bot. mag., tab. 183.
— — flore pleno.

S. vulgaris.
var. alba.
— — pyramidalis.
— cærulea.
— purpurea. (Vulg. *Lilas* de *Marly*.)
S. rubra *Hort.*
Lilac media *Dum-Cours.*
— — major. (Vulg. *Lilas Charles* X.)
— variegata.
Varietates hortenses diversæ.
S. oblata *Fortune.* — China.
S. chinensis *Bunge?*
S. Emodi *Wall.* — *Royle.* III, tab. 65. — Himalaya
var. aureo-variegata.
S. Josikæa *Jacq. fil.* — Bot. mag., tab. 3278. — Hungaria.

OLEA Tourn.

O. europæa *L.* — Nouv. Duham., tab. 25-32. — Asia.
var. myrtifolia (robusta).
O. americana *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6. — America septentrionalis.

OSMANTHUS Lour.

O. flagrans *Lovr.* — Japonia.
Olea fragrans *Thunb.* Fl. jap., tab. 2. — Bot. mag., tab. 1552.
Olea sinensis *Hort.*
var. reticulata.
— floribus rubris.
O. Aquifolium *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
O. diversifolius. *Sieb.*
Ilex Aquifolium *Thunb.*
var. foliis pictis.
— — aureo-variegatis.
— — argenteo-variegatis.

O. ilicifolius *Hort.* — Japonia.
var. foliis variegatis.
O. latifolius *Hort. Sieb.* — Japonia.
var. foliis marginatis.

PHILLYREA Tourn.

P. latifolia *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 8; *Sibth.* Fl. græc., tab. 2. — Regio mediterr.
var. stricta.
— buxifolia.
— crispa.
— ilicifolia.
Phillyrea spinosa *Mill.*
— macrophylla.
— obliqua.
— rotundifolia.
P. media *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 27. — Europa austr.
var. lævigata.
— oleifolia.
— virgata.
P. ligustrifolia *Mill.*
P. angustifolia *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 8. — Reg. medit.
P. lanceolata *Hort.*
var. rosmarinifolia *Ait.*
P. rosmarinifolia *Mill.*
P. neapolitana *Hort.*
P. Vilmoriniana *Boiss.* — Oriens.
P. laurifolia *Hort.*

LIGUSTRINA Rupr.

L. amurensis *Reg.* Gartenfl. XII, tab. 396; Beitr. Fl. russl. — China borealis et regio amur.
Syringa amurensis *Rupr.* — *Maxim.* Prim. fl. amur. et Mél. biol. decas XIX, p. 395.

LIGUSTRUM Tourn. (1).

L. vulgare *L.* — Fl. danica VII, tab. 1141 ; *Guimp.* Abbild. deut. Holz, tab. 1; Nouv. Duham. III, tab. 49.— Europa.

var. italica.

L. italicum *Mill.*

— erecta.

— excelsa foliis variegatis.

— longifolia.

— lutea (aurea, odorata).

— pendula.

— chlorocarpa.

— leucocarpa.

L. Ibota *Sieb.* Bot. Verts. XII, p. 36. — Japonia.

L. obtusifolium *Sieb.* et *Zucc.*

L. vulgare *Thunb.* (non *Lin.*).

L. Roxburghii *Hort.* (non *Bl.*).

L. nepalense *Hort.* (non *Wall.*).

L. amurense *Hort.* (non *Maxim.*).

Ibutta *Kæmpf.* Amœnit.

L. Stauntoni *DC.* — China.

L. Ibota *Hort.* (non *Sieb.*).

L. sinense *Hort.* (non *Lour.*).

L. sinense nanum *Hort.*

L. chinense *Carr.* Rev. hort. 1863.

L. villosum *May*, Rev. hort. 1875.

L. Massalongianum *Visian.* — Patria ignota.

L. spicatum *Hort.* (non *Ham.*).

L. — japonicum *Hort.*

L. rosmarinifolium *Hort.*

L. myrtifolium *Hort.*

L. angustifolium *Hort. Booth.*

(1) Je dois l'indication des nombreux synonymes de ces *Ligustrum* à l'obligeance de M. Decaisne, qui s'occupe d'une monographie de ce genre.

L. lucidum *Ait.* Kew. — Bot. mag., 2565. — China.
L. japonicum *Hort.* (non *Thunb.*).
L. robustum *Hort.* (non *Hook.* et *Thom.*).
L. nepalense glabrum *Hort.*
L. strictum *Hort.*
L. magnoliæfolium *Hort.*
Ligustridum japonicum *Spach.*

L. nepalense *Wall.* Pl. asiat., tab. 270. — Bot. mag., tab. 2921. — Nepalia.
L. vestitum *Wall.*

L. japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 1. — Japonia.
L. glabrum *Hort.*
L. Kellerianum *Visian.*
L. Kellermanni *Hort. Van-Houtte.*
L. lucidum *Hort.* (non *Ait.*).
L. ovatum *Hort.*
L. Sieboldi *Hort.*
L. syringæflorum *Hort.*
L. spicatum *Hort.*

var. coriacea *Bl.* Mus. Lugd. bat. I, p. 313.
L. coriaceum *Carr.* Rev. hort. 1874.

— macrophylla.
L. macrophyllum *Hort.*

— foliis variegatis.

L. ovalifolium *Hassk.* — Japonia.
L. californicum *Hort.*
L. ovatum *Aliq. Hort,*
L. amurense *Carr.* Rev. hort. 1861 cum Icon. (non Maxin.)

var. foliis variegatis.

— foliis tricoloribus.

L. compactum *Hook.* et *Thom.* — Nepalia et Himalaya
L. japonicum robustum *Hort.* (non *Hook.* et *Thom.*).
L. lucidum *Hort.* (non *Ait.*).
L. angustifolium *Hort.* (non *Booth*).

L. compactum.

L. japonicum lineare *Hort.*
L. lineare *Hort.*
L. longifolium *Hort.*
L. lancæfolium *Hort.*
L. japonicum Simoni *Hort.*
L. Simoni *Carr.*
L. laurifolium *Hort.*

CHIONANTHUS Lin.

C. virginica *L.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 98. — America septentrionalis.

var. maritima.

C. maritima *Lodd.*
C. pubescens *Hort.* (non *H. B. K.*).

— angustifolia.

— latifolia.

C. montana *Hort.*
C. virginica *var.* montana *Pursch.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 1.

— lutea *Hort.*

C. lutea *Hort.*

FORESTIEREÆ

FORESTIERA Poir.

F. acuminata *Poir.* — Carolina.

Borya acuminata *Willd.*
Adelia acuminata *Michx*, Fl. bor. Amer. II, tab. 48.

F. ligustrina *Poir.* — Amer. sept.

Borya ligustrina *Willd.*
Adelia ligustrina *Michx.*

JASMINEÆ

JASMINUM Tourn.

J. fruticans *L.* — Bot. mag., tab. 461; Nouv. Duham. I, tab. 28. — Europa meridionalis.
J. collinum *Salisb.*
J. luteum *Lob.* Icon. I, tab. 106.
J. heterophyllum *Mœnch.*
J. fruticosum major *Hort.*

J. humile *L.* — Bot. reg., tab. 350. — Gallia meridionalis.
J. fruticans *var.* β. *Lapeyr.*
J. italicum *Hort.*

J. officinale *L.* — Bot. mag., tab. 31; Nouv. Duham. I, tab. 27. — Asia.
J. vulgare *Lamk.*
J. Wallichianum *Hort.* (non *Lindl.*).
var. flore pleno.
— foliis variegatis.

J. floridum *Bge.* — China.

J. revolutum *Sims.* — Bot. mag., tab. 1731; Bot. reg., tab. 178. — Nepalia.
J. chrysanthemum *Roxb.*
J. flavum *Sieb.*
J. triumphans *Hort.*

J. affine *Royle* in *Lindl.* Bot. reg. XVIII, tab. 26. — *Wight*, Icon., tab. 1255. — India orientalis.

J. nudiflorum *Lindl.* Bot. reg. XXXII, tab. 48; — Fl. des serres, VIII, tab. 762. — China.
var. foliis variegatis.

APOCYNEÆ

RHYNCHOSPERMUM Alph. DC.

R. japonicum *Sieb.* — Japonia.

R. jasminoides *Alph. DC.* — Bot. mag., tab. 4737. — China.
Trachelospermum jasminoides. *Lem.* Fl. des serres, VI, tab. 615.

R. pulchrum *Hort.*

R. scandens *Hort.*

ASCLEPIADEÆ

PERIPLOCA Lin.

P. græca *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 177; Bot. mag., tab. 2289. — Europa meridionalis.

P. lævigata *Hort. Kew.* — Syria.
P. punicæfolia *Cav.* Icon. 3., tab. 217.
P. angustifolia *Labill.* Syr. decas II, tab. 7.

MARSDENIA R. Br.

M. erecta *R. Br.* — Asia minor.
Cynanchum erectum *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 177.

BIGNONIACEÆ

CATALPA Scop.

C. bignonioides *Walt.* — America septentrionalis.
C. syringæfolia *Sims.* Bot. mag., tab. 1094.
Bignonia Catalpa *L.* — *Duham.* Arb., tab. 41; *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6;
var. aurea.

C. Kæmpferi *DC.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icon., tab. ined. — Japonia.
Catalpa ovata *G. Don.*
var. crassifolia *Lavall.* — (an species propria?).
C. Bungei *C. A. Mey.* — China.
var. nana (pumila).
C. Kæmpferi *Aliq. Hort.*

TECOMA Juss.

T. radicans *Juss.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 104; Nouv. Duham. II, tab. 3. — Virginia.
Bignonia radicans *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 526; Bot. mag., tab. 485.
var. minor.
Bignonia radicans coccinea *Pers.* — *Catesb.* Carol. I, tab. 65.
— flava.
— Manglesii.
— præcox.
— punicea.
— — coccinea grandiflora.
— speciosa.
— Thunbergii.
T. Thunbergii *Sieb.*
T. grandiflora *Delaun.* Herb. amat., tab. 286.— Japonia.
Bignonia grandiflora *Thunb.* — Bot. mag., tab. 1398.
B. chinensis *Lamk.*
Campsis adrepens *Lour.*
var. amabilis.
— multiflora.
— rubra.

BIGNONIA Tourn.

B. capreolata *L.* — Bot. mag., tab. 864; *Paxt.* mag., VIII, tab. 243. — Carolina.

B. lucida *Lodd.* — America septentrionalis.
var. sempervirens.
B. sempervirens *Hort.* (non *Lin.*).

BORRAGINEÆ

LITHOSPERMUM Tourn.

L. fruticosum *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 161. — Europa australis.

CORDIACEÆ

CORDIA Plum.

C. thyrsiflora *Hort. Petrop.* — Japonia.
var. longifolia.

SCROPHULARINEÆ

BUDDLEIA Lin.

B. globosa *Lamk.* — Bot. mag., tab. 74. — Chili.
B. capitata *Jacq.* Icon. rar. II, tab. 307.
B. curviflora *Hook.* et *Arn.* — Illustr. hort. XVII, tab. 25. — Japonia.
B. Lindleyana *Fortune.* — Bot. reg. XXXII, tab. 4; Fl. des serres, II, tab. 48. — China.
var. intermedia.
B. intermedia *Carr.* Rev. hort. 1873, p. 151, cum Icon (non *H. B. K.*).
— salicifolia.
B. salicifolia *Hort.* (non *Walh* nec *Jacq.*).
B. floribunda? *H. B. K.* — Mexico.

FREYLINIA Benth.

F. cestroides *Colla.* — Asia.

Capraria lanceolata *L. fil.* — *Link* et *Otto*, Icon. hort. berol., tab. 4.

Capraria salicifolia *Hort.*

Buddleia glaberrima *Hort.* — Herb. amat. IV, tab. 266.

PAULOWNIA Sieb. et Zucc.

P. imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 10. — Rev. hort. 1847; Bot. mag., tab. 4656. — Japonia.

Kirri *Kæmpf.* amœn, p. 859. cum Icon.

Bignonia tomentosa *Thunb.*

VERONICA Lin.

V. speciosa *R. Cunn.* — Bot. mag., tab. 4075. — Nov. Zeeland.

var. hybrida.

— rubra.

V. Andersonii *Hort.* (Stirps hybrida?)

V. Lindleyana *Paxt.* Mag. XII, tab. 247 (non *Wall.*). — Nova Zeelandia.

V. salicifolia *Forst.* — Bot. reg. 1846, tab. 5. — Nov. Zeeland.

V. decussata *Ait.* — Bot. mag., tab. 207. — Falkland.

V. Devoniana *Hort.*

V. formosa *R. Br.* — Bot. mag. 4512. — Tasmania.

V. Hulkeana *Hook.* — Nova Zeelandia.

VERBENACEÆ.

CITHAREXYLUM Lin.

C. cyanocarpum *Hook.* et *Arn.* in *Beech.* Voy. tab. 11. — Chili.

C. ligustrinum *G. Thur.* — Patria ignota.

Ligustrinum multiflorum *Jacq.* Man.

L. amurense *Hort.* (non *maxim.*).

CALLICARPA Lin.

C. arborea *Roxb.* — Nepalia.

C. americana *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 69.— Louisiana.
Burcardia Heisteri *Duham.* Arb. Edit. I, tab. 44.

C. japonica *Thunb.* — Japonia.
C. longifolia *Lamk.* — Bot. reg., tab. 864.
var. rosea.

C. purpurea *Juss.* — L'hort. franç. 1861, tab. 4. — China et Japonia.

C. Murasaki *Sieb.* — Asia?
Galphimia hirsuta *Hort.* (non *Cav.*).

C. gracilis *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

C. Sieboldi *Lavall.* — Japonia?
C. Murasaki *Hort.* (non *Sieb.*).

C. sinensis *Hort.*

C. latifolia *Hort.*

CLERODENDRON Lin.

C. fragrans *Vent.* Malm., tab. 70. — China.
Volkameria japonica *Thunb.* — *Jacq.* Hort. schönbr, tab. 338.

C. trichotomum *Thunb.* — *Kæmpf.* Amœn., tab. 22. — Japonia.
var. glauca.
C. glauca *Wall.*

C. fœtidum *Bnge.* — China.
C. Bungei *Steud.*
Volkameria Bungei *Hort.*

C. squamatum *Vahl.* — Bot. reg., tab. 649. — Asia.
C. Kæmpferi *Fisch.* — Ann. Gand. 1845, tab. 3.
Volkameria Kæmpferi *Jacq.* Icones, tab. 500.

VITEX Lin.

V. Agnus-castus *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 35. — Regio mediterr.
V. verticillata *Lamk.*

V. incisa *Lamk.* Encycl., tab. 541. — Mongolia.
V. laciniata *Hort.*

V. Negundo *L.* — Bot. mag., tab. 361. — Nepalia
V. arborea *Desf.*
V. paniculata *Lamk.*
var. alba.
— rosea.

V. angustifolia *Hort.*

V. *Hort. Van-Htte.* — China?

LABIATÆ

PHLOMIS Lin.

P. fruticosa *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 40. — Europa australis.
P. ferruginea *Hort.* (non *Ten.*).

P. italica *Smith.* — Italia.
P. purpurea *L.* — *Rœmer.* Fl. europ. XII, tab. 5.
P. rotundifolia *Mill.*

P. viscosa *Poir.* — Asia minor.
P. virens *DC.*

TEUCRIUM Lin.

T. fruticans *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 501. — Regio mediterr.
T. latifolium *L.* — Bot. mag., tab. 245.

T. Marum *L.* — *Hayne* Darstell. VIII, tab. 2. — Regio medit.
T. maritimum *Lamk.*

SOLANEÆ

LYCIUM Lin.

L. chinense *Mill.* — Nouv. Duham. I, tab. 30. — China.
L. Trewianum *Rœm.* et *Schult.*
L. Barbarum *var.* chinense *Ait.*
L. chiliense *aliq. Hort.* (non *Miers.*).

L. europæum *L.* — *Jaub.* et *Spach*, Illustr., tab. 403. — Europa australis.
L. megistocarpum *Dunal.* in *DC. Prodr.*
L. chilense *Hort.* (non *Bert.*).
L. carolinianum *Hort.* (non *Michx*).

var. ovata.
L. ovatum *Poir.*
L. carnosum *Hort.* (non *Poir.*).

— macrocarpa.
L. macrocarpa *Hort.*

L. Barbarum *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 9. — Oriens.
L. carolinianum *Hort.* (non *Michx*).

L. ruthenicum *Murr.* Comment. Gott. II, tab. 2. — Sibiria.
L. tataricum *Pall.* Fl. ross. I, tab. 49.

L. afrum *L.* — Nouv. Duham., I, tab. 29. — Mauritania.

L. inerme *Hort.* (non *Lin.*).

GRABOWSKIA Schlecht.

G. bœrhaaviæfolia *W. Arn.* — Amer. merid.
Lycium bœrhaaviæfolium *L.*
L. heterophyllum *Murr.* Comment. Gœtt. VI, tab. 2.

CESTRUM Lin.

C. Parqui *L'Hér.* Stirp. I, tab. 36. — Bot. mag., tab. 1770. — Chili.

C. jasminiflorum *Moric.* — Patria ignota.

FABIANA Ruiz et Pav.

F. imbricata *Ruiz* et *Pav.* Fl. peruv. II, tab. 122, fig. 2. — Chili.

SOLANUM Lin.

S. dulcamara *L.* — Fl. danica IV, tab. 607. — Europa. *var.* variegata.

S. jasminoides *Paxt.* Mag. VIII, tab. 5. — Bot. reg. XXXIII, tab. 33. — Patria ignota.

S. cynanchoides *Dun.*

S. glaucophyllum *Desf.* — Amer. austra.

S. fastigiatum *Willd.* — *Dunal*, Solan., tab. 16. – Mexico.

DESFONTAINEA Ruiz et Pav.

D. spinosa *Ruiz* et *Pav.* Fl. peruv., tab. 186; — Fl. des Serres IX, tab. 938; Bot. mag., tab 4781. —Peru.

APETALÆ

AMARANTACEÆ

DEERINGIA R. Br.

D. celosioides *R. Br.* — Bot. mag., tab. 2717. — Nova Hollandia.
Leycesteria japonica *Hort.*
var. variegata.

POLYGONACEÆ

POLYGONUM Lin.

P. chinense *L.* — *Wight.* Icones pl. ind. or. V, tab. 1806. — China.
Ampelygonum chinense *Lindl.*

CALLIGONUM Lin.

C. comosum *L'Hérit.* — Asia minor.
C. polygonoides *L.* (non *Pall.*).

BRUNNICHIA Banks.

B. cirrhosa *Banks.* — *Gærtn.* Fruct., tab. 45. — Carolina.
Polygonum claviculatum *Hort. Paris.*

MUHLENBECKIA Meisn.

M. complexa *Meisn.* — Nova Zeelandia.
M. nummularia *Brongt.*
Polygonum complexum *A. Cunn.* — Bot. mag., tab. 1846.

M. sagittifolia *Meisn.* — Brasilia meridionalis.
Polygonum acetosæfolium *Vent.* Hort. Cels, tab. 88.

M. pandurata *Dcne.* — Nova Hollandia.

M. varians *Meisn.* — Patria ignota.
Polygonum cordatum *Hort. Berl.*

M. Cunninghami *Hort.*

ATRAPHAXIS Lin.

A. spinosa *L.* — *L'Hér.* Stirp., tab. 14; *Wats.* Dendr. brit. II tab. 119. — Asia occident.

HELWINGIACEÆ

HELWINGIA Willd.

H. japonica *Dietr.* — Japonica.
Osyris japonica *Thunb.* Icones. dec. III, tab. 1.
H. rusciflora *Willd.* — *Dcne*, Ann. sc. nat. 2e sér., vol. VI, tab. 7; *Zucc.* in *Sieb.* Fl. jap., tab. 86.

NYSSACEÆ

NYSSA Lin.

N. aquatica *L.* — *Michx*, Arb. am. II, tab. 22. — Amer. sept.
N. integrifolia *Ait.*
N. villosa *Michx.*

N. multiflora *Wangenh.* Beiträg. — *Emory*, Rep. Mass., tab. 17.—America septentrionalis.
N. sylvatica *Michx*, Arb. amer. II, tab. 21.

N. uniflora *Wangenh.* Beiträg., tab. 27. — America sept.
N. grandidentata *Michx*, Arb. amer. II, tab. 19.

N. capitata *Walt.*—*Michx*, Arb. am. II, tab. 20. —Amer. sept.
N. candicans *A. Michx.*

PROTEACEÆ

EMBOTRIUM Forst.

E. coccineum *Forst.* — *Cav.* Icones, tab. 65. — Magellania.

GREVILLEA R. Br.

G. sulphurea *Cunn.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1723. — Nova Zeelandia.
G. aciphylla *Sieber.*

G. rosmarinifolia *Cunn.* — Nova Zeelandia.
G. riparia *Sieber.*

THYMELEÆ

DIRCA Lin.

D. palustris *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 293; Bot. reg., tab. 292. — America septentrionalis.

DAPHNE Lin.

§. MEZEREUM.

D. Mezereum *L.* — Fl. danica, II, tab. 268. — Europa.
var. albida.
— autumnalis.
— grandiflora.
— Houtteana (atropurpurea).
D. Houtteana *Planch.*
D. species *Van-Htte.* Fl. des serres VI, tab. 592.

D. Genkwa *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 75. — China.
var. Fortunei.
D. Fortunei *Lindl.* Journ. hort. soc. II, tab. 1.—Fl. des serres III, tab. 208.

D. altaica *Pall.* Fl. ross. I, tab. 35. — Sibiria.

D. caucasica *Pall.* — Asia minor.
D. salicifolia *Lamk.*

D. alpina *L.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 66. — Europa.
Thymelea alpina *All.*

§. CNEORUM.

D. Cneorum *L.* — Bot. mag., tab. 318. — Europa
var. Delahayana (versaillensis).
— major (maxima).
— Verloti.
D. Verloti *Gren.* et *Godr.*
— foliis variegatis.

D. striata *Tratt.* Arch. de Gewæchsk. I, tab. 133. — *Rchb.* Icones, fl. germ. XI, tab. 554. — Europa.
D. Cneorum *Wahlenh.* (non *Lin.*).
D. oleoides *Schreb.* Decad. I, tab. 7. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 299. — Europa et Asia.
D. caucasica *Bieb.*
var. foliis variegatis.
D. Blagayana *Freyer.* — *Reich.* Icones fl. germ. XI, tab. 550. — Carniolia.
D. collina *Smith.* Spicil. II, tab. 18. — Italia.
D. australis *Cyr.* Pl. rar. III, tab. 16.
var. neapolitana *Lindl.* Bot. reg., tab. 822.
D. neapolitana *Lodd.* Bot. cab., tab. 719.
— foliis marginatis.
D. odora *Thunb.* (non *Lour.*). — *Banks*, Icones Kæmpf., tab. 16. — Japonia.
var. foliis aureo-marginatis.
D. sinensis *Lamk.* — China.
D. odora *Lour.* — Bot. mag., tab. 1587.
D. indica *Hort.* (non *L.*). — Herb. amat. II, tab. 105.
var. hybrida (stirps hybrida?).
D. hybrida *Lindl.* Bot. reg., tab. 1177.
D. Delphini vel Dauphini *Hort.*
D. japonica *Hort. Ludg. Batav.* ex *Sieb.* et *Zucc.* — *Paxt.* Mag. VIII, tab. 175; Rev. hort. 1866. — Japonia.
D. Gnidium *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 23; *Lodd.* Bot. cab., tab. 150. — Regio mediterr.

§. LAUREOLA.

D. Laureola *L.* — Bot. mag., tab. 206. — Europa.
D. major *Lamk.*
Thymelea Laureola *Scop.*
D. pontica *L.* — Bot. mag., tab. 1282. — Oriens.
var. rubra.

EDGEWORTHIA Meisn.

E. chrysantha *Lindl.* Bot. reg. 1847, tab. 48. — Fl. des serres, tab. 289. — China.
E. papyrifera *Zucc.*
Daphne papyrifera *Sieb.*

WIKSTRŒMIA Endl.

W. indica *C. A. Mey.* — China.
Daphne indica *L.* — *Hook* et *Arn.* Bot. Beech., tab. 15.

THYMELÆA Tourn.

T. Tartonraira *All.* — *Reichenb.* Icones Fl. germ. XI, tab. 552. — Regio mediterr.
Daphne Tartonraira *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 290.

ATRIPLICEÆ

ATRIPLEX Lin.

A. Halimus *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 962. — Europa, Asia et America.
Chenopodium Halimus *Thunb.*

SALSOLA Lin.

S. fruticosa *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 79. — Europa, Asia et America.
Schoberia fruticosa *Meyer.*
Suæda fruticosa *Forsk.*

ELÆAGNEÆ

ELÆAGNUS Lin.

E. argentea *Pursch* (non *Colla*). — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 161. — Amer. septentrionalis.

E. hortensis *Bieb.* — Regio mediterr.

var. angustifolia.

E. angustifolia *L.* — *A. Rich.* Monogr., tab. 24; Bot. reg., tab. 1156.

E. parvifolia *Hort.* (non *Royl.*).

E. parviflora *Hort.*

E. orientalis *L.* — *Pall.* Fl. ross. I, tab. 5.

E. hortensis *var.* Orientalis *schlecht* in *DC* Prodr. XIV, p. 609.

E. hortensis lutea *Hort.*

E. crispa *Thunb.* — Japonia.

E. macrophylla *Thunb.* — Japonia.

var. argenteo-variegata.

— aureo-variegata.

E. arborea *Roxb.* — India orientalis.

E. argentea *Colla* (non *Pursh*). Hort. ripul., tab. 28.

E. ferruginea *A. Rich.* — Asia.

var. Gussoni.

E. chrysophylla *Hort.*

E. nivea *Hort.*

E. flava *Hort.* — *Pépin* in *Lem.* hort. univ. III, p. 304.

E. fusca *Hort.*

E. longipes *Asa Gray.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.

E. edulis *Hort.*

E. rotundifolia *Hort.*

E. odorata edulis *Hort.*

var. crispa.

E. reflexa *Dcne.*, Bull. Acad. Brux. — Japonia.
E. pungens *Hort.* (non *Thunb.*).
var. foliis marginatis.
— pictis.
— variegatis.
E. tenuiflora *Benth.* — China.
E. Simoni *Carr.* — China ?
E. stricta *Hort.*
E. persica *Hort.*

SHEPHERDIA Nutt.

S. canadensis *Nutt.* — *A. Rich.* monogr., tab. 24. — America septentrionalis.
Hippophaë canadensis *L.*
S. argentea *Nutt.* North-Amer. sylv. I, tab. 35. — *Hook.* Fl. bor. Am., tab. 118. — America septentrionalis.
Hippopahë argentea *Pursh.*

HIPPOPHAE Lin.

H. rhamnoides *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 5; Fl. danica, II, tab. 265; Engl. bot. VI, tab. 425. — Europa.
H. salicifolia *Don.* — Nepalia.

LAURINEÆ

LAURUS Tourn.

L. nobilis *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 32. — Europa merid.
var. angustifolia.
— crispa.

L. nobilis,

var. regalis.

L. regalis *Hort.*

L. californica (*Hort*, non *Nutt.*).

— salicifolia.

— variegata.

SASSAFRAS Nees.

S. officinale *Nees.* — America septentrionalis.

Laurus Sassafras *L.* — *Michx*, Arb. am. III, tab. 2.

CINNAMOMUM Burmam.

C. Camphora *Nees.* — Japonia et China.

Camphora officinarum *G. Bauh.* — *Blachw.*, tab. 347.

Laurus Camphora *L.* — *Jacq.* Coll. IV, tab. 3.

var. longifolia.

Camphora japonica *var. Sieb.*

— latifolia.

Camphora japonica *Sieb.*

C. Sieboldi *Meisn.* — Japonia.

C. dulce *Nees.*

C. chinense *Blume.*

C.? tomentosum *D. Don.* — Nepalia.

Laurus tomentosa *Hamilt.*

MACHILUS Rumph.

M. Thunbergii *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.

Laurus indica *Thunb.*

PERSEA Gærtn.

P. caroliniensis *Nees.* — America borealis.

Laurus caroliniensis *Michx*, Arb. am. III, tab. 2.

BOLDU Feuill.

B. chilanum *Nees.* — Chili.
Peumus Boldus *Mol.*
P. fragrans *Bert.*
Laurus chilensis *Pœpp.*
Bellota Miersii *Cl. Gay.* Fl. chil. V, tab. 59.

LINDERA Thunb.

L. Benzoin *Meisn.* — America septentrionalis.
var. verna.
Laurus Benzoin *L.*
Benzoin odoriferum *Nees.*
— æstivalis.
Laurus æstivalis *Wangenh.* Beiträg.
Benzoin æstivale *Nees.*
L. præcox *Blum.* — Japonia.
Benzoin præcox *Sieb.* et *Zucc.*
L. sericea *Blum.* — Japonia.
Benzoin sericeum *Sieb.* et *Zucc.*
L. hypoglossa *Hort.* — Asia?

TETRANTHERA Jacq.

T. japonica *Spreng.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 37 et 100.
— Japonia.
Tomex japonica *Thunb.*
var. foliis variegatis.

LITSÆA Juss.

L. glauca *Sieb.* — Japonia.
Laurus glauca *Thunb.*
var. baccis rubris.

ARISTOLOCHIÆ

ARISTOLOCHIA Lin.

A. Sipho *L'Hér.* Stirp. nov., tab. 7. — Bot. mag., tab 534. — America septentrionalis.

A. tomentosa *Sims*, Bot. mag., tab. 1369. — Carolina.

A. Kæmpferi *Willd.* — *Banks,* Icones sel. Kæmpf., tab. 49. — Japonia.

A. sempervirens *L.* — Bot. mag., tab. 1116; *Lodd.* Bot. cab., tab. 231. — Creta.

A. debilis *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
A. longa *Thunb.* (non *Lin.*).

EUPHORBIACEÆ

MALLOTUS Mull.

M. japonicus *Mull.* — Japonia et China septentrionalis.
Croton japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 28-29.
Rottlera japonica *Spreng.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 79.

SEBASTIANA Spreng.

S. ligustrina *Mull.* — America septentrionalis.
Stillingia ligustrina *Michx.*

STILLINGIA Garden.

S. sebifera *Michx.* — China et Japonia.
Croton sebiferum *L.*
Triadica sinensis *Lour.*
Excæcaria sebifera *Mull.*

SECURINEGA Mull.

S. ramiflora *Mull.* — Dahuria et Rossia.
Geblera suffruticosa *Fisch.*
Fluggea suffruticosa *Baill.*

BUXACEÆ

BUXUS Lin.

B. balearica *Willd.* — Insul. Balear.
B. sempervirens *var.* gigantea *Loisel.* Nouv. Duham. I, tab. 23.
var. marginata.
B. longifolia *Boiss.* — Asia.
B. sempervirens *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 761. — Europa.
var. arborescens. — *Duham.* Arb. tab. 24.
— subglobosa.
— suffruticosa *Lois.* Nouv. Duham. I, tab. 24.
— — foliis variegatis.
— angustifolia.
— bullata.
— crispa (navicularis).
— glauca.
— ledifolia.
— marginata.
— myrtifolia — *Duham.* Arb. tab. 23.
— minima.
— obcordata.
— ovalifolia.
— rotundifolia.
— rosmarinifolia.

B. sempervirens.
var. tenuifolia (thymifolia).
— variegato argentea.
— — aurea.
— caucasica.
— Handsworthii.
— Hardwickensis.
B. chinensis *Link.* — China et Japonia.
var. rotundifolia.
B. rotundifolia *Sieb.*
B. japonica *Mull.* — Japonia.
B. sempervirens *Thunb.* (non *Lin.*).
var. latifolia (Fortunei).
— microphylla
B. microphylla. *Sieb.* et *Zucc.*
— — elegans.
— — rotundifolia.
— argentea.
— ovalifolia
B. ovalifolia *Sieb.*

SARCOCOCCA Lindl.

S. pruniformis *Lindl.* Bot. reg. tab. 1012. — India orient.
Buxus coriacea *Spreng.*

EMPETRACEÆ

EMPETRUM Lin.

E. nigrum *L.* — Fl. danica, VI, tab. 975; Engl. Bot. VIII, tab. 526. — Europa septentrionalis.
E. rubrum *Willd.* — Bot. reg. tab. 1783. — Magellania.

URTICEÆ

VILLBRUNEA Gaudich.

V. frutescens *Blum.* — Japonia.
Bœhmeria frutescens *Thunb.*
Urtica frutescens *Thunb.*

PIPERACEÆ

PIPER Lin.

P. Futokadsura *Sieb.* — Japonia.

CHLORANTHEÆ

CHLORANTHUS Sw.

C. inconspicuus *Swartz*, Phil. Transact. LXXVIII, tab. 15.
— Le *Maout* et *Dcne* Traité gén. bot. p. 504 cum Icon.
— China et Japonia.
Nigrina spicifera *Lamk.* Illustr., tab. 71.

CUPULIFERÆ

QUERCUS Lin.

SPECIES GERONTOGEÆ.

Q. coccifera *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 46. — *Kotsch.* Die Eich , tab. 29. — Regio mediterr.
Q. Kormesina *Hort.*

Q. calliprinos *Webb.*— *Jaub.* et *Spach*, Pl. or. ill, tab. 57.— Regio. mediterr.
Q. pseudo coccifera *Hook.*

Q. suber *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 45; *Kotsch.* Die Eich., tab. 33. (Vulg. *Chêne-Liége.*), — Europa australis.

Q. pseudo-suber *Desf.* — *Santi* Viag. tosc. I, tab. 4. — *Kotsch.* Die Eich., tab. 35. — Sicilia.

Q. Turneri *Hort. Paris.* — *Willd.* Baumz., tab. 3.

Q. Fontanesii *Guss.*

Q. castaneæfolia *Coss.* (non *C. A. Mey.*).

Q. esculenta *Hort.*

var. Gussonei.

Q. haliphlæos *Guss.* (non *Lamk.*).

— gibraltariensis.

Q. hispanica *var.* gibraltariensis *Lamk.*

Q. gibraltariensis fastigiata *Hort.*

— ægilopifolia.

Q. ægilopifolia *Pers.*

Q. hispanica *Lamk.*

Q. occidentalis *J. Gay.* in Bull. soc. bot. Fr. 1857 — Gallia occid.

Q. Suber *Duham.* Arb. II, tab. 20. (non *Lin.*).

Q. Ilex *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 46; *Kotsch.* Die Eich., tab. 38. — Europa australis.

Q. calycina *Poir.*

var. agrifolia.

— fagifolia.

— Fordii (fastigiata).

— gramuntia.

Q. gramuntia *L.*

— lanuginosa.

— longifolia (salicifolia).

— macrophylla.

— Shepherdi.

— serratifolia (serrata).

— Smilax.

Q. Ballota *Desf.* Act. acad. Paris ann. 1790 (cum Icon.). — Hispania.

Q. Ilex *var.* Ballota *Alph. DC.*

Q. castellana *Poir.*

Q. rotundifolia *Lamk.*

Vulg. *Chêne castillan.*

Q. lusitanica *Lamk.* — *Hook.* Icones VI, tab. 562. — Iberia.

Q. faginea *Lamk.*

Q. canariensis *Willd.*

Q. australis *Link.*

var. Boissieri.

Q. lusitanica *var.* Boissieri *Alph. DC.*

Q. humilis *Lamk.* — Lusitania.

Q. fruticosa *Brot.*

var. prasina.

Q. prasina *Bosc.* — Nouv. Duham. VII, tab. 44.

Q. Mirbeckii *Durieu.* — Mauritania.

Q. lusitanica *var.* bætica *Webb.*

Q. Cerris *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 57; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 92 et 93. — Europa merid.

Q. lanuginosa *Lamk.*

Q. crinita *Desf.*

var. sempervirens.

Q. austriaca *Willd.* — *Kotsch.* Die Eichen, tab. 20.

— Fulhamensis — *Loud.* Arb. III, fig. 1870-1871.

Q. Lucombeana *Swt.*

Q. Cerris dentata *Wats.* Dendr. brit., tab. 93. (non *Thunb.*)

Q. exoniensis *Lodd.*

— latifolia.

Q. Cerris.
var. crispa.
— laciniosa.
Q. Tournefortii *Willd.*
Q. Haliphlæos *Lamk.* (non *Guss.*).
Q. serratifolia *Hort. Booth.* — Hispania.
Q. Toza *Bosc.* Journ. hist. nat. II, tab. 32, fig. 3. — *Kotsch.* Die Eich., tab. 22. — Europa australis.
Q. humilis *Bosc* (non *Lamk.*).
Q. nigra *Thore* (non *Lin.* nec *Willd.*).
Q. stolonifera *Lapeyr.*
Q. pyrenaica *Willd.* — Nouv. Duham. VII, tab. 56.
Q. Tauzin *Pers.*
Vulg. *Chêne noir.* — *Secondat*, Chênes, tab. 5.
var. splendens.
Q. pyrenaica *var.* splendens *Hort.*
Q. pedunculata *Willd.* — Nouv. Duham., tab. 54; *Kotsch.* Die Eich., tab. 27. — Europa.
Q. Robur *L.* — Trans. Edimb. soc. I, tab. 4-5.
Q. racemosa *Lamk.* Encycl., tab. 779.
Q. Robur *var.* vulgaris *Alph. DC.*
var. concordia. — Illustr. hort. XVI, p. 578.
— diversifolia.
— fastigiata.
Q. fastigiata *Lamk.* — Nouv. Duham., tab. 55.
Q. pyramidalis *Hort.*
Q. Robur *var.* fastigiata *Alph. DC.*
— fastigiata aureo-bicolor.
— — cucullata.
— — cupressoides.
— — elata.
— — foliis atropurpureis.
— — heterophylla.

Q. pedunculata.

var. fastigiata macrophylla.
— — viridis.
— Fennessi (laciniata).
Q. Fennessi *Hort.*
Q. heterophylla Fennessi *Hort.*
Q. heterophylla Hentzii *Hort.*
— Fennessi dissecta (comptonæfolia).
— — cupreis.
Q. Robur nigra *Hort.* — Fl. des serres, XVII, tab. 1783.
— foliis involutis.
— — variegatis.
— heterophylla *Loud.*
Q. laciniata *Lodd.*
Q. ficifolia *Hort.*
Q. Robur dissecta *Hort.*
— Hodginsii *Loud.*
Q. Hodginsii *Lodd.*
Q. Robur *var.* Hodginsii *Alph. DC.*
Q. subfastigiata *Hort.*
— microcarpa *DC.*
Q. pedunculata microbalanos *Heuff.*
— pectinata.
— petiolaris.
— pendula.
Q. pendula *Lodd.*
Q. Robur pendula *Alph. DC.*
— pendula heterophylla (laciniata).
— purpurea.
Q. purpurea *Lodd.*
Q. Robur purpurascens *Alph. DC.*

Q. pedunculata.
var. rubrinerva.
— salicifolia pendula.
— striata. — Illustr. hort. XVII, p. 44.

Q. Brutia *Ten.* Fl. neapolitana V, tab. 197. — Italia.
Q. Robur *var.* Brutia *Alph. DC.*

Q. Thomasii *Ten.* Fl. neapolitana. V, tab. 198. — Calabr.
Q. pedunculata macrocarpa *Bess.*
Q. Robur Thomasii *Alph. DC.*

Q. apennina *Lamk.* — Nouv. Duham. VII, tab. 53. — Gallia et Italia.
Q. tomentosa *Ehrh.*
Q. pedunculata apennina *Godr.*

Q. sessiliflora *Sol.* — *Smith.* Engl. bot., tab. 1845; *Kotsch.* Die Eich., tab. 32. — Europa.
Q. sessilis *Ehrh.*
Q. Robur *var.* sessiiis *Martyn.*
Q. microcarpa *Lapeyr.*
Q. sessilifolia *Hort.*
— alnoides.
— afghanistanensis.
Q. afghanistanensis *Hort. Booth.*
— ambigua.
Q. ambigua *Hort.*
— cucullata.
Q. Robur foliis elegantibus *Hort.*
— Dauvessi pendula.
Q. Robur Dauvessi pendula *Hort.*
— falkenbergensis.
Q. falkenbergensis *Hort.*
— foliis agenteo-variegatis.
— foliis aureis.
Q. Robur foliis aureis *Hort.*

Q. sessiliflora.

var. foliis palide-variegatis.

— Geltoviana.

— iberica.

Q. iberica *Bieb.*

Q. Robur iberica *Alph. DC.*

— Louetti.

Q. Robur Louetti *Hort.*

— macrophylla.

Q. Robur macrophylla *Hort.*

— nigra.

Q. Robur nigra *Hort.*

— pendula.

— purpurea.

— rubens.

— sessilifolia.

Q. pubescens *Willd.* — *Reich.* Cent., tab. 44; *Kotsch.* Die Eich., tab. 34. — Europa.

Q. lanuginosa *Thuill.*

Q. Robur *var.* lanuginosa *Lamk.*

Q. Collina *Schleich.*

Q. sessiliflora *var.* pubescens *Loud.*, Encycl. fig. 1573.

Q. altissima *Hort.*

Q. ajudaghiensis *Stev.* — Rossia.

var. dissecta.

Q. Hartwisiana *Stev.* — Rossia.

Q. ajudaghiensis *var.* ventricosa *Hort. Booth.*

Q. Dalechampii *Ten.* — Italia.

Q. Robur *var.* Tenorei *Alph. DC.*

Q. Ægilops *L.* — *Hayne*, Darstell. XII, tab. 47. — Europa orientalis.

Q. Ægilops Oliveriana *Tchihat.* Asia min. II, tab. 42.

Q. Ungeri *Kotsch.* Die Eich., tab. 13.

Q. Vallonea *Kotsch.* Die Eich., tab. 7.

var. latifolia.

Q. Velani *Oliv.*

Q. vesca *Kotsch.* Die Eich., tab. 36. — Asia minor.

Q. Haas *Kotsch.* Die Eich., tab. 2. — Asia minor.

Q. Robur *var.* Haas *DC.*

Q. pedunculata *var.* Haas *Hort.*

Q. Ehrenbergii *Kotsch.* Die Eich., tab. 15. — Libania.

Q. Pyrami *Kotsch.* Die Eich., tab. 3. — Cilicia.

Q. hypoleuca *Kotsch.*

Q. Pyramus *Hort.*

Q. macrolepis *Kotsch.* Die Eich., tab. 16.— Græcia et Creta.

Q. Ægylops (pro parte) *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 51.

Q. castaneæfolia *C. A. Mey.* (non *Coss.*). — *Kotsch.* Die Eich. tab. 40. — Caucasus.

Q. macranthera *Fisch.* et *Mey.* — Caucasus.

Q. Dshorochensis *C. Koch.* — Asia minor.

Q. Robur *var.* Dshorochensis *Alph. DC.*

Q. Dschogoriensis *Hort.*

SPECIES ASIÆ ORIENTALIS.

Q. dentata *Thunb.* — Japonia.

Q. Daimyo *Sieb.* — Japonia

Q. mongolica *Fisch.* —Dahuria et Mandshuria.

Q. Robur *Pall.* (non *Lin.*).

Q. chinensis *Bnge.* — China septentrionalis.

Q. tomentosa *Hort.* — China borealis.
Q. bombyx tomentosa *Hort.*
Q. serrata *Thunb.* — Japonia et China sept.
Q. acutissima *Carruthers* in. Journ. Linn. soc. VI.
Q. serratifolia *Hort.*
Q. bombyx glabra *Hort.*
Q. glabra *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 89. — Japonia.
var. longifolia.
Q. acuta *Thunb.* — Japonia.
var. nervis roseis.
Q. glauca *Thunb.* — Japonia.
var. cæsia (Awokasi).
— lapidea (Isikasi).
— nigra (Kurokasi).
Q. salicina *Blume.* — Japonia.
Q. bambusæfolia *Hance.* — Bot. Herald, tab. 91.
Q. nepalensis *Desf.* — Nepalia.
Q. lanata *Lout.* Encycl. Trees, fig. 1633.
Q. incana *Roxb. var.* nepalensis *Alph. DC.*
Q. lamellosa *Sm.* (non *Hook.*).—*Wall.* Pl. as. rar. II, tab. 149, *Hook. fil.* Cathcart. Ill. him., tab. 28. — Nepalia.
Q. imbricata *Don.*
Q. lamellata *Roxb.*
Q. Wallichiana *Lindl.*
Q. cuspidata *Thunb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 2. — Japonia.
Q. angustifolia *Hort.*
Q. gilva *Blum.* — Japonia.
Q. incana *Roxb.*?
Q. angustifolia *Sieb.* — Japonia.
Q. salicifolia *Sieb.* — Japonia.
Q. striata *Hort. Sieb.* — Japonia.

Q. biglandulosa *Hort.*

Q. sclerophylla *Lindl.* in *Paxt.* Flow. gard. I, tab. 37. — China borealis.

§. SPECIES AMERICÆ SEPTENTRIONALIS.

Q. virens *Ait.* — *Michx*, Chênes, tab. 10-11; *Liebm.* Chênes tab. 33. — America septentrionalis.

Q. Phellos *var.* β *L.*

Q. virginiana *Mill.*

Q. sempervirens *Walt.*

Q. oleoides *Chom.* et *Schl.*

var. caroliniana.

— heterophylla.

— tomentosa.

Q. Phellos *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 12. — America septentrionalis.

Q. Phellos sylvatica *Michx*, Chênes, tab. 12.

var. dentata.

Q. imbricaria *Michx*, Chênes, tab. 15. — Georgia.

Q. Phellos *var.* β *Spach.*

Q. sericea *Willd.* — Carolina.

Q. pumila *Walt.* — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 15.

Q. Phellos *var.* pumila *Michx*, Chênes, tab. 15.

Q. cinerea *Michx.* Chênes, tab. 14. — Florida.

Q. Phellos cinerea *Spach.*

Q. Prinos *var.* β *L.*

Q. sempervirens *Catesb.* Carol., tab. 37.

Q. Phellos cinerea *Spach.*

Q. nigra *L.* — *Michx*, Chênes, tab. 22-23. — Amer. sept.

Q. ferruginea *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 18.

Q. marylandica *Catesb.* Carol. I, tab. 19.

Q. Genabii *Hort.*

Q. agnostifolia *Hort.*

Q. Nova-Genobi *Hort.* (*sic*!).

Q. aquatica *Walt.* — *Michx*, Chênes, tab. 19-21. — Florida.

Q. maritima *Willd.*

Q. Phellos maritima *Michx*, Chênes, tab. 13.

var. laurifolia.

Q. laurifolia *Michx*, Chênes, tab. 17 et 18.

— heterophylla.

Q. heterophylla *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 16.

— dentata *Michx*, Chênes, tab. 20, fig. 2.

Q. tinctoria *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 22. — Georgia.

var. hippophlæos.

Q. bicolor *Willd.* — *Emers.* Rep. Massach., tab. 14. — America septentrionalis.

Q. Prinus tomentosa *Michx*, Chênes, tab. 9, fig. 2.

Q. Prinus discolor *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 6.

Q. Michauxii *Nutt.*

var. platanoides.

Q. Prinus platanoides *Lamk.*

Q. velutina *L'Her.*

Q. pannosa *Bosc.*

Q. pannosa Michauxii *Hort.*

Q. mollis *Nutt.*

Q. Prinus *L.* — America septentrionalis.

Q. Prinus palustris *Michx*, Chênes, tab. 6.

Q. montana *Emers.* Rep. Mass., tab. 6.

var. acuminata.

Q. Prinus acuminata *Michx*, Chênes, tab. 8.

Q. montanea *Emers.* Rep. Mass. (non Icon.) (non *Willd.*).

Q. castanea *Muhl.* — *Emers.* Rep. Mass. tab. 5.

— monticola.

Q. monticola *Michx*, Chênes, tab. 7.

Q. montana *Willd.* (non *Emers.*).

Q. chincapin *Pursh.* — Carolina.
Q. Prinus pumila *Michx*, Chênes, tab. 9, fig. 1.
Q. — Chincapin *Michx fil.* Arb. amer II, tab. 10.
Q. pedunculata monticola *Hort.*
var. subvelutina.
— tomentosa.

Q. stellata *Wangenh.* Amer., t. 6.— *Emers.* Rep. Mass. tab. 3.
Q. obtusiloba *Michx*, Chênes, tab. 1.
Q. villosa *Walt.*

Q. alba *L.*—*Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 1. — *Emers.* Rep. Màss. tab. 1. — America septentrionalis.
Q. alba virginiana *Cat. Car.* I, tab. 21.
Q. americana alba *Hort.*
var. elongata.
— microcarpa.
Q. microcarpa *Hort.*

Q. nobilis *Hort.*

Q. falcata *Michx*, Chênes, tab. 28. — America septent.
var. Ludoviciana.
Q. Novi-Aureliani *Hort.*

Q. Banisteri *Michx*, Chênes, tab. 27. — Vírginia.
Q. ilicifolia *Wangenh.* — *Emers.* Rep. Mass., tab. 11.

Q. rubra *L.* — *Michx*, Chênes, tab. 35-36. — Georgia.
Q. coccinea *var.* rubra *Spach.*

Q. palustris *Duroi.* — *Michx*, Chênes, tab. 33-34. — Virginia.
Q. rubra dissecta *Lamk.*

Q. coccinea *Wangenh.* Amer. — *Michx*, Chênes, tab. 31-32. — America septentrionalis.
Q. ambigua *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 24.
Q. borealis *Michx.*

Q. lyrata *Walt.* — *Michx*, Chênes, tab. 4. — America sept.

Q. lobata *Nee.* — *Liebm.* Chênes tab. 42. — California.
Q. Hindsii *Benth.*

Q. macrocarpa *Michx*, Chênes, tab. 2 et 3. — America septentrionalis.
var. macrophylla.
— pandurata.

Q. olivæformis *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 2. — America septentrionalis.
Q. macrocarpa *var.* olivæformis *A. Gray.*
var. Hampteri.

Q. densiflora *Hook.* et *Arn.* — *Hook.* Icones, tab. 380. — California.

§. SPECIES MEXICANÆ.

Q. chrysophylla *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 87.

Q. confertifolia *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 96.

Q. reticulata *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 86.
Q. rugosa *Nee.*

Q. Hartwegi *Benth.*
Q. ambigua *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 93 (non *Michx*).
Q. obtusata *var.* Hartwegi *Alph. DC.*
Q. Hartwisiana *Hort.* (non *Stev.*).

Q. magnoliæfolia *Nee.*
var. lutea.
Q. lutea macrocarpa *Hort.*

Q. Ghiesbreghti *Martens.* — *Liebm.* Chênes tab. 21.

Q. pandurata *H. B. K.* Pl. æquin., tab. 77.
Q. obtusata *var.* pandurata *Alph. DC.*

Q. polymorpha *Cham.* et *Schl.* — *Liebm.* Chênes tab. 38.
Q. petiolaris *Benth.*

Q. Sideroxyla *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 85.
Q. Sideroxylon *Hort.*

Q. skinneri *Benth.* — *Hook.* Icones, tab. 402; *Liebm.* Chênes tab. 1.

Q. xalapensis *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 75; *Liebm.* Chênes tab. 4.

Q. tomentosa *Willd.* — Mexico.

Q. callosa *Benth.*

var. diversifolia.

Q. diversifolia *Nee.*

§. STIRPES DUBIÆ IN SEMINARIIS CULTÆ.

Q. Agbayi *Hort.*

Q. comata *Hort. Booth.*

var. pendula.

Q. almoides *Hort. Booth.*

Q. dilacerata *Hort.*

Q. Fapannsii *Hort.*

Q. roseo-striata *Hort.*

Q. sonchifolia *Hort. Booth.*

Q. stenocarpa *Hort.*

Q. syriaca *Hort.*

Q. Quexigo *Hort.*

Q. Neumanni *Hort.*

Q. lanata *Hort.*

Q. lancifolia *Hort.*

CASTANOPSIS Spach.

C. chrysophylla *Alph. DC.* — Orégon.

Castanea chrysophylla *Hook.* Bot. mag. 4953. — Belg. hort. VII, p. 248.

CASTANEA Tourn.

C. vulgaris *Lamk.* — Nouv. Duham. III, tab. 19. — Europa

Fagus Castanea *L.* — Engl. bot., tab. 886.

Castanea vesca *Gærtn.* Fruct., tab. 3.

C. Bungeana *Blume.*

C. vulgaris.
var. americana *Michx*, Arb. amer. II, tab. 6.
C. americana *Rafin.*
— pendulifolia *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined.
— aspleniifolia (dissecta).
— cochleata (crispa).
— heterophylla.
— quercifolia.
— Downtoniana.
— prolifera.

C. pumila *Mill.*— *Michx*, Arb. amer. II, tab. 7.— Amer. sept.
C. Chincapin *Hort.*
Fagus pumila *L.*
F. nana *Duroi.*

FAGUS Tourn.

F. ferruginea *Ait.* — *Michx*, Arb. amer. II, tab. 9. — America septentrionalis.
F. americana latifolia *Wangenh.*
F. sylvestris *Michx*, Arb. amer. II, tab. 8.
F. sylvatica americana *Loud.*
F. alba *Rafin.*

F. sylvatica *L.* — Fl. danica VIII, tab. 1283; Nouv. Duham. II, tab. 24. — Europa.
F. sylvestris *Gærtn.* Fruct, I, tab. 37.
Castanea Fagus *Scop.*
var. monstrosa.
— Pagnyensis.
— pendula.
— pyramidata.
— Remilliensis.
— retroflexa.
— tortuosa.
— aspleniifolia (laciniata).

F. sylvatica.
var. castaneæfolia.
— cristata.
— grandidentata
— latifolia.
— quercifolia.
— purpurea.
— — major (atropurpurea).
— — pendula.
— cuprea.
— foliis variegatis.
— — tricoloribus.

F. obliqua *Mirb.* Mém. Mus. XIV, tab. 23. — Fretum Magell.
F. valdiviana *Philip.*
F. obliqua β valdiviana *Alph. DC.*

F. Cunninghami *Hook.* Journ. bot. 1840, tab. 7; Fl. Tasm. I, p. 346. — Tasmania.

F. betuloides *Mirb.*— *Hook. fil.* Fl. antarct. II, tab. 124. — Fretum magell.
Betula antarctica *Forst.*
Calusparassus betuloides *Homb.* Voy. Pôle sud, tab. 7.

CORYLACEÆ

CORYLUS Tourn.

C. Avellana *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 780. — Europa.
var. pendula.
— crispa.
— latifolia (filicifolia).
— quercifolia.
— urticæfolia (laciniata).
— foliis variegatis.
— grandis (pedemontana).
— glomerata.

C. avellana.

Varietates hortenses diversæ.

var. africana.
— algérienne rouge.
— anglica.
— à gros fruits.
— aveline dorée.
— — à feuilles panachées.
— — de Barcelone.
— — de Péronne.
— — ronde.
— — rouge.
— — à fruit strié (striata).
— Bucharest (?)
— Band-Nusa.
— californica.
— commun à grappes.
— Cosford.
— Dowton.
— Einzeln Tragende (?)
— fertile d'Angers.
— franche.
— Gekrausette Filber Nuss.
— glomerata.
— grandis.
— heterophylla.
— Louis-Berger.
— macrocarpa.
— mandell Nuss.
— merveille de Bollwiller.
— Micheli.
— Nottingham's prolific.

C. avellana.
var. précoce d'Angers.
— præcox oblonga.
— prolific.
— spicata præcox.

C. heterophylla *Fish.* — *Trautv.* Imagines ross. I, tab. 4. — Dahuria.
C. avellana *Pall.* (non *Lin.*).
C. avellana *var.* dahurica *Ledeb.*

C. Colurna *L.* — Fl. des serres XXI, tab. 2223 et 2224. — Thracia.
C. arborescens *Hort.*
C. bizantina *Clus.*
C. pontica *C. Koch.*

C. tubulosa *Willd.* — *Reichb.* Icones, tab. 637. — Istria.
var. atropurpurea (purpurea).

Varietates hortenses.

var. à coque tendre.
— d'Espagne.
— — grosse ronde.
— à pellicule rouge.
— ronde d'Espagne.
— rubra.
— de Trébizonde (impériale).

C. americana *Walt.* — America septentrionalis.
var. humilis *Wangenh.* Arb., tab. 29.

C. mexicana *Hort.*

C. rostrata *Ait.* — America septentrionalis.

OSTRYOPSIS Dcne.

O. Davidiana *Dcne.* Bull. soc. bot. 1873, p. 155. — Mongolia.

CARPINUS Tourn.

C. Betulus *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 58. — Eur. et Asia.
C. carpinizza *Kit.*
var. incisa.
— pendula.
— quercifolia *Desf.*
Ostrya quercifolia *Hort.*
— purpurea.
C. Betulus foliis purpureis *Hort.*
— aureo-variegata.

C. caroliniana *Walt.* — amer. septentrionalis.
C. americana *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 8. — America borealis.

C. Duinensis *Scop.* Carn. ed. 1772, tab. 60. — Asia occid.
C. orientalis *Lamk.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 98.

OSTRYA Micheli.

O. carpinifolia *Scop.* — Europa merid. et Asia.
O. vulgaris *Willd.* — *Reichb.* Icones, tab. 635.
O. italica *Spach.*
O. quercifolia *Hort.*
Carpinus Ostrya *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 59.

O. virginica *Willd.* — America septentrionalis.
O. vulgaris *Wats.* Dendr. brit., tab. 143.
O. americana *Michx.*
Carpinus virginiana *Clit.*

DISTEGOCARPUS Sieb. et Zucc.

D. Carpinus *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Carpinus japonica *Blum.*

JUGLANDEÆ

JUGLANS Lin.

J. regia *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 47. — Europa et Asia.
var. pendula.
— heterophylla.
— laciniata.
— monophylla.
— bifera.
— serotina (*Noyer de la St-Jean*).— Rev. hort. 1863, p. 450.
— præparturiens (fertilis).
— racemosa (spicata).
J. californica *Hort.*
— dura.
— macrocarpa (maxima). — Vulg. *Noix à bijoux.*
— oblonga.
— ovata *Hort.* (non *Mill.*)
— tenera (fragilis).
— rugosa.

J. intermedia *Hort.* — The Garden, 1876, p. 365 et 367 cum Icon.
J. piriformis *Carr.* Rev. hort. 1863, p. 29 et 30. (non *Liebm.*).
J. hybrida *Hort.*

J. Vilmoriniana *Carr.* (Stirps hybrida ?).

J. segreziensis *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.

J. nigra *L.* — *Michx*, Arb. amer. I, tab. 1; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 158. — Amer. septentrionalis.
var. racemosa (an species propria? sub nomine *J. neglectæ.* in Arb. segrez. indicata).
— crassa.
— lævis.

J. nigra.
var. acuta.
J. nigra *Lois.* — Nouv. Duham. IV, tab. 48.
— oblonga. *Hort.* (non *Mill.*).
J. stylosa *Lavall.* — Amer. septentrionalis.
J. nigra *Hort.* (non *Lin.*).
J. cinerea *L.* — *Jacq.* Icones, tab. 192. — amer. sept.
J. oblonga *Mill.*
J. cathartica *Michx*, Arb. amer. I, tab. 2.
var. glomerata.
J. mandshurica *Maxim.* — Regio Amur.
var. dumosa (nana).
— ailanthifolia. — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined.
J. ailanthifolia *Sieb.*
J. macrophylla *Hort.*
J. rupestris *Engelm.* — *Sitgreaves*, Rep., tab. 15 et 16. — America borealis.
J. fruticosa *Hort. Bot. Berol.*(Ex hort. *Sim.-Louis.*).— Patria ignota.

CARYA Nutt.

C. alba *Nutt.* — *Emers.* Rep. Massach., tab. 12; Belg. hort VI, p. 219. — Amer. septentrionalis.
Juglans ovata *Mill.*
J. squamosa *Lamk.* — *Michx,* Arb. amer. I, tab. 7.
J. alba *Michx.* (non *Lin.*)
C. sulcata *Nutt.* — America septentrionalis.
Juglans laciniosa *Michx*, Arb. amer. I, tab. 8.
J. hybrida *Hort.*
C. tomentosa *Nutt.* — *Emers.* Rep. massach., tab. 13. — America septentrionalis.
Juglans alba *L.* (non *Michx*). — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 148.

C. tomentosa.

Juglans tomentosa *Lamk.* — *Michx*, Arb. amer. I, tab. 6; Kern. hort., tab. 518.

C. amara *Nutt.* — *Emers.* Rep. Massach., tab. 15. — Georgia et Texas.

Juglans angustifolia *Lamk.*

J. amara *Michx*, Arb. amer. I, tab. 4.

C. aquatica *Nutt.* — Carolina et Georgia.

Juglans aquatica *Michx*, Arb. amer. I, tab. 5.

C. olivæformis *Nutt.* — Belg. hort. XI, p. 219. — Louisiana.

Juglans cylindrica *Lamk.*

J. olivæformis *Michx*, Arb. amer. I, tab. 5.

PTEROCARYA Kunth. (1).

P. fraxinifolia *Spach.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Russia.

Juglans fraxinifolia *Lamk.*

J. pterocarpa *Willd.*

P. caucasica *C. A. Mey.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Caucasus.

P. dumosa *Lavall.* — Patria ignota.

P. fraxinifolia *Hort.* (non *Spach.*).

P. caucasica *Hort.* (non *C. A. Mey.*).

P. stenoptera *Cas. DC.* — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Asia septentrionalis.

P. japonica *Hort.* (non *P. sorbifolia*, nec *rhoifolia* *Sieb.* et *Zucc.*).

P. lævigata *Hort.*

P. sinensis *Hort.*

(1) Les 4 espèces de *Pterocarya* énumérées ici sont très-distinctes et ne sauraient être réunies; elles ont fleuri et fructifié à Segrez. Les 3 premières sont confondues dans les pépinières et les jardins publics sous les noms de *P. fraxinifolia* ou *P. caucasica*.

PLATYCARYA Sieb. et Zucc.

P. strobilacea *Sieb.* et *Zucc.* Abhandl. der. Münch. acad. III, tab. 5. — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia et China.

Fortunea chinensis *Lindl.* Journ. Hort. soc. I, tab. 151. — Fl. des serres IV, tab. 331.

MYRICACEÆ

MYRICA Lin.

M. cerifera *L.* — *Bigelow*, Med. bot., tab. 48. — Louisiana.

M. pensylvanica *Hort. Paris.* — Nouv. Duham. II, tab. 55. — America septentrionalis.

M. caroliniensis *Mill.*

M. cerifera *var.* media *Michx.*

M. Gale *L.* — Fl. danica II, tab. 827; Nouv. Duham II, tab. 57. — Europa et America sept.

M. californica *Cham.* et *Schlecht.* Linnæa VI, p. 335. — Journ. Hort. soc. VII, tab. 283. — California.

COMPTONIA Banks et Soland.

C. aspleniifolia *Banks* et *Soland.* — Nouv. Duham. II, tab. 11; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 156. — America borealis.

Liquidambar aspleniifolium *L.*

Myrica Comptonia *Cas. DC.*

BALSAMIFLUÆ

LIQUIDAMBAR Lin.

L. styraciflua *L.* — *Michx*, Arb. amer. III, tab. 5; Nouv. Duham. II, tab. 40. — America septentrionalis.

L. orientalis *Mill.* — *Hook.* Icones, tab. 1019. — Asia minor.

Platanus orientalis *Pococke*, Trav. II, tab. 89. (non *Lin.*).

L. imberbe *Ait.*

PLATANEÆ

PLATANUS Tourn.

P. orientalis *L.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 945; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 101: Nouv. Duham. II, tab. 1.— Oriens.

P. palmata *Mœnch.*

P. hispanica *Ten.*

P. occidentalis *Hort.* (non *Lin.*).

P. vulgaris *var.* orientalis *Spach.*

var. umbraculifera (nana, tortuosa).

P. cuneata *Hort.* (non *Willd.*).

— acerifolia *Loudon*, Encycl. of Trees, p. 928, fig. 1733.

P. algeriensis *Hort.*

— nepalensis (pyramidata, laciniata).

P. cuneata *Willd.* — Asia minor.

P. orientalis cuneata *Loud.*

P. — undulata *Ait.*

P. — flabelliformis *Spach.*

P. occidentalis *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 100; *Michx*, Arb. amer. III, tab. 3. — Amer. borealis.
P. vulgaris *var.* occidentalis *Spach.*
P. lobata *Mœnch.*
P. hybrida *Brot.*
P. integrifolia *Hort.*
P. macrophylla *Hort.*

P. racemosa *Nutt.* North.-Amer. sylv. I, tab. 15. — California.
P. californica *Benth.*

BETULACEÆ

BETULA Tourn.

B. alba *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 50. — Europa.
B. verrucosa *Ehrh.*
var. fastigiata (Baumanni).
— pendula Youngii *Hort.*
— tristis.
B. tristis *Link.*
— populifolia *Spach.*
B. populifolia *Willd.* — *Michx fil.* Arb. Amer. II, tab. 2.
B. acuminata *Ehrh.*
B. laciniata *Hort.* (non *Wahlenb.*).
— dalecarlica *L.*
B. hybrida *Blom.*
B. laciniata *Wahlenb.*
— sibirica *Hort.*
— foliis purpureis.

B. papyrifera *Michx.* — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 1. — America septentrionalis.

B. papyracea *Willd.*

B. alba *var.* papyrifera *Spach.*

B. amygdalifolia *Hort.* (non *Willd.*).

var. cordifolia.

C. pubescens undulaia *Hort.*

B. pubescens *Ehrh.* — *Guimp.* et *Hayn.* Deutsch. holtz. tab. 146. — Europa.

B. alba *var.* pubescens *L.*

B. carpathica *Wald.* et *Kit.*

B. pontica *Desf.*

B. ætnensis *Rafin.*

B. harcynica *Wend.*

B. papyracea *Hort.* (non *Willd.*).

B. nigra *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 153. — America borealis.

var. pendula *Hort.*

B. urticifolia *Reg.* — Suecia.

B. alba *var.* urticifolia *Spach.*

B. pubescens *var.* urticifolia *Hort.*

B. crispa *Hort.* (non *Ait.*).

B. rubra *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 3. — America bor.

B. ulmifolia *Sieb.* et *Zucc.* — Mandshuria borealis.

B. costata *Trautv.*

B. Ermani *Cham.* in Linnæa VI, tab. 6, fig. D. — Sibiria orientalis.

B. Bhojpaltra *Wall.* — *Regel.* Monogr. Betul., tab. 6. — Japonia.

B. utilis *Don.*

B. Jacquemontii *Spach.* — *Dene.* in *Jacq.* voy. tab. 158.

B. corylifolia *Reg.* et *Maxim.* — *Regel.* Bem. ii Bet. VIII, tab. 8. — Japonia.

B. lenta *Willd.* — *Michx*, Arb. amer. II, tab. 4. — Amer. bor.

B. lutea *Michx*, Arb. amer. II, tab. 5. — America borealis.

B. persicæfolia *Hort.*

B. acuminata *Wall.* — Nepalia.

B. acuminata *var.* δ et ζ *Reg.* Monogr. Betul., tab. 6 et 13.

B. cylindrostachys *Lindl.* (non *Wall.*).

Betulaster cylindrostachys *Spach.*

B. pumila *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 97.— Amer. bor.

B. rotundifolia *Hort.*

B. daurica *Hort.* (non *Pall.*).

B. frutescens *Hort.*

B. fruticosa *Hort.* (non *Pall.*).

B. Quebecensis *Burgsd.* in Berl. schrift. nat. V, p. 196. — Canada.

B. humilis *Schrank.*— *Reichb.* Icones. Fl. germ. XII, tab. 621. — Europa meridionalis.

B. pycowiensis *Reichb.* Icones, Fl. germ. III, tab. 622.

B. Socolowii *Jacq. fil.*

B. fruticosa *Pall.* Fl. ross. tab. 40.

B. sibirica *Lodd.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 154, fig. B.

B. nana *L.* — Flor. lapp., tab. 6. — Helvetia.

ALNUS Tourn.

A. viridis *DC.*—*Rchb.* Icon. Fl. germ. XII, tab. 628. — Europa

A. undulata *Willd.*

A. crispa *Pursh.*

A. Mitcheliana *Curtis.*

Alnaster viridis *Spach.*

A. fruticosa *Ledeb.*

Betula crispa *Michx.*

var. sibirica.

A. suaveolens *Reg.*

A. viridis *var.* suaveolens *Reg.*

A. cordifolia *Ten.* Flor. nap. Icones II, tab. 99. — Europa meridionalis.

var. nervosa.

A. maritima *Nutt.* North.-Amer. Sylv. suppl. I, tab. 10. — America septentrionalis.

var. arguta. — Mandshuria.

A. japonica *Sieb.* et *Zucc.* — *Reg.* Monogr., tab. 15, f. 22-27. — Japonia.

A. glutinosa *Willd.* — Fl. danica XIII, tab. 2302.— Europa.

A. elliptica *Reg.*

A. denticulata *C. A. Mey.* — *Eichw.* Cauc., tab. 2.

A. barbata *C. A. Mey.*

A. sibirica *Hort.* (non *Fisch.*).

var. laciniata *Willd.*

A. glutinosa *var.* pinnatifida laciniata *Reg.* Monogr., tab. 15, fig. 36-37.

— imperialis *Hort. Desfossé-Thuil.*

— incisa *Willd.*

A. glutinosa *var.* pinnatifida incisa *Reg.* Monogr., tab 17, fig. 9-10.

A. Oxyacantha *Hort.*

— quercifolia *Willd.*

A. pubescens *Tausch.* — Bohemia.

A. badensis *Lang.*

A. glutinosa pubescens *Reg.*

A. serrulata *Willd.* — *Michx*, Arb. amer. III, tab. 4. fig. 1. — America borealis.

A. glutinosa *var.* serrulata *Reg.* Monogr., tab. 11, f. 6-10.

A. glutinosa *var.* acutifolia *Spach.*

A. hybrida *Reich.*

var. rugosa.

A. rugosa *Hort.*

A. americana *Hort.*

A. incana *Willd.* — *Reg.* Monogr., tab. 16, fig. 11-18, et tab. 17, fig. 1-8. — Europa, Asia et Amer. sept.

A. hirsuta *Turcz.*

A. alpina *Bork.*

var. sibirica *Spach.* — Sibiria.

A. sibirica *Fisch.*

— glauca *Ait.*

A. glauca *Michx*, Arb. amer. III, tab. 4, fig. 2.

A. intermedia *Schrad.*

— laciniata.

A. incana *var.* pinnatifida laciniata *Reg.* Monogr., tab. 17, fig. 5.

A. serrata *Hort.*

— laciniata acuminata.

A. incana acuminata *Hort.*

A. incana *var.* pinnatifida acuminata *Reg.* Monogr., tab. 17, fig. 2.

— nana plicata.

A. nana plicata *Hort.*

SALICINEÆ

POPULUS Tourn.

P. alba *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 53. — Europa.

var. acerifolia.

P. Arenbergica *Lodd.*

— grisea.

P. major *Mill.*

— nivea.

P. nivea *Willd.* — *Schk.* Handb. tab. 330.

P. alba.

var. Bachofeni.

P. Bachofenii *Wierzb.* — *Reichb.* Icones, Fl. germ. V, tab. 616.

P. belgica *Lodd.*

P. canescens *Smith.* Engl. bot., tab. 1619. — Europa.

P. alba Tremula *Krause.*

P. hybrida *Bieb.* — *Rchb.* Fl. germ. XI, tab. 615.

P. alba Erhenbergii *Hort.*

Vulg. *Grisard.*

P. Tremula *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 819. — Europa Africa et Asia.

P. cilicica *Kotsch.*

P. australis *Ten.*

Vulg. *Tremble.*

var. pendula.

P. supina *Lodd.*

— parvifolia.

— villosa.

P. villosa *Lang.* — *Rchb.* Fl. germ. XI, tab. 617.

P. Simoni *Carr.*

P. tremuloides *Michx*, Arb. amer. III, tab. 8, fig. 1. — America sept.

P. græca *Willd.* — Nouv. Duham. II, tab. 54.

P. benzoifera *Tausch.*

P. atheniensis *Hort.*

P. cordata *Hort.*

P. grandidentata *Hort.* (non *Michx*).

P. grandidentata *Michx* Arb. amer. III, tab. 8, fig. 2. — America septentrionalis.

P. Sieboldi *Miq.* — Japonia.

P. rotundifolia *Sieb.*

P. heterophylla *L.* — Nouv. Duham. I, t. 51. — Louisiana.

P. cordifolia *Burgsd.*

P. heterophylla.

var. argentea.

P. argentea *Michx*, Arb. amer. III, tab. 9.

P. nigra *L.* — Engl. bot , tab. 1910. — Europa et Asia.

P. pannonica *Kit.* in *Reich.* Icones Fl. germ., tab. 619.

var. betulæfolia *Wesm.* — America septentrionalis.

P. betulæfolia *Pursh.*

P. Hudsoniana *Michx. fil.* Arb. amer. III, tab. 10 fig. 1.

P. canadensis vera *Hort.*

— pyramidalis *Spach.* — Vulg. *Peuplier d'Italie.*

P. dilatata *Ait.* — *Hayne*, Darstell. XIII, tab. 46.

P. fastigiata *Desf.*

P. nigra italica *Duroi.*

P. pannonica italica *Mœnch.*

P. italica dilatata *Willd.*

P. pyramidata *Hort.*

— plantierensis mascula *Hort. Sim.-Louis.*

— — fœmina *Hort. Sim.-Louis.*

— crispa *Hort.*

P. berolinensis *C. Koch.* (Stirps hybrida).

P. canadensis *Desf.*—*Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 11. — America septentrionalis.

P. marylandica *Bosc.*

P. lævigata *Hort.*

P. angulata *Hort.* (non *Michx*).

P. monilifera *Ait.*—*Wats.* Dendr. brit, tab. 102; *Michx*, Arb. amer. III, tab. 10, fig. 2.

P. virginica *Desf.*

P. carolinensis *Borkh.*

P. angulosa medusæ *Hort.*

Vulg. *Peuplier suisse.*

var. pendula.

— Eugenei.

— grandis (régénéré).

P. canadensis.

var. foliis variegatis.

P. angulata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 12. — Amer. sept.

P. cordata *Aliq. Hort.*

P. cordifolia *Hort.* (non *Burgsd.*).

P. macrophylla *Lodd.* (non *Lindl.*).

Vulg. *Peuplier de la Caroline.*

P. candicans *Ait.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, t. 2. — Canada.

P. ontariensis *Desf.*

P. macrophylla *Lindl.* (non *Lodd.*).

P. latifolia *Mœnch.*

P. Acladesca *Hort.* (sic!).

P. heterophylla *Hort.* (non *Lin.*).

P. americana latifolia *Hort.*

P. balsamifera *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 13: Nouv. Duham. II, tab. 50. — America et Asia sept.

P. Tacamahaca *Mill.*

P. viminea *Hort.*

P. candicans *Hort.* (non *Ait.*).

var. suaveolens.

P. suaveolens *Fischer.*

— viminalis.

P. viminalis *Lodd.*

P. longifolia *Pall.* Fl. ross., tab. 41.

P. Lindleyana *Hort. Booth.*

P. salicifolia *Hort.*

SALIX Tourn. (1).

S. alba *L.* — Fl. danica, XV, tab. 2552; Nouv. Duham. III. tab. 26; *Hoffm.* Salic., tab. 7 et 8. — Sibiria.

S. nana argentea *Hort.*

S. Bradfordii *Hort.*

(1) J'ai suivi dans l'énumération des saules cultivés à Segrez la classification et la synonymie adoptées par M. Andersson dans sa *Monographia Salicum*.

S. triandra *L.* — *Anders.* Monogr. salic., p. 23, fig. 17; *Hoffm.* Salic. tab. 9 et 10. — Europa.
S. amygdalina *L.* — *Host.* Salic., tab. 13-14.
S. Villarsiana *Flugge.*
S. Hoffmanniana *Smith.* Engl. bot., tab. 2620.
S. Hoppeana *Willd.* — *Rechb.* Fl. germ. XI, tab. 605.
S. androgyna *Hoppe.*
S. hastata *Thuil.* (non *Lin.*).
S. italica nigra *Hort.*
S. pomeranica *Hort.*
S. triandra nigra *Hort.*

S. pentandra *L.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 34; *Anders.* Monogr., Salic. p. 39, fig. 24. — Europa.

S. fragilis *L.* — Fl. danica, XIV, tab. 2484. — Europa.
S. lanceolata *Hort.*
S. petiolaris *Hort.*
S. conformis *Hort.*
S. uliginosa *Hort.* (non *Willd.*).
var. latifolia.
S. monspeliensis *Forbes*, Salic. woburn., tab. 30.
S. excelsa *Tausch.*

S. vitellina *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 27 bis.; *Host.* Sal., tab. 30-31; *Hoffm.* Salic., tab. 11 et 12. — Sibiria.
Vulg. *Osier jaune.*

S. babylonica *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 27. *Anders.* Monogr. Sal., fig. 32. — Persia.
S. propendens *Ser.*
Vulg. *Saule pleureur.*
var. annularis.
S. annularis *Forbes*, Salic. woburn., tab. 41.

S. japonica *Thunb.* Fl. jap., cum icon. — Japonia.
S. babylonica *var.* japonica *Anders.*
S. fragilis *Hort.* (non *Lin.*).
S. petiolaris *Hort.* (non *Smith*).
S. decipiens *Hort.* (non *Hoffm.*).

S. aurita *L.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 124; *Anders.* Monogr., Sal. fig. 43; *Hoffm.* Salic., tab. 4. — Europa,
S. uliginosa *Willd.* — *Guimp.* Holzgew., tab. 190.
S. rugosa *Ser.*
S. ulmifolia *Vill.* (non *Hort. Par.*).

S. cinerea *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 28 *bis;* Fl. danica, XV, tab. 2601. — Europa.
S. acuminata *Ehrh.* (non *Pall.*) — *Hoffm.* Salic., tab. 6.
S. incana *Hort.*
S. firma *Hort.*
var. rufinervis *DC.*

S. capræa *L.* — *Anders.* Monogr., Sal. fig. 45. — Europa.
S. tomentosa *Ser.* (non *Host.*, nec *Schrad.*).
S. hybrida *Vill.*
S. pallescens *Hort.*
Vulg. *Saule marceau.*
var. ulmifolia. *Hort. Paris.* — Nouv. Duham. III, tab. 25.
— nervosa.
— Kilmarnoki *Hort.*
— pendula.

S. repens *L.* — *Anders.* Monogr., Salic., fig. 64. — Europa.
S. arenaria *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 30.
S. depressa *Hoffm.* Salic., tab. 15 et 16.
S. argentea *Smith.* Engl. bot., tab. 1364.
S. prostrata *Thuil.*
S. sericea *Hort.*

S. nigricans *Smith.* Engl. bot., tab. 1213. — Europa.
S. phylicifolia *var.* β *Lin.* — Fl. danica VI, tab. 1053.
S. stylosa *DC.*
S. stylaris *Ser.* — *Rchb.* Fl. germ., tab. 573.
S. — lancifolia *Hort.*
S. hastata *Hopp.* (non *Lin.*).
S. stipularis *Hort.*
S. tetrapla *Hort.*

S. phylicifolia *L.* — *Anders.* Monogr., Salic. fig. 70. — Suecia.

S. arbuscula *L.* — Fl. danica VI, tab. 1055.

S. bicolor *Ehrh.* — *Guimpel*, Holzgew, tab. 180.

S. formosa *Willd.* — *Rchb.* Fl. germ. XI, tab. 566.

S. nitens *Anders.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 44.

var. Croveana *Ser.*

S. nigricans *Ser.* (non *Smith.*).

S. nigra elliptica *Ser.*

S. arbuscula *L.* — *Anders.* Monogr., Sal. fig. 80. — Europa.

S. laurina *Smith.* Engl. bot., tab. 1806. — Europa borealis.

S bicolor *Smith.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 38.

var. microcarpa *Anders.*

S. venusta *Hort.*

S. daphnoides *Vill.* — *Rechb.* Icones, Fl. germ., tab. 1253. — Europa borealis.

S. bigemmis *Hoffm.* Salic., tab. 32.

S. præcox *Hopp.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 26.

S. pomeranica *Willd.* — *Rchb.* Fl. germ. XI, tab. 602.

S. cinerea *Smith.* Engl. bot., tab. 1897.

S. capræa *Hort.* (non *Lin.*)..

S. glauca *Hort.*

S. bicolor *Hort.* (non *Smith.*).

Vulg. *Saule bleu*, *Saule en candélabre.*

S. viminalis *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 28; Fl. danica XIV, tab. 2485; *Hoffm.* Salic. tab. 2. — Europa.

S. longifolia *Lamk.* (non *Mhlbr.* nec *Host.*).

S. rosea *Hort.*

var. angustissima.

S. dasyclados *Wimm.* — Europa.

S. calodendron *Wimm.*

S. acuminata *Smith.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 131.

S. Smithiana *var.* acuminata *Anders.*

S. stipularis *Smith.* Engl. bot., tab. 1214. — Fl. danica, XV. tab. 2668. — Europa.
S. viminalis *var.* dasyclados *Wimm.*
S. Hostii *Kern.*
var. vestita.
S. dasyclados *Hort.* (non *Wimm.*)

S. incana *Schrank.* — *Host.* Sal., tab. 58 et 59; *Forbes*, Sal. woburn., tab. 90. — Europa australis.
S. rosmarinifolia *Gouan.* (non *Lin.*).
S. angustifolia *Lapeyr.* — Nouv. Duham. III, tab. 29.
S. linearis *Forbes.* Salic. woburn. tab. 89.
S. riparia *Willd.* — *Host.*, Salic., tab. 58 et 59.

S. Seringeana *Gaud.* — *Rechb.* Icones Fl. germ. tab. 1229; *Coss.* Atlas tab. 30. — Helvetia.
S. lanceolata *Ser.* Saules, tab. I.
S. longifolia *Schleich.* (non *Mhlbr.* nec *Host.*).
S. holosericea *Ser.*
S. canescens *Willd.*
S. incano-capræa *Wimm.*
S. capræo-incana *Wimm.*
S. cinereo-incana *Wimm.*
S. microdentata *Hort.*

S. purpurea *L.* — Fl. danica, XV, tab. 2554. — Europa.
S. monandra *Hoffm.* Salic., tab. 1, 5 et 23.
S. carniolica *Hort.*
Vulg. *Osier rouge.*
var. Lambertiana *Anders.*
S. Lambertiana *Sm.* Brit. 1041. — *Forbes*, Sal. wob., t. 3-4.
S. pratensis *Scop.* — *Host.* Salic., tab. 50 et 41.
S. oppositifolia *Hort.*
S. mutabilis *Hort.*
— helix *Anders.*
S. helix *L.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 2.
S. microphylla *Hort.*
S. americana pendula *Hort.*
Vulg. *Saule pleureur d'Amérique*

S. purpurea.
var. pallescens *Anders.*
S. pallescens *Hort.*
S. rubra *Huds.* — *Host.* Sal., tab. 34 et 35. — Europa.
S. fissa *Hoffm.* Salic., tab. 13 et 14.
S. olivacea *Thuil.*
S. virescens *Vill.*
S. concolor *Host.* Salic., tab. 31 et 35.
S. mollissima *Wahlenb.*
S. Hoffmannia *Tausch.*
S. acuminata lanceolata *Hort.*
S. Basfordiana *Hort.*
S. betulæfolia *Hort.*
S. heterophylla *Hort.*
var. purpureoides latifolia *Gren.* et *Godr.*
S. Forbyana *Smith.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 5.

STIRPES MIHI IMPERFECTE NOTÆ

S. alaternoides *Forbes.*
S. ambigua *Ehrh.* vel *Pursh.*
S. Ammaniana *Willd.*
S. Amsoniana *Forbes.*
S. atrovirens *Forbes.*
S. attenuatifolia *Hort.*
S. aurea *Hort.*
S. aurantiaca *Hort.*
S. australis *Hils. et Boj.*
S. candida *Flugge.*
S. carpinifolia *Forbes.*
S. coccinea *Hort.*
S. cœrulea *Sm.*
S. conformis *Forbes.*
S. cordata *Muhl.*

S. cotinifolia *Sm.*
S. crassifolia *Forbes.*
S. damascena *Forbes.*
S. Dicksoniana *Sm.*
S. fagifolia *Willd.*
S. finmarkica *Hartig.* vel *Wild.*
S. Forsteria *Sm.*
S. germanica nigra *Hort.*
S. grisoniensis *Forbes.*
S. hastata ovalifolia *Hort.*
S. helvetica *Vill.*
S. hippophæfolia *Auct. mult.*
S. huntingdonia? *Hort.*
S. lacustris *Forbes.*
S. latifolia *Forbes.*
S. malifolia *Sm.* vel *Bess.*
S. nitens *Anders.*
S. obtuserrata *Hort.*
S. oleifolia *Sm.*
S. petræa *Forbes.*
S. prunifolia *Host.* vel *Sm.*
S. pirifolia *Anders.*
S. regalis *Hort.*
S. recurvata *Pursh.*
S. rivularis *Forbes.*
S. rotundata *Hort.*
S. Russeliana *Forbes.*
S. sanguinea *Hort.*
S. Scleicheriana *Forbes.*
S. septentrionalis *Hort.*
S. Sieboldiana *Blume.* — *Anders.* Monogr. Salic., tab. 47.
S. sordida *Kern.*

S. spathulata. *Willd.*
S. tenuifolia *Sm.*
S. trepida *Forbes.*
S. triandra alba *Hort.*
S. — nigra *Hort.*
S. undulata *Ehr.* vel *Forbes.*
S. vallesia *Hort.*
S. varia. *Host.*
S. vaudensis *Forbes* vel *Kern.*
S. violacea *Host.* vel *Andrews.*

ULMACEÆ

ULMUS Tourn.

U. pedunculata *Foug.* Mém. Ac. sc. par. 1787, tab. 12.
— Europa orient.
U. effusa *Willd.* — *Hayne* Darstell. III, tab. 17.
U. major *Smith.* — Belg. hort. II, tab. 19.
U. ciliata *Ehrh.* — *Rechb.* Fl. germ. XII, tab. 666.
U. americana *Willd.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 4.
— America septentrionalis.
U. florida *Chapman.*
var. pendula.
U. alata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 5. — Carolina.
U. americana *var.* alata *Spach.*
U. campestris *L.* — *Smith.* Engl. bot., tab. 1886; Nouv Duham. II, tab. 12. — Europa.
var. angustifolia.
U. minor *Mill.* — *Rchb.* Fl. germ. XII, tab. 660.

U. campestris.

var. antarctica.

— aurea. — Belg. hort. 1866, tab. 19; Illustr. hort. XIV, tab. 513.

— belgica.

— Berardi.

— betulæfolia.

— carpinifolia.

U. carpinifolia *Lindl.*

— Clemmeri.

— concavæfolia.

— crispa (Webbiana).

— Dauvessi.

— Escaillardi.

— fastigiata.

U. suberosa fastigiata *Hort. Audib.* (non *Desf.*).

— foliis variegatis.

— — purpureis.

— lævis (glabra).

U. lævis *Pall.*

U. glabra *Mill.* Engl. bot., tab. 2248.

U. inæqualis *Bosc.*

— gracilis (virginalis).

— — monstrosa (microphylla pendula).

— horizontalis.

— incisa.

— microphylla.

U. pumila *Pall.* Fl. ross., tab. 48 (non *Lm.*)

— modiolana.

U. tortuosa *Hort.*

— monstrosa.

— monumentalis.

U. pyramidalis *Aliq. Hort.*

U. campestris.
var. pendula.
— pubescens.
— purpurascens (purpurea).
— pyramidalis Bertini.
— plumosa.
— rubra.
— sericea.
— stricta (cornubiensis) Vulg. *Orme d'Oxford.*
— virens.
— virgata.
U. virgata *Pépin.* (non *Wall.* nec *Roxb.*).
— Weathley.
— Werschaffelti.

U. suberosa *Ehrh.* Engl. bot. XXXI, tab. 2161.
var. betulæfolia.
— lanuginosa.
— pendula.
— pyramidalis.
U. pyramidalis *Desf.* (non *Hort.*).
— viscosa.

U. pumila *L.* — Sibiria
U. microphylla *Pers.*
U. parvifolia *Hort.* (non *Jacq.*).

U. montana *Witcher.* — *Smith* Engl. bot., tab. 1887. — Eur
U. nuda *Ehrh.*
U. cebennensis *Hort. Audib.*
U. major *Rechb.* Icon. Fl. germ., tab. 1565.
var. hollandica.
U. hollandica *Mill.*
U. campestris macrophylla *Spach.*
U. campestris latifolia *Desf.*
U. excelsa *Borkh* — *Rechb.* Fl. germ. XII, tab. 665.

U. montana.
var. gigantea.
— aureo-variegata.
U. latifolia aureo-variegata *Hort.*
— horizontalis (pendula).
U. latifolia pendula *Hort.*
— laciniata (Pitteursii).
— oxoniensis.
— pyramidalis (Dampieri).
— triserrata.
— tridens (superba).
— macrophylla (fastigiata).
— cinerea.
U. cinerea *Hort. Andr. Leroy.*
— crispa.
U. crispa *Willd.*
U. urticæfolia *Hort. Audib.*
U. campestris crispa *Desf.*
U. campestris urticæfolia *Hort.*
U. fulva *Michx.* — America septentrionalis.
U. rubra *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6.
U. parvifolia *Jacq.* (non *Hort.*). Hort. Schœnb. III, tab. 262.
— China.
U. chinensis *Desf.* Dict. sc. nat., tab. 282.
Planera parvifolia *Sweet.*
Microptelea parvifolia *Spach.*
var. decidua (an species propria?).
U. sibirica *Hort.*

PLANERA J. F. Gmel.

P. aquatica *J. F. Gmel.* — America septentrionalis.
P. ulmifolia *Michx.* Arb amer. III, tab. 7.
P. Gmelini *L. C. Rich.*

ZELKOWA Spach.

Z. crenata *Spach.* — Caucasus.

Planera crenata *Desf.* — *Michx*, Mém. Zelkow, (cum icon.).

Planera Richardii *Michx.* — *Dunal*, Descript. (cum Icon.).

Planera carpinifolia *Wats.* Dendr., brit. II, tab. 106.

Rhamnus carpinifolia *Pall.* Fl. ross. II, tab. 10.

var. repens.

Planera repens *Hort.*

Z. cretica *Spach.* — Créta.

Planera Abelicea *Rœm.* et *Schultz.*

Ulmus Abelicea *Sibth.* et *Smith.*

Z. acuminata *Planc.* in *DC.* Prodr. — Japonia.

Planera acuminata *L.*

P. japonica *Miq.*

P. dentata japonica *Hort.*

P. Kaki *Reg.*

P. Kiaki *Hort.*

Ulmus Keia-Ki *Sieb.*

CELTIDEÆ

CELTIS Tourn.

C. australis *L.* — Nouv. Duham, II, tab. 8. — Regio medit.

C. lutea *Hort.*

var. segreziensis.

C. occidentalis *Hort.* (non *Lin.*).

C. glabrata *Stev.* (non *Spreng.*). — Tauria merid.

C. Tournefortii *Lamk.* Encycl., tab. 844. — *Jaub.* et *Spach* Illustr., tab. 400. — Regio. mediterr.
C. orientalis *Mill.* (non *Lin.*).
var. arbuscula.
C. pumila *Hort.*
— aspera.
C. glabrata *Hort.* (non *Stev.*).
C. occidentalis *L.*—*Michx*, Arb. amer. III, tab. 8.—America borealis.
C. cordata *Hort.* (non *Desf.*).
C. Audibertiana *Hort.* (non *Spach*).
var. pumila.
C. pumila *Hort. Booth.*
C. Audibertiana *Spach.* (Ex horto *Fr. Audib.*).
C. occidentalis cordata *Hort. Audib.*
C. cordata *Hort.*
C. crassifolia *Lamk.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 9.— America borealis.
C. cordata *Desf.*
C. rugosa *Hort. Paris.*
C. mississipiensis *Bosc.* — America septentrionalis.
C. americana *Hort. Paris.*
C. lævigata *Willd.*
C. pumila *Aliq. Hort.* (non *Booth*).
C. Willdenowiana *Schult.* — China et Japonia.
C. sinensis *Willd.*

MOREÆ

MORUS Tourn.

M. nigra *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 22 ; Belg. hort. VI, cum icon. — Italia.
var. laciniata,

M. alba *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 762, fig. 2. — Asia.
var. romana *Lodd.* — Gallia meridionalis.
M. rosea italica *Hort.*
M. alba rosea *Ser.*
M. ovalifolia *Hort. Audib.*
— macrophylla *Lodd.* — Gallia meridionalis.
M. Moretti *Hort. Audib.*
M. alba Moretti *Ser.*
M. alba Morettiana *Lodd.*
M. Morettiana *Jacques.*
M. alba Lhou *Ser.*
M. patavina *Hort. Audib.*
M. alba latifolia *Hort.* (non *Poir.*).
M. hispanica *Hort.*
— Tókwa *Ed. Bureau* in *DC* Prodr. *XVII.* — *Lavall.* Arb. segrez, Icones tab. ined. — Japonia.
M. Tokwa *Sieb.*
M. japonica *Hort.*
— Kaki.
M. Kaki *Hort.*
— pyramidalis *Ser.*
— constantinopolitana latifolia.
M. constantinopolitana *var.* latifolia *Poir.*
M. pumila latifolia *Hort.*
— venosa *Delile.*
M. alba nervosa *Lodd.*
M. fibrosa *Ser.*
M. nervosa *Hort.*
— indica nova *Hort.*
— laciniata
M. urticæfolia *Hort.*
— Levasseurei.
M. Levasseurei *Hort.*

M. alba.

var. latifolia *Bureau* in *DC.* Prodr. XVII. — China.
M. multicaulis *Perrot.* — Ann. de From. 1829, tab. 3.
M. alba multicaulis *Loud.*
M. intermedia *Perrot.* — *Guilem.* Arch. de bot. I, tab. 7.
M. tatarica *Desf.* — *Pall.* Fl. ross. tab. 52.
M. cucullata *Bonaf.*
M. bullata *Balb.*
M. alba sinensis *Bosc.*
M. sinensis *Hort.*
M. chinensis *Lodd.*
Vulg. *Mûrier des Philippines; Mûrier Lou.*

M. rubra *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 10. — Amer. sept.
M. canadensis *Lamk.*
M. virginica *Pluck.*
M. pensylvanica *Noir.*
M. missouriensis *Hort. Audib.*
M. caroliniana *Hort.*
var. incisa.
M. scabra *Willd.*
M. rubra scabra *Loud.*
— macrophylla (an species propria?).
— membranacea.
M. membranacea *Hort.*
— cedrona.

BROUSSONETIA Vent.

B. papyrifera *Vent.* Ann. Mus. VIII, tab. 34. — Nouv. Duham. II, tab. 7. — China et Japonia.
Papyrius japonica *Poir.*
Morus papyrifera *L.* — *Kœmpf.* Amœnit. p. 472, cum Icon.
var. nana *Bureau* in *DC.* Prodr. XVII.
Broussonetia nana *Hort.*

B. papyrifera.
var. cucullata.
B. cucullata *Hort.*
B. spathulata *Hort.*
B. navicularis *Lodd.*
B. navifolia *Hort.* (sic !).
— ficifolia.
— laciniata.
B. dissecta *Hort.*
— macrophylla (integrifolia).
B. nova species *Hort.*
— variegata.
B. Kæmpferi *Sieb.* — Japonia.
Papyrus spuria *Kæmpf.* Amœn. p. 472, cum Icon.
B. Kasinoki *Sieb.* — Japonia.
B. papyrifera *var.* Kæmpferi *Aliq. Hort.*

MACLURA Nutt.

M. aurantiaca *Nutt.* North-Amer. sylv. I. tab. 37 et 38. — *Lamb.* Pinus, tab. 3. — Louisiana.
Vulg. *Bois d'Arc; Oranger des Osages.*
var. calcar-galli.
M. calcar-galli *Hort.*
— marmorata.
— variegata.

ARTOCARPEÆ

FICUS Tourn.

F. Carica *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 861 ; Nouv. Duham. IV, tab. 53-59. — Europa australis et Africa borealis.
Varietates hortenses diversæ.

F. hirta *Roxb.* — *Wight*, Icones pl. Ind. or. II, tab. 672. — China et Japonia.

F. stipulata *Thunb.* — *Wendl.* Coll., tab. 72. — China et Japonia.

var. minima.

F. minima *Hort.*

F. erecta *Thunb.* — *Kæmpf.* Icon. Plant. Jap. tab 4. — Japon.

F. japonica *Blum.*

var. foliis laciniatis.

— — lanceolatis.

— — ovatis.

CUDRANIA Trécul.

C. tricuspidata *Bureau*, Mss. in Herb. Paris. — China.

Maclura tricuspidata *Carr.* Rev. hort. 1864, fig. 37.

CASUARINEÆ

CASUARINA Rumph.

C. equisetifolia *Forst.* Gen. pl. austr., p. 103, fig. 52. — *Lamk.* Illustr., tab. 746. — Africa et Asia.

GNETACEÆ

EPHEDRA Tourn.

E. altissima *Desf.* Fl. atl. II, tab. 253. — Africa borealis.

E. vulgaris *Rich.* Conif., tab. 4. — Eur. austr. et orient.

E. distachya *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 830, fig. 2.

E. monostachya *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 830, fig. 1 ; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 142.

CONIFERÆ

ARAUCARIA Juss.

A. imbricata *Pav.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 45. — Chili.

Pinus Araucana *Molin.*
Dombeya chilensis *Lamk.*
Columbea quadrifaria *Salisb.*
Quadrifaria imbricata *Manett.*
Abies chilensis *Mirb.*
A. Dombeyi *Rich.*
A. araucana *Poir.*
Colymbea imbricata *Carr.*

var. columnaris.
— distans.
— dumosa.

DAMMARA Rumph.

D. australis *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 44. — *Ndn.* Fl. des serres XI, p. 75, cum Icon. — Nova Hollandia.

PINUS Lin.

Sect. Pinaster.

P. sylvestris *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 1; — *Rich.* Conif., tab. 11; Nouv. Duham. V, tab. 66. — Europa.

P vulgaris genevensis *Bauhin.*

P. sylvestris.

var. haguenensis (argentea). — Vulg. *Pin de Hagueneau.*

P. rubra *Mill.* — Nouv. Duham. V, tab. 67, fig. 1.

P. scotica *Willd.*

P. horizontalis *Hort.*

P. haguenensis *Hort.* — *Loud.* Encycl. of tr. fig. 953.

P. scariosa *Lodd.*

P. tortuosa *Hort.*

— rigensis.

P. sylvestris *Lois.* Nouv. Duham. V, tab. 66.

P. genevensis *Hort.*

P. rigensis *Hort.*

— fastigiata (pyramidalis).

— nana (pygmæa).

— pendula.

— tortuosa.

— spiralis.

— monophylla (non P. monophylla *Torr.*).

— conglomerata.

P. montana *Du Roy.* — Styria.

P. tatarica *Mill.*

P. sylvestris montana *Ait.*

P. sanguinea *La Peyr.*

P. humilis *Link.*

P. rotundata *Link.* — *Hoyne* XIV, tab. 10.

P. Fischeri *Hort. Booth.*

P. pumilio *Hænk.* — *Waldst.* et *Kit.* Plant. hung. II, tab. 149.

— Europa australis.

P. carpathica *Hort.*

P. Mughus *Scopol.* (non *Poir.*).

P. Mugho *Poir.* (non *Scopol.*). — Nouv. Duham. V, tab. 68.

— Europa australis.

P. sylvestris Mugho *Gord*

P. uncinata *Ram.* — *Ant.* Conif., tab. 3, fig. 3

P. Pinaster *Soland.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 9 et 10; *Ant.* Conif., tab. 6; *Lawson*, Pinet., brit., tab. 28 et 29. — Europa australis.

P. maritima *Poir.* (non *Lamb.*). — Nouv. Duham. V, tab. 72.

P. nepalensis *Royle* et *Hort.*

P. japonica *Hort.*

P. chinensis *Knight.* (non *Lamb.*).

var. contorta.

— Hamiltoni *Lindl.*

P. Hamiltoni *Ten.*

— Lemoniana *Endl.*

P. Lemoniana *Benth.*

— catenaria.

— longifolia.

— major. — Vulg. *Pin de Corte.*

— minor. — Vulg. *Pin à trochet.*

P. resinosa *Soland.* (non *Loisel.*). — *Lamb.* Pinus, ed. 1, tab. 14. — America borealis.

P. rubra *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 1.

P. Laricio *Poir.* — Nouv. Duham. V, tab. 67 et 71. — Europa australis.

P. Poiretiana *Hort.*

P. corsica *Hort.*

P. altissima *Hort.*

var. caramanica *Spach.* — Europa orientalis.

P. caramanica *Hort.*

P. taurica *Hort.*

P. romana *Hort.*

P. Pallasiana *Lamb.*

P. Laricio *var.* Pallasiana *Endl.*

— monspeliensis *Hort.*

P. monspeliensis *Saltzm.*

P. pyrenaica *Aliq. Hort.* (non *Lapeyr.*).

P. Saltzmani *Dunal.*

P. Laricio.

var. calabrica (stricta).

— pyramidata *Carr.*

— Bujoti *Carr.*

P. sylvestris *Hort.*

— pygmæa *Rauch.*

P. austriaca *Hoss.* — Europa.

P. Laricio *var.* austriaca *Endl.*

P. nigricans *Host.*

P. nigra *Link.*

P. dalmatica *Vis.*

P. magellensis *Guss.*

P. Fenzlii *Kotsch.* et *Ant.*

P. Heldreichii *Christ.*

P. pyrenaica *Lapeyr.* — Europa australis.

P. pseudo-halepensis *Dehenht.*

P. Paroliniana *Webb.*

P. halepensis *Ait.* — *Mill.* Icones, tab. 216; *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 7; Nouv. Duham. V, tab. 70. — Regio mediterr.

P. hierosolimitana *Duham.*

P. genuensis *Cook.*

var. abasica.

P. abchasica *Fisch.*

P. abasica *Carr.*

— Pithyusa.

P. Pithyusa *Strangw.*

P. maritima *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 6. (non *Poir.*).

P. Brutia *Ten.* Fl. napol. V, tab. 200.

— rotunda.

P. Loiseleuriana *Carr.* — Patria ignota.

P. resinosa *Loisel.* Nouv. Duham. V, tab. 77. (non *Soland.*).

P. resinosa d'Alfort *Hort.*

P. densiflora *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 112. — Japonia.
P. rubra *Sieb.* (non *Michx*).

P. Thunbergi *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI. — Japonia.
P. Massoniana *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 113 et 114. (non *Lamb.*).

P. Massoniana *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 8. (non *Sieb.* et *Zucc.*). — China.

P. persica *Strangw.* — Persia australis.

P. Pinea *L.* — Nouv. Duham. V, tab. 72 et 73; *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 6-8. — Regio mediterr.
P. maderensis *Ten.*
P. aracanensis *Hort. brit.*
P. Pinea chinensis *Hort.*
P. — americana *Hort.*
Vulg. *Pin à Parasol.*

P. contorta *Dougl.* — *Loud.* Encycl. of. trees, f. 1815-1816. — America occidentalis.
P. Boursieri *Carr.* Rev. hort. 1854, cum Icon.
P. Mac-Intoshiana *Laws.*

P. hudsonica *Poir.* — America borealis.
P. rupestris *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 2.
P. Banksiana *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 3. — Nouv. Duham. V, tab. 67.

P. inops *Soland.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 14; *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 4; Nouv. Duham. V, tab. 69, fig. 2. — America borealis.
P. virginiana *Mill.*
P. variabilis *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 16. (non *Pursh*).
P. ruthenica *Hort.*
Vulg. *Pin chétif*; *Pin pauvre.*

P. pungens *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 5. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 17; Nouv. Duham. V, tab. 67, fig. 4. — America borealis.

P. mitis *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 3. — *Ant.* Conif., tab. 5. — America septentrionalis.

P. variabilis *Pursh.* (non *Lamb.*). — Nouv. Duham. V, tab. 69, fig. 2.

P. echinata *Mill.*

P. monophylla *Torr.* et *Frem.* Rep. Exped. to Rocky Mount., tab. 4. — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 3, cum Icon. — California.

P. Fremontiana *Endl.* — Journ. hort. soc. IV, tab. 294.

P. Llaveana *Hartw.* (non *Schied*).

P. muricata *Don.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 84. — California.

P. Murrayana *Balf.*

P. Edgariana *Hartw.*

SECT. TÆDA.

P. Gerardiana *Wall.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 65; *Royle*, Illustr., tab. 85. — Himalaya.

P. Auclandii *Ludd.*

P. Sabiniana *Dougl.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 7; Fl. des serres IX, cum Icon.; *Nutt.* North-amer. sylv. II, tab. 113; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 2, cum Icon. — California.

var. reptans.

P. Coulteri *Don.* — *Lamb.* Pinus. ed. 2, tab. 8; *Ant.* Conif., tab. 12 et 13. — California.

P. macrocarpa *Lindl.*

P. Sabina Coulteri *Loud.* Encycl. fig. 1839-11.

P. australis *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 4. — Nouv. Duham. V, tab. 75, fig. 3. — Florida et Louisiana.

P. palustris *Mill.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 21; *var.* excelsa *Loud.*

P. lutea *Hort. Makoy.*

P. Jeffreyi *Murr.* Not. Califor. trees II, tab. 6 et 7. — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 5, cum Icon. — California.
P. Jeffreyana *Hort.*

P. Tæda *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 9; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 18. — Nouv. Duham. V, tab. 75, fig. 2. — Virginia.

P. serotina *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 7. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 18; Nouv. Duham. V, tab. 75, fig. 1. — Pensylviana.

P. rigida *Mill.* — *Michx fil.* Arb. Amer. I, tab. 8; *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 19 et 20; Nouv. Duham. V, tab. 74. — America borealis.
P. Fraseri *Lodd.* (non *Pursh*).
P. Loddigesii *Loud.*
P. Tæda rigida *Ait.*

P. tuberculata *Don.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 85; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 9, cum Icon. — California.
P. californica *Hartw.* (non *Lois.*).

P. insignis *Dougl.* — *Ant.* Conif., tab. 8, fig. 1. — *Laws.* Pinet. brit., fasc. 19, cum Icon. — California.
P. montereyensis *Rauch.*
P. californica *Hort.* (non *Hartw.*, nec *Loisel.*).
var. macrocarpa.
P. radiata *Don.* — Fl. des serres VI, p. 44, cum Icon.

P. ponderosa *Dougl.* in *Loud.* Arbor., fig. 2132-2137. — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 15. — America borealis.
P. Sinclairiana *Hook.* et *Arn.* in Beechey, tab. 93.
P. nootkænsis *Manetti.*
P. Craigiana *Hort.*
P. Beardsleyi *Murr.*
P. Parryana *Gord.*

P. Benthamiana *Hartw.* Journ. Hort. soc. I, tab. 236. — Fl. des serres VI, cum Icon. — America boreali-occidentalis.

P. Teocote *Cham.* et *Schecht.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab, 62. — Mexico.

P. Vilmoriniana *Rœzl.*

P. Besseriana *Rœzl.*

P. Mulleriana *Rœzl.*

P. microcarpa *Rœzl.* (non *Don.*).

P. Hugeli *Rœzl.*

P. Galocote *Rœzl.*

P. interposita *Rœzl.*

P. patula *Schied.* et *Depp.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 61. — Mexico.

P. subpatula *Rœzl.*

P. sinensis *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 53. (non *Knight.*). — *Ant.* Conif., tab. 1; *Forb.*, Pinet. Woburn., tab. 12. — China.

P. nepalensis *Forb.*

P. Cavendishiana *Hort.*

P. cembroides *Zucc.* — Journ. hort. soc. I. tab. 236; Fl. des serres IV, tab. 33. — Mexico.

P. edulis *Carr.* (non *Engelm.*).

P. Llaveana *Schiede* et *Depp.* (non *Torr.*). — *Forbes* Pinet. Woburn., tab. 17; *Loud.* Encycl., fig. 1858.

P. fertilis *Rœlz.*

P. osteosperma *Engelm.*

P. edulis *Engelm.* (non *Carr.*). — *Torr.* in *Sitgreaves.* Report, tab. 20. — Nov. Mexico.

P. Bungeana *Zucc.* in *Endl.* Conf. p. 166. — China borealis.

SECT. PSEUDO-STROBUS.

P. Montezumæ *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 22. — *Ant.* Conif., tab. 17. — Mexico.

P. Hartwegii *Lindl.* — Mexico.

P. amecaensis *Rœlz.*

P. atrovirens *Rœlz.*

P. corrugata *Rœlz.*

P. Ehrenbergii *Endl.*

P. Endlicheriana *Rœlz.*

P. frondosa *Rœlz.*

P. Geitheri *Rœlz.*

P. Iztachihuatti *Rœlz.*

P. Krelagi *Rœlz.*

P. Montezumæ *Gord.* (non *Lamb.*).

P. longifolia *Rœlz.* (non *Roxb.*).

P. Lowii *Rœlz.*

P. Papeleui *Rœlz.*

P. resinosa *Rœlz.* (non *Lois.*, nec *Soland.*).

P. robusta *Rœlz.*

P. scoparia *Rœlz.*

P. Standishii *Rœlz.*

P. suffruticosa *Rœlz.*

P. tlamacensis *Rœlz.*

P. aristata *Engelm.* Trans. Ac. Sc. Saint-Louis II, tab. 5-6. — America borealis.

P. rudis *Endl.* — Mexico.

P. Parryana *Engelm.* — California.

P. Llaveana *Torr.* Bot. Bound., tab. 53 (non *Schied.* et *Depp*).

P. quadrifolia *Parray.*

SECT. CEMBRA.

P. Cembra *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 23; Nouv. Duham. V, tab. 77, fig. 1; *Lawes.* Pinet. brit. fasc. 16, cum Icon. — Europa.

P. montana *Lamk.* (non *Duroi*, nec *Baum.*).

P. Cembra communis *Endl.*

Vulg. *Cembro*, *Alviez*.

P. Cembra.

var. pumila *Pall.* Fl. ross. I, tab. 2.

P. pygmæa *Fisch.*

P. Cembra nana *Hort.*

P. Cembra pygmæa *Hort.*

— mandshurica.

P. mandshurica *Reg.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 17, cum Icon.

P. flexilis *James.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 112. — Nov. Mexico.

P. Lambertiana *var.* β. *Hook.*

P. albicaulis *Engelm.*

P. Shasta *Carr.* Conif., ed. 2.

P. parviflora *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap, II, tab. 115. — Japonia.

P. Cembra *Thunb.* (non *Lin.*).

P. Koraiensis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 116. — Koraia et Kamtschatka.

P. Strobus *Thunb.* (non *Lin.*).

SECT. STROBUS.

P. excelsa *Wall* — *Lamb* Pinus, ed. 2, tab. 26; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 21, cum Icon. — Nepalia.

P. Strobus excelsa *Loud.* Encycl. of trees, f. 1915.

P. Strobus argentea *Hort.*

P. Strobus pendula *Hort.*

P. pendula *Griff.*

P. nepalensis *De Chambr.*

P. Chylla *Lodd.*

P. Dicksoni *Hort.*

Vulg. *Pin pleureur.*

var. Peuce.

P. Peucé *Griseb* — Grecia.

P. Cembra fruticosa *Griseb.*

P. monticola *Dougl.*— *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 67, cum Icon. — California.

P. Strobus *var.* monticola *Nutt.*

P. nivea *Hort.*

P. Strobus *L.* — *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 10; *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35; Nouv. Duham. V, tab. 76. — America septentrionalis.

Vulg. *Pin du Lord ; Pin du Lord Weymouth.*

var. nana (brevifolia).

P. Strobus compressa *Hort. Booth.*

— pyramidata.

— tabulæformis (umbraculifera).

— alba (nivea, argentea).

— variegata.

— viridis.

— Veitchei. *Hort.* (non *Rœlz*).

P. Ayacahuite *Ehrenb.*—*Loud.* Encycl. of trees, fig. 1919. — Mexico.

P. strobiformis *Engelm.*

P. Veitchei *Roelz.*

P. Loudoniana *Gord.*

P. Verschaffeltii *Roelz* — Mexico.

P. Lambertiana *Dougl.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 114; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 2, cum Icon. — America boreali-occidentalis.

ABIES Link.

A. bracteata *Hook* et *Arn.* — *Hook.* Icones, tab. 379 ; Bot. mag., tab. 4740 ; *Nutt.* North.-Amer. sylv. II, tab. 118; Fl. des serres IX, tab. 899. — California.

Picea bracteata *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2256.

Pinus bracteata *Don.* — *Laws.* Pinet. brit , tab. 13 et 17, cum Icon ; *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 9.

A. nobilis *Lindl.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 117. — California et Oregonia.

Picea nobilis *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2249-2250.

Pinus nobilis *Dougl.* — *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 74; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 1, cum Icon.

var. glauca.

— robusta.

A. amabilis *var. Nutt.*

A. amabilis *Hort. brit.* (non *Forbes*).

Picea magnifica *Hort. brit.* (non *Murray*).

A. Fraseri *Lindl.* — *Nutt.* North.-Amer. sylv. II, tab. 99.— America borealis.

Picea Fraseri *Loud.* Arbor. brit., fig. 2243-2244.

Pinus Fraseri *Pursh.* — *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 42.

var. glauca (cærulea).

A. balsamea *var.* nana *Hort.* (non (*Mill.*).

— hudsonica (prostrata).

A. hudsonia *Bosc.*

A. Hudsoni *Hort.*

Picea balsamea prostrata *Knight.*

A. religiosa *Schlecht.* — Mexico.

A. hirtella *Lindl.*

Picea religiosa *Loud.* Arbor. brit. IV. fig. 2257.

P. hirtella *Loud.*

Pinus religiosa *H. B. K.* — *Ant.* Conif., tab. 28, fig. 2.

P. hirtella *H. B. K.*

var. glaucescens.

A. glaucescens *Roelz.*

A. pectinata *DC.* — Nouv. Duham. V. tab. 81; *Rich.* Conif. tab, 16. — Europa media.

A. alba *Mill.*

A. taxifolia *Desf.*

A. vulgaris *Poir.*

A. candicans *Fisch.*

A. argentea *De Chambr.*

Picea pectinata *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2237-2239.

Pinus Picea *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 32.

P. pectinata *Lamk.*

P. Abies *Du Roi.*

Vulg. *Sapin de Normandie*, *Sapin argenté.*

var. columnaris *Carr.*

A. taxifolia pyramidalis *Hort.*

— brevifolia.

A. taxifolia brevifolia *Hort.*

— laxa.

— nana (prostrata).

— pendula.

— pyramidalis *Carr.*

— stricta.

A. metensis *Hort.*

A. Nordmanniana *Spach.* — Caucasus.

A. candicans *Fisch.*

A. pectinata leioclada *Link.*

A. Picea leptoclada *Lindl.*

Picea Nordmanniana *Loud.* Encycl. of trees, fig. 1950.

P. pectinata leioclada *Gord.*

Pinus Nordmanniana *Stev.* Bull. soc. nat. Mosc. 1838, tab. 2. — *Ant.* Conif., tab. 28, fig. 2.

P. leioclada *Stev.*

P. Abies *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 421.

var. compacta (nana).

A. cephalonica *Link.* — *Forbes* Pinet. Woburn., tab. 42. — Oriens.

A. Apollinis *Link.*

A. Reginæ Amaliæ *Heldr.* in *Regel*, Gartenfl.

A. Monte-Draco *Hort.*

A. Panachaica *Heldr.*

A. peloponesiaca *Haage.*

A. Luscombeana *Hort.* in *Loud.* Arbor. brit.

Picea cephalonica *Loud.* Encycl. of trees, fig. 1940-1946; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 3, cum Icon.

P. Apollinis *Ant.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 5, cum Icon.

Pinus cephalonica *Endl.* — *Ant.* Conif., tab. 27 fig , 1.

var. acicularis.

A. acicularis *Maxim.*

A. cilicica *Heuzé*, Rev. hort. 1856 p. 81. — Fl. des serres XI, p. 67, cum Icon. — Taurus.

A. Tchugatskoi *Laws.*

A. Rinzi *Hort.*

Picea cilicica *Rauch.*

Pinus cilicica *Ant.* et *Kotsch.*

P. Tchugatskoi *Fisch.*

A. firma *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 107. — Japonia.

A. bifida *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., II, tab. 109.

Picea firma *Gord.*

P. bifida *Hort. brit.*

Pinus firma *Ant.* Conif., tab. 27 *bis.*

P. bifida *Ant.* Conif., tab. 31, fig. 2.

A. brachyphylla *Maxim.* — Japonia.

Picea brachyphylla *Gord.*

Pinus brachyphylla *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 424.

A. balsamea *Mill.* — *Rich.* Conif., tab. 16; Nouv. Duham. V, tab. 83, fig. 2. — America boreali-orientalis.
A. balsamifera *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 14.
Pinus balsamea *Loud.* Arb. brit., fig. 2240-2241.
P. balsamea *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 33.
Vulg. *Sapin Baumier; Baumier de Gilead.*
var. nana (tenuifolia).
— longifolia.

A. Pinsapo *Boiss.* Voy. Esp., tab. 167-169. — Fl. des serres, XIV, tab. 1437-1438. — Hispania.
Picea Pinsapo *Loud.* Encycl. of trees, fig. 1947-1948. — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 3, cum Icon.
Pinus Pinsapo *Boiss.* — *Ant.* Conif., tab. 26.
var. fastigiata (pyramidata).
— concolor.
— glauca.
— aurea.

A. numidica *De Lannoy.* Rev. Hort. 1866, p. 106. — Mauritan.
A. baborensis *Coss.*
A. Pinsapo *var.* baborensis *Coss.* Bull. soc. bot. 1866, p. 607.
Picea numidica *R. Smith.*

A. Tschonoskiana *Reg.* Ind. sem. Hort. Petrop. 1865, p. 32.

A. amabilis *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 44 (non *Hort.*). — America boreali-occidentalis.
Picea amabilis *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2247-2248.
Pinus amabilis *Dougl.* — *Ant.* Conif., tab. 24, fig. 2.
var. magnifica.
A. magnifica *Murr.* (non *Hort.*).
Picea magnifica *Gord.*
— macrocarpa *Rœlz.*

A. bifolia *Murr.* — Colorado.
Pinus amabilis *Parlat.* (pro parte). in *DC*, Prodr. XVI, p. 426, (non *Dougl.*).

A. Gordoniana *Carr.* — California.

A. grandis *Hort.* (non *Lindl.*).

Picea grandis *Lobb.* (non *Loud.*).

P. Lowiana *Gord.*

P. Parsonsi *Hort.*

P. Lowi *Hort. brit.*

Pinus grandis *Parlat.* Prodr. XVI, p. 427 (non *Dougl.*).

Abies grandis de Vancouver *Hort.*

A. species de Vancouver *Hort.*

A. Veitchii *Henk.* et *Hochst.* — Japonia.

Picea Veitchii *Lindl.*

Pinus selenolepis *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 427.

A. Pindrow *Spach.* — Himalaya.

A. chiloensis *Hort.*

A. himalayensis *Hort.*

Picea Pindrow *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2214.

P. Naphta *Knight.*

Pinus Pindrow *Royle* Himalaya, tab. 36. — *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 92.

A. grandis *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 43. — California.

Picea grandis *Loud.* Arbor. brit., fig. 2245.

Pinus grandis *Dougl.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 77.

var. lasiocarpa.

A. lasiocarpa *Lindl.*

Picea lasiocarpa *Hort.*

Pinus lasiocarpa *Hook.*

P. amabilis *Parlat.* (pro parte). in *DC.* Prodr., p. 426 (non *Dougl.*).

A. concolor *Lindl.* — Novo Mexico.

Picea concolor *Gord.*

Pinus concolor *Engelm.*

var. violacea *Rœlz.*

A. Webbiana *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 41. — Himalaya.

A. densa *Griffith.*

A. spectabilis *Spach.*

A. chilrowensis *Hort.*

Picea Webbiana *Wall.* — *Loud.* Arb. brit. IV. fig. 2251-2253; *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 44.

P. striata *Hamilt.*

P. tinctoria *Webb.*

P. spectabilis *Hort.*

A. sibirica *Ledeb.* — Illustr. hort., tab. 500. — Rossia borealis et Sibiria.

A. Pichta *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 37.

Picea Pichta *Loud.*, Encycl. of trees, fig. 1951.

Pinus sibirica *Turcz.* — *Ant.* Conif., tab. 24, fig. 1.

P. Pichta *Fisch.*

§ PICEA.

P. alba *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 12. — Nouv. Duham. V, tab. 81, fig. 2; *Forbes*, Pinet. Woburn., tab. 33. — America borealis.

A. canadensis *Mill.* (non *Michx*).

A. Tschugatskoye *Hort.*

Picea alba *Link.*

Pinus alba *Ait.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 26.

P. laxa *Ehrh.*

P. glauca *Mœnch.*

Vulg. *Sapinette blanche.*

var. cærulea (glauca).

A. cærulea *Forbes.*

Picea cærulea *Link.*

Vulg. *Sapinette bleue.*

— echinoformis (minima).

A. alba.
var. fastigiata.
— nana (prostrata).

A. rubra *Poir.* — *Loud.* Arbor. brit., fig. 2218; *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 35. — America borealis.
A. nigra *var.* rubra *Michx fil.*
A. arctica *Cunningh.*
A. rubra californica *Hort.*
Picea rubra *Link.*
Pinus rubra *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 28.
Vulg. *Sapinette rouge.*

A. nigra *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 11. — Nouv. Duham. V. tab. 81, fig. 1. — America borealis.
A. mariana *Mill.*
A. denticulata *Poir.*
Picea nigra *Link.*
Pinus nigra *Ait.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 29.
P. marylandica *Hort.*
Vulg. *Sapinette noire.*
var. Doumeti *Carr.*
— pendula.
— pumila (fastigiata).
— pyramidata.

A. Menziezii *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2232. — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 32. — California septentrionalis et Japonia.
A. ajanensis *Lindl.* et *Gord.*
A. Merkiana *Fisch.*
A. jezoensis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 110., (non *Lindl.*).
Picea Menziezii *Nutt.* North-amer. sylv. II, tab 116.
P. ajanensis *Fisch.*
P. jezoensis *Carr.*
P. sitkensis *Carr.*
Pinus Menziezii *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 71.
P. jezoensis *Ant.* Conif., tab. 37.

A. microsperma *Lindl.* — *Murr. fil.* Pin. and Fires of Jap. fig. 129-136. — Japonia.

Picea microsperma *Carr.*

A. Morinda *Nelson.* — Himalaya.

A. Smithiana *Forbes.* Pinet. Wob., tab. 30.

A. Khutrow *Loud.* Encycl. of trees fig. 1731.

A. Thunbergii *Gord.*

A. spinulosa *Griffith.*

Picea Morinda *Link.*

P. Khutrow *Carr.*

Pinus Smithiana *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 70.

P. Khutrow *Royle*, Himal. tab. 84, fig. 1.

P. Morinda *Hort.*

A. polita *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 111. — Japonia.

A. Torano *Sieb.*

Picea polita *Carr.*

Pinus polita *Ant.* Conif. tab. 36, fig. 1.

A. Engelmanni *Parry.* — Nov. Mexico.

A. nigra *Engelm.*

Picea Engelmanni *Engelm.*

P. commutata *Rœzl.*

Pinus commutata *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 417.

A. Alcoquiana *Veitch.* — Journ. of hort. 1862, cum Icon. — Japonia.

A. Maximowiczii *Rob. Neum.*

A. bicolor *Hort.*

Picea Alcoquiana *Carr.*

Pinus Alcoquiana *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 417.

P. bicolor *Maxim.*

P. Maximowiczii *Reg.* Ind. sem. Hort. Petrop. 1865, p. 33.

A. calicularis *Hort. Sieb.* — Japonia.

Picea calicularis *Hort.*

Pinus calicularis *Maxim.*

A. excelsa *DC.* — Nouv. Duham. V, tab. 80 ; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 26, cum Icon. — Europa.

A. Picea *Mill.*

A. gigantea *Hort.*

A. carpathica *Hort.* — *Laws.* Pinet, brit. facs. 27, cum Icon.

A. rugosa *Hort.*

Picea excelsa *Link.*

P. vulgaris *Link.*— Nees Gen. IV, tab. 7.

Pinus Picea *Duroi.*

P. Abies *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 25 et 35.

P. excelsa *Lamk.*

Vulg. *Epicea.*

var. pyramidata (pyramidalis).

— columnaris.

A. columnaris *Jacques.*

— sibirica.

— candelabrum.

— inflexa.

— segrezensis.

— Lemoniana (nigra gigantea).

A. Lemoniana *Hort. Booth.*

— inverta.

A. inverta *Hort.*

— pendula.

A. communis *var.* pendula *Hort. Booth.*

— pendula major.

— Clambrasiliana.

A. Clambrasiliana *Hort.*

— conica (stricta).

A. conica *Hort. Thib.* et *Keteleer.*

— dumosa (elegans).

A. elegans *Hort.* (non *Smith*).

— expansa (procumbens).

— nana.

A. excelsa.

var. mucronata.

A. mucronata *Rauch.* (non *Raff.*).

— pumila (pygmea).

A. parvula *Knight.*

A. Clambrasiliana stricta *Loud.* et *Gord.*

A. elegans *Smith.*

A. minuta *Hort.*

A. minima *Hort.*

— densa.

— denudata (virgata).

A. Cranstonii *Hort.*

— intermedia.

— monstrosa.

— attenuata.

A. attenuata *Knight.*

— concinna.

— crassifolia (eremita).

— Finedœnensis.

A. Finedœnensis *Hort.*

— phylicoides.

— mutabilis.

— aurea (medio-aurea).

— tenuifolia *Loud.*

A. gracilis *Hort.*

A. graciliis microphylla *Hort.*

A. viminalis *Wahl.*

— variegata.

— rubellensis.

— violacea (fructu rubro).

A. obovata *Loud.* — Asia borealis.

A. ovata *Hort*

A. orientalis *Aliq. Hort.* (non *Poir.*).

Picea obovata *Ledeb.* Fl. alt. Ill., tab. 499.

Pinus obovata *Ant.* Conif., tab. 37, fig. 2.

P. Abies *Pall.* (non *Lin.*).

A. orientalis *Poir.* — *Jaub.* et *Spach.* Plant. orient. I, tab. 14; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 14, cum Icon. — Taurus et Caucasus.

A. Withmaniana *Hartwess.*

Picea orientalis *Carr.*

P. Withmaniana *Carr.*

Pinus orientalis *L.* — *Lamb.* Pinus, Ed. 2, tab. 291, fig. a.

§ TSUGA.

A. canadensis *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 13. — *Rich.* Conif., tab. 17, fig. 2; Nouv. Duham. V, tab. 83, fig. 1. — America borealis.

Picea canadensis *Link.*

Tsuga canadensis *Carr.*

Pinus canadensis *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35.

P. americana *Duroi.*

Vulg. *Hemlock-Spruce.*

var. nana (dumosa).

A. Mertensiana *Lindl.* et *Gord.* — California.

A. taxifolia *Jeffr.* ex *Murr.* (non *Desf.*).

A. Albertiana *A. Murr.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 12, cum Icon.

A. canadensis taxifolia *Gord.*

A. Bridgesii *Kellog.*

Tsuga Mertensiana *Carr.*

Pinus Mertensiana *Bongard.*

P. canadensis *Hook.* (non *Lin.*).

A. Hookeriana *Murr.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 4, cum Icon. — America boreali-occidentalis.

A. Pattoniana *Balf.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 4, cum Icon.

A. Pattoni *Jeffrey*.

A. Williamsoni *Newberry*, in Williams report VI, tab. 7.

A. Hookeri *Hort.*

Tsuga Hookeriana *Carr.*

Pinus Pattoniana *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 429.

A. Tsuga *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 106. — Japonia.

A. Araragi *Loud.*

Tsuga Sieboldi *Carr.*

T. Tsuga *A. Murr.*

Pinus Araragi *Sieb.*

P. Tsuga *Ant.* Conif., tab. 32, fig. 2.

var. nana *Sieb.* et *Zucc.*

A. Brunoniana *Lindl.* — Himalaya.

A. dumosa *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2233-2234.

A. cedroides *Griffith.*

Picea Brunnoniana *Wall.* Pl. asiat. rar., tab 247.

Tsuga Brunoniana *Carr.*

Pinus dumosa *Don*, — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35 *bis*.

P. decidua *Wall.*

P. Brunoniana *Wall.*

Micropeuce Brunoniana *Spach.*

§ PSEUDOTSUGA.

A. Douglasii *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 45; *Nutt.* North-amer. sylv. II, tab. 115; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 32, cum Icon. — California.

A. californica *Alig. Hort.* (non *Carr.*).

A. Douglasii.

Pseudotsuga Douglasii *Carr.*

Tsuga Douglasii *Carr.*

Pinus Douglasii *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 90.

P. taxifolia *Lamb.* Pinus, ed. 2. tab. 33.

Picea Douglasii *Link.*

var. fastigiata (Standishiana).

— stricta.

— taxifolia (pectinata).

A. taxifolia *Drum.* (non *Desf.*).

A. Drummondii *Hort.*

— pallida.

§ KETELEERIA.

A. Fortunei *Lindl.* — China.

A. jezoensis *Lindl.* — Fl. des serres VII, tab. 858. (non *Carr.*).

Picea Fortunei *Murr.*

Pinus Fortunei *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 430.

Keteleeria Fortunei *Carr.* Rev. hort. 1866, cum Icon.

ABIES INCERTÆ MONDUM RECOGNITÆ.

Abies Pichteana *Maxim.*

Abies magnifica affinis *Hort.*

A. (Picea) californica *Carr.*

CEDRUS Link.

C. Deodora *Loud.* Arbor. brit. IV, f. 2283 2283. — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 6, 7, 8 et 10, cum Icon. — Himalaya.

Abies Deodora *Lindl.*

Pinus Deodora *Roxb.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2. tab. 42.

C. indica *De Chambr.*

Vulg. *Cèdre pleureur.*

C. Deodora.

var. erecta (fastigiata).
— robusta.
C. Deodora gigantea *Hort.*
— glauca.
— viridis.
— variegata.

C. Libani *Barrelier*, Plant. Icon. 499. — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 10, cum Icon. — Asia minor et Africa boreal.
Larix cedrus *Mill.*
L. patula *Salisb.*
Abies Cedrus *Poir.* — *Rich.* Conif., tab. 14 et 17.
Pinus Cedrus *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 37.
Vulg. *Cèdre du Liban.*

var. fastigiata (viridis).
— nana (Vulg. *Cèdre du comte de Dijon*).
— pendula.
— atlantica.
C. atlantica *Manetti.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 20, cum Icon.
C. argentea *Loud.*
C. elegans *Knight.*
C. libani africana *Hort.*
Abies atlantica *Lindl.*
— glauca (argentea).

LARIX Link.

L. Griffithii *Hook.* in *Cathcart*, Illustr. of himal. plants, tab. 31. — Fl. des serres XII, tab. 1267-68. — Himalaya.
L. Griffithiana *Gord.*
D. sikkimensis *Hort.*
Abies Griffithiana *Lindl.* et *Gord.*
Pinus Griffithiana *Parlat.* in *DC.* Prodr XVI, p. 414.

L. europæa *DC.* — *Loud.* Arbor. brit., fig. 2258-2262.

L. pyramidalis *Salisb.*

L. decidua *Mill.*

Abies Larix *Lamk.* III, tab. 785. — *Rich.* Conif., tab. 13; Nouv. Duham. V, tab. 79.

Pinus Larix *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 38.

var. compacta (pyramidata).

— pendula.

— glauca.

— prolifera.

— rubra.

L. occidentalis *Nutt.* North-amer. sylv. II, tab. 120. — — America boreali-occidentalis.

L. americana *var.* brevifolia *Carr.* (non *Michx*).

Pinus Nuttalii *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 412.

L. microcarpa *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 47. — America borealis.

L. americana *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 4.

L. tenuifolia *Salisb.*

Abies microcarpa *Lindl.* et *Gord.*

Pinus pendula *Soland.*

P. Larix rubra *Marsh.*

P. intermedia *Du Roi.*

P. microcarpa *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 40.

var. pendula.

L. pendula *Salisb.* — *Forbes.* Pinet. Wob., tab. 46.

Pinus pendula *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 39.

— prolifera.

L. leptolepis *Gord.* — Japonia septentrionalis.

L. japonica *Carr.*

Abies leptolepis *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 103.

Pinus japonica *Thunb.*

L. dahurica *Turcz.* — *Trautv.* Imag. plant., tab. 32. — Sibiria arctica.
L. Gmelini *Ledeb.*
L. sibirica *Ledeb.*
L. kamtschatica *Hort.*
Abies Gmelini *Rupr.*
Pinus dahurica *Fisch.*

PSEUDOLARIX Gord.

P. Kæmpferi *Gord.* — China et Japonia sept.
Larix Kæmpferi *Fortune.*
Abies Kæmpferi *Lindl.* Gard. chronicl. 1854, p. 255, cum Icon.

CUNNINGHAMIA R. Br.

C. sinensis *R. Br.* in *Rich.* Conif., tab. 18, fig. 3. — Bot. mag., tab. 2743; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 103 et 104. — China.
C. lanceolata *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 37.
Abies lanceolata *Desf.*
Belis lanceolata *Sweet.*
Araucaria sinensis *Hort.*
var. glauca.

ARTHROTAXIS Don.

A. taxifolia *Hook.* Icon., tab. 573. — Tasmania.
A. Doniana *Park.*
A. selaginoides *Don.* in Linn. Trans., tab. 14. — *Hook.* Icon., tab. 574. — Tasmania.
A. alpina *Van-Houtte.*
A. imbricata *Hort.*
Cunninghamia selaginoides *Zucc.*

SCIADOPITYS Sieb. et Zucc.

S. verticillata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 1 et 2. — Fl. des serres XIV, tab. 1483-86. — Japonia.
Taxus verticillata *Thunb.*
Pinus verticillata *Sieb.*
var. variegata.

SEQUOIA Endl.

S. sempervirens *Endl.* — *Dcne*, Rev. hort. 1855, p. 11, cum Icon. — America boreali-occidentalis.
Taxodium sempervirens *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 48.
var. pyramidata (adpressa).
— taxifolia.
— glauca.
— variegata.

S. gigantea *Torrey.* — *Dcne*, Rev. hort. 1855, p. 10, cum Icon. — California.
S. Wellingtonia *Laws.* Pinet. brit. fasc. 21, 22 et 23, cum Icon.
Wellingtonia gigantea *Lindl.* — Bot. mag., tab. 4777-4778; Fl. des serres IX, tab. 892-93.
Washingtonia californica *Winslow.*
Taxodium Washingtonianum *Hort. amer.*
var. pendula.
— pyramidalis.
— crassifolia.
— glauca.
— variegata.

CRYPTOMERIA Don.

C. japonica *Don.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 124; *Hook.* Icon., tab. 668. — Japonia.
Cupressus japonica *L. fil.*
Taxodium japonicum *Brong.*
var. Lobbii (viridis).
C. Lobbii *Hort.*
C. viridis *Hort.*
— monstrosa.
— — nana (compacta).
— nana.
C. pygmæa *Knight.*
— araucarioides.
— pungens.
C. japonica vera *Hort.*
— spiralis (falcata).
— glabra.
— variegata.
C. elegans *J. G. Veitch.* — Japonia.
C. gracilis *Hort.*
C. japonica elegans *Nelson.*
C. japonica vera *Aliq. Hort.*

TAXODIUM Rich.

T. distichum *Rich.* Conif., tab. 10. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 63. — America septentrionalis.
Shubertia disticha *Mirb.*
Cupressus virginiana *Tradescant.*
C. americana *Catesby,* Carol. I, tab. 11.
C. disticha *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 1.
Vulg. *Cyprès Chauve*; *Cyprès de la Louisiane.*
var. nana.
nigra (tristis).

T. adscendens *Brongt.* Ann. sc. nat, sér. 1re, XXX, p. 182.— Carolina.
T. distichum fastigiatum *Knight.*
T. — *var.* microphylla *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 441, (pro parte).
T. imbricatum *Hort.*
Schubertia disticha *var.* β *Spach.*
Cupressus disticha *var.* imbricaria *Nutt.*

T. microphyllum *Brongt.* Ann. sc. nat., sér. 1re, XXX, p. 182. — America borealis.
T. distichum *var.* microphylla *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 441, (pro parte).
Schubertia disticha *var.* microphylla *Nutt.*

T. pendulum *Noisette.* — China?
T. distichum *var.* microphylla *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 441, (pro parte).
T. sinense *Gord.*
T. — pendulum *Hort.*
Glyptostrobus pendulus *Endl.* Conif., p. 71.
Cupressus sinensis *Aliq. Hort.*
var. intermedia.
T. distichum *var.* intermedia *Carr.* Conif., ed. 2, p. 184.

T. mucronatum *Ten.* Osserv. sudi pianta Conif. del gen. Taxod. 1853, cum Icon. — Mexico.
T. Montezumæ *Dcne.*
T. mexicanum *Carr.*
T. distichum mexicanum *Gord.*
T. — excelsum *Hort. Booth.*
T. — pinnatum *Hort.*
T. pinnatum *Hort.*
T. virens *Hort.*

GLYPTOSTROBUS Endl.

G. heterophyllus *Endl.* — China.
Thuya lineata *Poir.*
T. pensilis *Staunton.*

G. heterophyllus.

Taxodium japonicum *var.* heterophylla *Brong.*
T. Horsfieldii *Hort.*
Schubertia japonica *Spach.*
Cupressus nucifera *Hort.* (non *Torreya nucifera*).

FRENELA Mirb.

F. Gunnii *Endl.* — Tasmania.

F. australis *Mirb.*
F. variabilis *Carr.*
Callitris oblonga *Rich.* Conif., tab. 18, fig. 2.
C. australis *R. Br.*
C. macrostachya *Hort.*

F. Hugelii *Hort.* — Nova Hollandia.

CALLITRIS Vent.

C. quadrivalvis *Vent.* — *Rich.* Conif., t. 8, fig. 1. — Algeria.

Thuya articulata *Vahl*, Symb. bot. II, tab. 48. — *Desf.* Fl. atlant., tab. 252; Nouv. Duham III, tab. 5.
Frenela Fontanesii *Mirb.*
Vulg. *Thuya d'Algérie.*

LIBOCEDRUS Endl.

L. Doniana *Endl.*—Rev. hort. 1866, cum Ic —Nova Zelandia.

Dacrydium plumosum *Don.*
Thuya Doniana *Hook.* Lond. Journ. bot., tab. 18.

L. tetragona *Endl.* — *Paxt.* Flow. Gard. I, fig. 32. — Fretum Magell.

L. chilensis *Endl.* — Chili australis.

Cupressus thuyoides *Pav.* (non *Lin.*).
Thuya chilensis *Don*, in *Lamb.* Pinus.
T. andina *Pöppig*, Nov. Gen. et spec. III, tab. 220.

var. argentea.

L. argentea *Hort.*

— viridis.

L. excelsa *Gord.*

L. decurrens *Torr.* Pl. Frémont, tab. 3, — Orégon.
Thuya Craigana *Murr.* Bot. exped. Orégon, cum Icon.
T. gigantea *Carr.* in Fl. des serres IX, cum Icon. (non *Nutt.*).
var. laxa.
Thuya magnifica *Hort. Booth.*

FITZ-ROYA Hook. fil.

F. patagonica *Hook. fil.* — Fl. des serres VII, cum Icon. — America austro-occidentalis.

THUYA Tourn.

T. gigantea *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 111. (non *Carr.*). — America boreali-occidentalis.
T. plicata *Lamb.* (ex parte).
T. Douglasii *Nutt.*
T. Menziesii *Dougl.*
T. Lobbii *Hort.*
T. japonica *Maxim.*
T. Standishii *Carr.*
Thuyopsis Standishii *Gord.*
var. erecta (fastigiata).
— variegata.
T. plicata *Don.* — America septentrionalis.
T. Warreana *Hort. Booth.*
T. odorata *Marsch.*
T. aspleniifolia *Hort.*
T. occidentalis *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 3; *Rich.* Conif., tab. 7, fig. 1; Nouv. Duham. III, tab. 4. — America septentrionalis.
T. tatarica *Gord.*

T. occidentalis.

var. cristata. (non Biota orientalis *var.*).

T. cristata *Hort.*

— fastigiata.

— Hoveyi.

T. Hoveyi *Hort.*

— nana (compacta). (non Biota orientalis *var.*).

— pendula. (non Biota orientalis *var.*).

— recurva nana.

T. incurva *Hort.*

— Vervæneana.

T. Vervæneana *Hort.*

— variegata. (non Biota orientalis *var.*).

BIOTA Endl.

B. orientalis *Endl.* — China et Japonia borealis.

Thuya orientalis *L.* — *Rich.* Conif., tab. 7, fig. 2; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 118.

Platycladus stricta *Spach.*

var. aurea.

B. Zuccarinii *Sieb.*

Thuya aurea *Hort.*

— comata.

— cristata (aristata).

Thuya cristata *Hort.*

— cupressoides.

Thuya cupressoides *Hort.*

— dumosa (pygmæa).

Thuya antarctica *Hort.*

— elegantissima *Hort.*

T. elegantissima *Hort.*

— falcata *Hort.*

Thuya falcata *Hort.*

B. orientalis.

var. Fernandiana.

B. Fernandiana *Hort. Booth.*

B. falcata *Hort.*

Thuya falcata *Hort.*

— glauca.

— globosa.

— gracilis (freneloides).

Thuya japonica *Hort.* (non *Sieb.*).

T. nepalensis *Hort.*

— monstrosa (Defresneana).

Thuya sibirica monstrosa *Hort.*

Thuyopsis dolabrata *Aliq. Hort.* (non *Sieb.*).

— pendula.

B. pendula *Endl.*

Thuya filiformis *Hort.*

T. pendula *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 50 *bis*; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 117.

T. flagelliformis *Hort.*

Cupressus pendula *Thunb.* (non l'*Hérit.*, nec *Griff.*, nec *Staunt.*).

C. filiformis *Hort.*

— Sieboldi (nana).

B. japonica *Sieb.*

B. coreana *Sieb.*

B. Fortunei *Hort.*

Thuya nana *Hort.*

T. orientalis nana *Hort.*

— tatarica (cupressoides).

B. tatarica *L.*

B. pyramidalis *Carr.*

Thuya tatarica *Hort.* (non *Gord.*).

T. nepalensis *Hort.*

T. pyramidalis *Tenor.* Mem. acad. neap. III, tab. 2.

T. orientalis stricta *Hort.*

B. orientalis.

var. triangularis.

— argenteo-variegata.

T. argentea *Hort.*

— aureo-variegata.

T. variegata *Hort.*

— semper aurea.

THUYOPSIS Sieb. et Zucc.

T. dolabrata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 119 et 120. — Japonia.

Thuya dolabrata *L.* — *Lamb.* Pinus II, tab. 1.

Platycladus dolabrata *Spach.*

Libocedrus dolabrata *Nelson.*

var. latifolia.

T. latifolia *Hort.*

— nana.

T. lætevirens *Lindl.*

— variegata.

CUPRESSUS Tourn.

§. CHAMÆCYPARIS Spach.

C. thuyoides *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 2; Nouv. Duham. III, tab. 2; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 156. — America borealis.

Chamæcyparis sphæroidea *Spach.*

Thuya sphæroidalis *Rich.*

Vulg. *Faux-Thuya.*

var. andelyensis.

Retinospora squarrosa leptoclada *Gord.* (non *Zucc.*).

C. thuyoides.

var. pumila (pygmæa).

Thuya pygmæa *Hort.*

— atrovirens.

Thuyopsis atrovirens *Hort.*

— glauca (pendula).

C. Kewensis *Hort.*

C. thuyoides Kewensis *Hort.*

Thuyopsis borealis glauca *Hort.*

Thuya glauca *Hort.*

C. Lawsoniana *Murr.* Descr. new conif. Calif., tab. 9. — Bot. mag., tab. 5581; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 15, cum Icon. — California.

Chamæcyparis Boursieri *Dcne.*

C. Lawsoniana *Parlat.* Stud. conif., tab. 3

var. compacta (pygmæa, minima).

— erecta (stricta, pyramidalis).

Chamæcyparis Lawsoniana stricta *Hort.*

C. Lawsoniana erecta viridis *Hort. brit.*

— nana (pumila, glauca).

— variegata.

— pendula albo-variegata.

— flavescens (lutescens).

— elegans.

— gracilis.

Chamæcyparis Lawsoniana gracilis *Hort.*

— albo-spica.

— argenteo-variegata (argentea).

— aureo-variegata (aurea). — Illustr. Hort. X, tab. 367.

— luteo-variegata (lutea).

C. Nutkænsis *Hook.* — America boreali-occidentalis.

C. Nootkatensis *Lamb.*

C. americana *Trautv.* Imag. Plant. Fl. ross., tab. 7.

C. Nutkænsis.

Thuya excelsa *Bongard.*

Thuyopsis borealis *Fisch.*

T. Tchugatskoy *Hort.*

T. cupressoides *Carr.*

Chamæcyparis nutkænsis *Spach.*

var. compacta.

— glauca.

— variegata.

§. RETINOSPORA, Sieb. et Zucc.

C. pisifera *Hort. segrez.* — Japonia.

Retinospora pisifera *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. III, tab. 122. — Gard. chron. 1876, p. 237, cum Icon.

Chamæcyparis pisifera *Sieb.* et *Zucc.* in *Endl.* Conif.

var. filifera.

Retinospora filifera *Hort. Standish.* — Gard. chron. 1876, p. 237, cum Icon.

— stricta.

— aurea (nana aurea).

— flavescens.

— variegata.

C. obtusa *Hort. segrez.* — Japonia.

Retinospora obtusa *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 121. — Gard. chron. 1876, p. 236, cum Icon.

Chamæcyparis obtusa *Sieb.* et *Zucc.* in *Endl.* Conif.

C. Keteleeri *Standish.*

var. compacta.

Thuyopsis borealis compacta *Hort.*

— nana.

— argentea.

— aurea.

— plumosa. (non Dacrydium plumosum *Don*).

Retinospora plumosa *Hort.* — Gard. chron. 1876, p. 236, cum Icon.

C. obtusa.

var. plumosa aurea.

— — argentea.

— pygmæa.

Thuya pygmæa *Hort.*

— robusta.

— filicoides.

R. filicoides *Hort. Weicth.* — Gard. chron. 1876, p. 235, cum Icon.

— gracilis.

— lycopodioides (monstrosa).

Retinospora lycopodioides *Gord.*

— albo-spica.

— argenteo-variegata.

— aureo-variegata (Keteleeri variegata).

C. squarrosa *Hort. segrez.* — Japonia.

Retinospora squarrosa *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 123.

R. ericoides *Gord.* Pinet. ed. 1, p. 294.

Chamæcyparis squarrosa *Sieb.* et *Zucc.* in *Endl.* Conif.

C. ericoides *Carr.* Conif., ed. 1, p. 140.

Biota meldensis *Carr.*, Conif., ed. 2, p. 141.

Thuya meldensis *Hort. Quétier.*

T. hybrida *Aliq. Hort.*

var. dubia (compacta).

Retinospora dubia *Carr.*

Thuya ericoides *Hort.*

T. japonica *Aliq. Hort.*

T. Devriesiana *Hort.*

Biota ericoides *Hort.*

— glauca.

Retinospora glauca *Hort.*

C. squarrosa.

var. juniperoides.

C. ericoides *Aliq. Hort.*

Retinospora juniperoides. *Carr.* Rev. hort. 1869, fig. 69.

R. decussata *Hort.*

R. recurvata *Hort.*

Chamæcyparis decussata *Hort.*

— Elwangeriana.

Retinospora Elwangeriana *Barry.* Rev. hort. 1869, fig. 74.

Thuya occidentalis ericoides *Hort.*

T. Elwangeriana *Hort.*

— variegata.

SPECIES VEL VARIETATES NON SATIS NOTÆ.

C. leptoclada *Hort. segrez.* — Japonia.

Retinospora squarrosa leptoclada *Sieb.* ex *Gord.*

R. leptoclada *Zucc.* ex *Gord.* Rev. hort. 1869, fig. 24.

Chamæcyparis squarrosa *var.* leptoclada *Endl.* Conif., p. 65.

C. andelyensis *Aliq. Hort.*

C. pseudo-squarrosa *Hort. segrez.*

Retinospora pseudo-squarrosa *Carr.* Conif., ed. 2, p. 140.

Chamæcyparis pseudo-squarrosa *Parlat.* in *DC.* Prod. XVI, p. 467.

C. acuta *Hort. segrez.*

Retinospora acuta *Hort. Sieb.*

C. Nobleana *Hort. segrez.*

Retinospora Nobleana *Hort. brit.*

§. CUPRESSUS.

C. sempervirens *L.* — Nouv. Duh. III, tab. 1; *Rich.* Conif., tab. 9; *Wats.* Dendr. brit., tab. 155. — Asia occident.

C. fastigiata *DC.*

C. refracta *Hort.*

var. Bregeoni.

C. sempervirens.

var. cereiformis (pyramidata).

C. Fernandini *Hort.*

— contorta.

C. Bregeoni *Aliq. Hort.*

— horizontalis.

C. horizontalis *Mill.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 61.

C. patula *Hort.*

C. Tournefortii *Hort.* (non *Ten.*).

— indica *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 469. (Whitleyana).

C. Roylei *Carr.*

C. Whitleyana *Hort.*

C. Doniana *Hort.*

C. torulosa *Don.* — *Loud.* Arb. IV, fig. 2329-2336. — Himalaya.

C. pendula *Griff.* (non l'*Hérit.*, nec *Thunb.*, nec *Staunt.*).

C. himalayensis *Hort.*

C. nepalensis *Loud.*

C. Smithiana *Hort.*

Juniperus nepalensis *Loud.*

var. majestica.

C. majestica *Knight.*

C. flagelliformis *Knight.*

C. Corneyana *Knight.* — China.

C. gracilis *Gord.*

C. torulosa *var.* Corneyana *Carr.*

C. chinensis Corneyana *Hort.*

C. torulosa chinensis *Hort.*

Juniperus gracilis *Hort.*

J. pendula *Hort.*

C. glauca *Lamk.* — Peninsula Indica circa Goam.

C. lusitanica *Mill.*

C. pendula *L'Hérit.* Stirp., tab. 18 (non *Thunb.*, nec *Staunt.*, nec *Griff.*). — Nouv. Duham. III, tab. 3.

C. Udheana *Gord.*

C. glauca *Lamk.*

C. sinensis *Hort.*
Juniperus glauca *Hort.*
var. pendula (tristis).
C. religiosa *Hort.* (non *Knight*).

C. Lindleyi *Klotsh.* in *Endl.* Conif. (non *Parlat.*).— Mexico.
C. thurifera *Lindl.* (non *Schlecht.*).
C. Karwinskyana *Reg.*
C. flagelliformis *Hort.*
C. lusitanica *var.* Lindleyi *Carr.*

C. Benthami *Endl.* — Mexico.
C. thurifera *Schlecht.* (non *Lindl.*).
C. glauca *Forbes.*(non *Brotero*).
C. aromatica *Gord.*
C. lusitanica *var.* Benthami *Carr.*
C. — *var.* Udheana *Carr.*
C. Skinneri *Hort.*
C. elegans *Aliq. Hort.*
C. kewensis *Hort.*
C. Ugelii *Hort.*
C. Udheana *Aliq. Hort.* (non *Gord.*).
C. Cunninghamii *Aliq. Hort.*

C. Knightiana *Carr.* — Mexico.
C. Lindleyi *Parlat.* (non *Klotsch.*).
C. elegans *Hort.*
C. thurifera elegans *Hort.*
C. — *var.* Knightiana *Gord.*

C. funebris *Endl.* — Fl. des serres VI, p. 89, cum. Icon ; *Belg. Hort.* III, tab. 20. — China.
C. pendula *Staunt.* (non l'*Hérit.*, nec *Thunb.*, nec *Griff.*). — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 50.

C. Goveniana *Gord.* Journ. Hort. soc. IV, p. 295, cum Icon. — California.
C. glandulosa *Hort.* (non *Hook.*).
var. attenuata (Kæmpferi).
C. attenuata *Gord.*
C. nivea *Hort.*
— glauca.
C. californica *Carr.* — California.
C. aromatica *Hort.* (non *Gord.*).
C. kewensis *Aliq. Hort.*
C. cornuta *Hort.* (non *Carr.*).
C. macrocarpa *Hartw.* — *Gord.* Journ. Hort. soc. IV, p. 296, cum Icon. — California.
C. Hartwegii *Carr.* (pro parte).
C. Lambertiana *Gord.*
C. Reinwardtii *Hort. brit.*
var. fastigiata *Knight.*
— Lambertiana.
C. Lambertiana *Carr.*
C. Mac-Nabiana *Murr.* Descript. conif. Calif., tab. 10. — Rev. hort. 1870, p. 185, fig. 26. — California.
C. glandulosa *Hook.* (non *Hort.*).

JUNIPERUS Lin.

§. OXYCEDRUS.

J. drupacea *Labill.* Pl. syr. dec. II, tab. 8. — Syria, Asia min.
J. Sabina baccifera *Clus.* Hist., p. 37, cum Icon.
J. macrocarpa *Sibth.* — *Reichb.* Ic. Fl. germ. XI, tab. 1146; *Ten.* Fl. neap., tab. 247. — Europa meridionalis.
J. Oxycedrus *Rich.* Conif., tab. 6, fig. 1. (non *Lin.*).
J. umbilicata *Gren.* et *Godr.*
J. sphærocarpa *Ant.* Conif., tab. 10.
J. elliptica *Hort. Van-Htte.*
J. Fortunei *Aliq. Hort.*

J. Oxycedrus *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 15, fig. 2; *Rich.* Conif., tab. 6, fig. 1. — Europa meridionalis.
J. Marschalliana *Stev.*
Vulg. *Genévrier Cade.*
var. reflexa (pendula).
— Withmaniana (rufescens).
J. Withmaniana *Fisch.* (non *Stev.*).
J. rufescens *Link.*
J. Oxycedrus taurica *Aliq. Hort.*
Oxycedrus Withmaniana *Hort.*

J. communis *L.* — Fl. danica VII, tab. 1119; *Lamk.* Encycl. tab. 829; Nouv. Duham. VI, tab. 15, fig. 1; *Rich.* Conif., tab. 5. — Europa.
Vulg. *Genévrier.*
var. compressa (hispanica).
J. compressa *Rinz.*
J. hispanica *Presl.*
— fastigiata *Loud.* (suecica).
J. hispanica *Hort. Booth* (non *Presl.*).
J. cracovia *Hort.*
J. Withmaniana *Aliq. Hort.* (non *Fisch.* nec *Stev.*).
— oblonga *Loud.* Arb. IV, fig. 2315 et 2316.
J. oblonga *Bieb.* (non *Gord.*).
— reflexa.
J. oblonga *Gord.* (non *Bieb.*).
J. Withmaniana *Stev.* (non *Fisch.*).
— hybernica (stricta).
J. hybernica *Lodd.*
J. pyramidalis *Hort.*
J. stricta *Hort.*
— variegata.

J. nana *Willd.* — *Smith,* Engl. bot., tab. 2743. — Europa borealis; America et Asia septentrionalis.
J. communis *var. L.*

J. nana.

J. communis *var.* alpina *Gaud.*— *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 480.

J. communis *var.* nana *Hook.*

J. alpina *Gaud.*

J. sibirica *Burgsd.*

J. davurica *Hort.* (non *Pall.*).

J. saxatilis *Hort.*

var. canadensis (montana).

J. canadensis *Lodd.*

J. alpina minor *Hort.*

J. rigida *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 125. (non *Desf.*). — Japonia.

J. communis *Thunb.* (non *Lin.*).

§. Sabina.

J. recurva *Don.* Prodr. fl. nepal. — Nepalia.

J. repanda *Hort.*

var. squamata *Hook.* (densa).

J. squamata *Don.* — *Loud.* Encycl. fig. 2107.

J. dumosa *Wall.*

J. Lambertiana *Wall.*

J. rigida *Wall.*

J. procumbens *Hort.* (non *Sieb.*).

J. davurica *Pall.* Fl. ross. II, tab. 55. — *Andrews*, Bot. repos., tab. 534. — Sibiria altaica.

J. Sabina *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 62; *Pall.* Fl. ross., tab. 56, fig. 2. — Europa centralis et australis; America septentrionalis.

J. excelsa *Willd.*

J. repens *Nutt.*

J. fœtida *var.* Sabina *Spach.*

J. prostrata *Pers.* (non *Torrey.*).

J. Hudsonica *Lodd.*

J. Sabina.

J. Sabina *var.* prostrata *Loud.*

var. nana (prostrata).

J. prostrata *Torrey* (non *Pers.*).

J. Sabina *var.* humilis *Hook.*

J. cupressifolia *Hort.*

J. cupressoides *Hort.*

— tamariscifolia (sabinoides). — *Loud.* Encycl. of trees, fig. 2022.

J. sabinoides *Griseb.* (non *Endl.*).

J. turbinata *Guss.*

J. Sabina *var.* mascula *Hort.*

J. alpina *Hort.* (non *Gaud.*).

— variegata.

J. excelsa *Bieb.* — *Forbes*, Pinet. Woburn., tab. 64. — Asia minor.

J. Sabina *var.* taurica *Pall.*

J. fœtida *var.* excelsa *Spach.*

J. Olivieri *Carr.*

J. isophyllos *C. Koch.*

J. polycarpos *C. Koch.*

J. himalayensis *Hort.*

J. procera *Hort.* (non *Hochst.*).

var. stricta.

J. fœtidissima *Willd.* — Græcia et Asia minor.

J. Sabina *Sibth.* (non *Lin.*).

J. fœtida *var.* squarrosa *Spach.*

J. excelsa *Carr.* (pro parte).

Cedrus orientalis fœtidissima *Tourn.*

J. phœnicea *L.* — *Guss.* Pl. rar., tab. 62. — Regio mediter.

J. tetragona *Mœnch.*

J. bacciformis *Aliq. Hort.*

J. thurifera *Aliq. Hort.* (non *Lin.*).

J. phœnicea.

var. lycia *Loud.* — Nouv. Duham. VI, tab. 17; *Pall.* Fl. ross., tab. 56.

J. lycia *L.* — *Loud.* Arbor. IV, fig. 2367.

J. Langoldiana *Hort. brit.*

Cupressus Devoniana *Hort.*

— pyramidalis.

J. pyramidalis *Hort.*

J. thurifera *L.* — *Loud.* Arbor. IV, fig. 2369. — Europa australis et Algeria.

J. hispanica *Lamk.*

J. fœtida *var.* thurifera *Spach.*

J. sabinoides *Endl.* (non *Griseb.*).

J. Bonatio *Vis.* Illustr. Pl. nuov. ort. bot. di Padova, tab. 1.

var. cinerea.

J. cinerea *Carr.*

J. thurifera *Hort.* (non *Lin.*).

J. sabinoides *Hort.* (nec *Endl.*, nec *Griseb.*).

J. chinensis *L.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 126-127. — Japonia, China et Himalaya.

J. virginica *Thunb.* (non *Lin.*).

J. cernua *Roxb.*

J. religiosa *Royle.*

J. dioica *Hort.*

— mascula.

J. dimorpha *Roxb?*

J. Thunbergii *Hook.*

J. dioica *Hort.*

J. mascula *Hort.*

— fœmina.

J. Rewesiana *Hort.*

J. flagelliformis *Hort.* — *Loud.* Encycl., fig. 1090.

J. fœmina *Hort.*

J. struthiacea *Hort.*

J. chinensis.

var. Jacobiana.

— japonica.

J. japonica *Carr.* Conif. Ed. 2, p. 31.

J. procumbens *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 127, fig. 3.

J. mongolica *Hort.*

— japonica pyramidalis.

J. pyramidalis glauca *Hort.*

J. sinensis glauca *Hort.*

— Leeana.

J. Leeana *Hort. brit.*

— nana.

J. japonica nana *Hort.*

— aurea.

— variegata.

J. sphærica *Lindl.* in *Paxt.* Fl. gard. I, tab. 35.

— China borealis.

J. chinensis *var.* Smithii *Loud.*

J. Fortunei *Hort.*

J. sinensis *Aliq. Hort.*

var. pendula (Smithiana).

J. Smithiana pendula *Hort.*

J. virginiana *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 5; Nouv. Duham. VI, tab. 16. — America septentrionalis.

J. caroliniana *Duroi.*

J. arborescens *Mœnch.*

J. fœtida *var.* virginiana *Spach.*

Vulg. *Cèdre rouge ; Cèdre de Virginie.*

var. Bedfordiana *Knight* (Gossainthanea).

J. Bedfordiana *Hort.*

J. gracilis *Endl.*

J. Gossainthanea *Lodd.*

J. virginiana barbadensis *Gord.*

J. virginiana.

var. Chamberlaynii (pendula).

J. virginiana pendula *Hort.*

— Canaertii (robusta).

— dumosa.

J. dumosa *Hort.*

— freneloides.

J. freneloides *Hort.*

— glauca *Carr.* (cinerascens, argentea).

J. glauca *Willd.*

J. cinerascens *Hort.*

J. argentea *Hort.*

— humilis (pumila).

— pyramidalis (stricta).

— Schottii (viridis).

J. Schottii *Hort. brit.*

J. Schollii *Hort.*

— tripartita.

J. tripartita *Hort.*

— variegata.

— — alba.

J. occidentalis *Hook.* — *Newberry*, Rep., tab. 10. — Amer. boreali-occidentalis.

J. excelsa *Lewis.* in *Pursch.* (non *Bieb.*).

J. andina *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 110.

J. dealbata *Hort.* (non *Loud.*).

J. californica *Carr.* Conif. Ed. 2, p. 41.

J. piriformis *Lindl.*

J. dealbata *Loud.* — America borealis.

J. bacciformis *Hort.*

J. fœtidissima *Hort.* (non *Willd.*).

J. occidentalis *Hort.* (non *Hook.*).

J. fragans *Knight.*

J. pyramidalis *Hort.* (non J. phæniceæ var.).

J. tetragona *Schlecht.* — Mexico.
J. mexicana *Spreng.*
Cupressus sabinoides *H. B. K.*
Sabina tetragona *Ant.* Conif., tab. 53.

SPECIES VEL STIRPES CULTÆ, SED NONDUM RECOGNITÆ.

J. alba *Knight.* — Himalaya.
J. cyprina *Hort. Sim.-Louis.*
J. decumbens *Hort.*
J. Smithiana *Hort.*
J. Shepherdii *Hort. Sieb.*
J. Veitchei *Hort. brit.*

DACRYDIUM Soland.

D. Franklinii *Hook. fil.* Lond. journ. bot. IV, tab. 6, et Fl. tasman., tab. 100. — Tasmania.
D. Huonense *All. Cunn.*

SAXE-GOTHÆA Lindl.

J. conspicua *Lindl.*— Fl. des serres VII, cum Icon.; Illustr. hort. 1854, cum Icon. — Chili.

TAXUS Tourn.

T. baccata *L.* — *Rich.* Conif., tab. 2; Nouv. Duham. I, tab. 19. — Europa et Asia.
T. nucifera *Wall.* Tent. fl. nepal., tab. 57.
T. virgata *Wall?*
T. nepalensis *Jacquem.* mss.
T. Wallichiana *Zucc?*
Vulg. *If.*

T. baccata.

var. fastigiata *Loud.*

T. fastigiata *Hort.*

T. hibernica *Hook.*

T. pyramidalis *Hort.*

— fastigiata aurea mascula.

T. hibernica aurea mascula *Hort.*

— erecta (stricta).

T. stricta *Hort.*

T. Crowderi *Hort. brit.*

T. pyramidalis *Knight.*

— nidpathensis (erecta robusta).

— cheshuntensis *Gord.* (suberecta).

— pyramidalis (subpyramidalis).

T. pyramidalis *Hort.* (non *Knight.*).

— horizontalis.

T. horizontalis *Hort.*

— Jacksonii *Gord.*

— nana (Foxii).

T. Foxii *Hort. brit.*

— monstrosa.

T. monstrosa *Hort.*

T. sparsifolia *Hort.*

T. Mitchelli *Hort.*

— ericoides (empetrifolia).

T. ericoides *Hort.*

T. microphylla *Hort.*

— Dovastoni. — China.

T. Dovastoni *Hort.*

T. — pendula *Hort.*

T. pendula *Hort.*

T. umbraculifera *Hort.*

Cephalotaxus umbraculifera *Sieb.*

— Dovastoni variegata.

T. baccata.

var. glauca (glaucescens).
— aurea (aureo-variegata).
— argentea (elegantissima).
T. baccata variegata *Hort.*
T. marginata *Aliq. Hort.*
— fructu luteo.
— macrocarpa.
T. macrocarpa *Hort.*

T. adpressa *Gord.* Pinet., Ed. 2, p. 387. — Japonia.
T. baccata var. adpressa *Carr.* Conif., Ed. 2, p. 731.
T. brevifolia *Hort.*
T. sinensis tardiva *Knight.*
Cephalotaxus adpressa *Hort.*
C. brevifolia *Hort.*

var. stricta.
T. adpressa stricta *Hort.*
T. — fastigiata *Hort.*

T. canadensis *Willd.* — *Loud.* Encycl., fig. 2105-2106. — America borealis.
T. baccata minor *Michx.*
T. baccata *Hook.* (pro parte).
T. procumbens *Lodd.*

var. aurea (variegata).
T. Washingtoni *Hort. brit.*

T. brevifolia *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 108. — California.
T. baccata *Hook.* (pro parte).
T. Lindleyana *Murr.*
T. Boursieri *Carr.* Conif. Ed. 2, p. 739.
T. occidentalis *Hort.*

T. cuspidata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 138. — Japonia.
T. baccata *var.* cuspidata *Carr.*
var. brevifolia *Sieb.* (non T. brevifolia *Nutt.*).

CEPHALOTAXUS Sieb. et Zucc.

C. pedunculata *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 132. — Japonia.
Taxus Harringtoniana *Forbes*, Pinet. Woburn., tab. 68.
T. sinensis *Hort. brit.*
T. Inukaja *Knight.*

var. fastigiata.
C. Koraiana *Hort.*
Podocarpus Koraiana *Sieb.* Ann. hort. Pays-Bas, 1844.
Taxus japonica *Lodd.*

C. Fortunei *Hook.* Bot. mag., tab. 4449. — Fl. des serres VI, tab. 555. — China.
C. Fortunei mascula *Hort.*
C. — fœmina *Hort.*
C. — pendula *Hort.*
C. — pedunculata *Hort.*
C. filiformis *Knight.*

var. robusta.
C. fructibus globosis rubris *Hort.*

C. drupacea *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 130-131. — Japonia.
C. fœmina *Hort.*
C. coriacea *Hort.*
Podocarpus coriacea *Hort.*
Taxus coriacea *Hort.*

TORREYA Arnott.

T. grandis *Fortune* in *Gord.* Pinet. — China borealis.
Caryotaxus grandis *Henk.* et *Hochst.*

T. nucifera *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 129. — Japonia.
Taxus nucifera *Kæmpf.* Amœn., p. 814-815, cum Icon. — *Rich.* Conif., tab. 2, fig. 3.
Podocarpus coreana *Hort. Van-Htte.*

T. taxifolia *Arnott.* — *Hook.* Icon. III, tab. 232-233 ; *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 109. — Florida.
T. montana *Hort.*

T. californica *Torr.* — *Newberry* in *Williams* Report. VI, fig. 27. — California.
T. Myristica *Hook. fil.* Bot. mag., tab. 4780. — Fl. des serres IX, tab. 925; *Murr.* Notes calif. trees, I, tab. 3.

GINKGO Kæmpf.

G. biloba *L.* — *Gouan.*, Descr. Gink. cum Icon. — China et Japonia.
Salisburia adianthifolia *Salisb.* — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 136.
var. pendula.
— macrophylla (laciniata).
— variegata.

PODOCARPUS L'Hérit.

P. Nageia *R. Br.* — *Mirb.* in Mém. Mus. cum Icon.; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 135. — Japonia.
Nagi *Kæmpf.* Amœn., Icon. p. 875.
Myrica Nagi *Thunb.*
Nageia japonica *Gærtn.*
var. albo-variegata.

P. Totara *Don.* in *Lamb.* Pin. — Nova Zelandia.
P. Bidwilli *Hort.*
P. neriifolia *Don.* in. *Lamb.* Pin. — Fl. des serres, VIII, tab. 768. — Nepalia.
P. chinensis *Wall.* — China.
P. macrophylla *var.* Maki *Endl.*
P. Maki *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 134.
P. Makoyi *Hort.*
P. Vriesiana *Hort.*
P. Koreana *Aliq. Hort.*
P. Miquelia *Aliq. Hort.*
Maki Spuria *Kæmpf.*
Taxus chinensis *Roxb.*
var. variegata (argenteo-variegata).
— fructibus cœruleis.
— — rubris.
P. macrophylla *Don.* in *Lamb.* Pinet. ed. 2, (non *Wall.*). — *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap. II, tab. 133. — Japonia.
Maki fœtens *Kæmpf.*
Taxus macrophylla *Thunb.*—*Banks.* Ic. *Kæmpf.*, tab. 24.
P. japonica *Hort. Bogor.* ex *Sieb.* Ann. soc. hort. Pays-Bas. — Japonia.
var. longifolia.
P. flagelliformis *Hort.*
— aureo-variegata.
P. andina *Pœpp.* — Chili.
P. spicata *Pœppig.* (non *R. Br.*).
Taxus spicata *Dombey.*
Prumnopitis elegans *Philippi,* in Linnæa XXX, p. 371.
P. læta *Hoïbr.* in *Endl.* Conif. — Nova Hollandia.
P. japonica *Hort. Bogor* ex *Sieb.* — Japonia.
P. lanceolata *Gord.*

P. latifolia *Wall.* Plant. asiat. rar., tab. 30. — *Hook.* Lond. journ. bot. I, tab. 23. — Bengalia Orient.
P. zamiæfolia *Hort.*
P. pinnata *Aliq. Hort.*
Nageia latifolia *Gord.*

P. chilina *Rich.* Conif., tab. 1, fig. 1. — Amer. merid.
P. saligna *Don.* in *Lamb.* Pinus.

P. elongata *L'Hérit.* — *Rich.* Conif., tab. 1, fig. 2. — Prom. Bon. spei.
Taxus Capensis *Lamk.*

P. nubigena *Lindl.* in *Paxt.* Flow. gard. 1851. fig. 218. — Chili.
P. nubicola *Hort. Makoy.*

MONOCOTYLEDONEÆ

SMILACINEÆ

SMILAX Tourn.

S. Salsaparilla *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 3; *Lamk.* Encycl., tab. 817. — America sept.
S. glauca *Walt.* — Bot. mag., tab. 846.

S. aspera *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 53. — Europa meridionalis.

S. mauritanica *Poir.* — Regio mediterr.
S. nigra *Willd.*
S. aspera *var.* β *L.*

S. China *L.* — *Kæmpf.* Amœn., tab. 782. — China et Japon.

S. pseudo-China *L.* — *Descourt.* Fl. med. VII, tab. 462. — America septentrionalis.

S. rotundifolia *L.* — America septentrionalis.

S. Sebeana *Hort. Sieb.* — Japonia.

S. excelsa *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 57. — Caucasus et Oriens.
S. China *Gmel.* (non *Lin.*).

S. lanceolata *L.* — America septentrionalis.
var. alba.
S. alba *Pursh.*

S. laurifolia *L.* — America septentrionalis
S. cuspidata *Poir.?*

RUSCUS Lin.

R. aculeatus *L.* — *Bull.* Herb., tab. 243; *Smith*, Engl. bot. tab. 560; *Lamk.* Encycl., tab. 835. — Gallia.
Vulg. *Fragon*; *Petit Houx.*
var. rotundifolia.

R. hypophyllum *L.* — Bot. mag., tab. 2049.— Italia.
Vulg. *Laurier Alexandrin.*

R. hypoglossum *L.* — *Black.* Herb., tab. 128. — Europa meridionalis.

DANAE Medicus.

D. racemosa *Mœnch.* — Regio mediterr.
Ruscus racemosus *L.* —*Wats.* Dendr. brit. II, tab. 145.

LAPAGERIA Ruiz. et Pav.

L. rosea *Ruiz.* et *Pav.* Fl. peruv., tab. 297. — Bot. mag. tab. 4447; Fl. des serres V, tab. 491. — Chili.
var. alba.

PHILESIA Juss.

P. buxifolia *Willd.* — *Lamk.* Encycl., tab. 248; Bot. mag., tab. 4738; Fl. des serres IX, tab. 873; Illust. hort. 1854, tab. 3. — Fret. Magell.
P. magellanica *Raeusch.*

LILIACEÆ

YUCCA Lin.

Y. aloifolia *L.* — *DC.* Pl. grasses, tab. 20 ; *Redout.* Lil., tab. 401 et 402 ; Bot. mag., tab. 1700. — Mexico et Florida.
Y. serrulata *Haw.*
var. angustifolia.
— variegata.

Y. Draconis *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 243 ; Bot. reg.. tab. 1894. — Carolina.
Y. Harruckeriana *Crantz.*

Y. tenuifolia *Haw.* — Patria ignota.

Y. concava *Haw.* — Patria ignota.
Y. filamentosa *var.* latifolia *Hort.*

Y. filamentosa *L.* — Bot. mag., tab. 900 ; *Redout.* Lil., tab. 277-278 ; *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 324. — Carolina et Virginia.
Y. puberula *Haw.*

Y. flaccida *Haw.* — Bot. reg.. tab. 1895 ; *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 323. — Patria ignota.

Y. recurvifolia *Salisb.* Parad., tab. 31 ; *Saund.* et *Bak* Refug. bot., tab. 321. — Georgia.
Y. recurva *Haw.*
Y. pendula *Sieb.* — *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 488 cum Ic.
Y. japonica *Hort.*
Y. recurvata *Hort.*

Y. glaucescens *Haw.* — *Sweet.* Brit. flov. gard., tab. 55. — America septentrionalis.
Y. angustifolia *Hort. brit.* (non *Pursh*).
Y. gloriosa *var.* glaucescens *Hort.*

Y. angustifolia *Pursh.*—Bot. mag. tab. 2236.—Amer. Sept.

Y. stricta *Sims.* Bot. mag., tab. 2222. — *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 468, cum Icon. — Carolina.

Y. gloriosa *L.* — Bot. mag., tab. 1260; *Redout.* Lil., tab. 326-327 ; Nouv. Duham. III, tab. 35; *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 329. — America sept.

var. reflexa.
— longifolia.
— plicata (plicatilis). — Bot. mag. tab. 2662.
— minor.
Y. superba *Haw.* Bot. rep. tab. 473.
Y. rubra *Hort.*
— quadricolor.
— variegata.

Y. glauca *Sims*, Bot. mag., tab. 2662. — *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 325. — Carolina.
Y. glaucescens *Aliq. Hort.*

Y. baccata *Torr.* — Illustr. *Hort.* XXI, tab. 115; — Nov. Mexico.

Y. obliqua *Haw.* — Patria ignota.

Y. canaliculata *A. Gray.* — Texas.
Y. Treculeana *Carr.* — L'hort. franç. 1864, tab. 16.

Y. filifera *Hort. Makoy.* — Mexico.

Y. lutescens *Carr.* — Texas.

Y. flexilis *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 398, cum Ic. — Amer. sept.
Y. stenophylla *Hort.*
Y. angustifolia *Aliq. Hort.* (non *Pursh*).
Y. undulata *Hort.*

Y. Wipplei *Torrey* Bot. Mex. Bound, p. 222. — Gard. chron. 1876, fig. 42. — Nov. Mexico.

Y. graminifolia *Hort. A. Leroy.*

PALMÆ

TRACHYCARPUS Wendl.

T. Fortunei *Wendl.* — *J. Gay.* Bull. Soc. bot. VIII, p. 429. — China et Himalaya.
Chamærops Fortunei *Hook.*
C. sinensis *Hort.*
var. grandis.
Chamærops excelsa *Mart.* (non *Thunb.*).
— tomentosa.
Chamærops Barilleti *Aliq. Hort.*

T. Martiana *Wendl.* — *Wall.* Pl. asiat. tab. 211 — Nepalia.
Chamærops Martiana *Hort.*

T. Ritchieana *Wendl.* — Himalaya.
Chamærops Ritchieana *Hort.*

CHAMÆROPS Lin.

C. humilis *L.* — *Lamk.* Encycl. tab. 900; Nouv. Duham, VII, tab. 58. — Sicilia, Mauritan. et Hispania.
C. conduplicata *J. Kickæ.*
var. hermaphrodita.
— tomentosa.

C. macrocarpa *Hort. berol.* (1) — Africa borealis.
Chamæripes minor *Gærtn.* Fruct. I, tab. 9.
C. humilis *var.* β. *Loisel.*
C. — macrophylla *Hort. Hamma.*
var. elegans.

(1) Il y a deux espèces de vrais *Chamærops* en Algérie : l'un à fruits *ronds*, sucrés, *mangeables*; l'autre à fruits *oblongs* et qui exhalent à la maturité une odeur repoussante d'acide butyrique.

SABAL Adans.

S. Palmetto *Lodd.* — Louisiana.
Chamærops Palmetto *Michx*, Arb. amer. II, tab. 10.

BRAHEA Mart.

B. filamentosa *Wendl.* — Gard. chron. 1876, p. 80. — Orégon.
Pritchardia filifera *Hort.*

GRAMINEÆ

ARUNDO Lin.

A. Donax *L.* — *Host.* Gram. IV, tab. 38; *Mutel.* Fl. fr., fig. 78. — Europa australis.
A. sativa *Lamk.*
Donax arundinaceus *Beauv.* Agrost., tab. 16, fig. 4 et tab. 19, fig. 1.
var. variegata.

A. mauritanica *Desf.* — *Nees.* Gen. I, tab. 36. — Europa australis et Africa borealis.

ARUNDINARIA Michx. (1).

A. japonica *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia.
Bambusa Metake *Sieb.*
B. mete *Hort.*

A. Maximowiczii *Hort.*

(1) La monographie des *Bambusaceæ* de M. le général William Munro m'a servi, presque exclusivement, pour établir l'énumération et la synonymie des espèces de graminées ligneuses réunies à Segrez.

A. falcata *Nees.* — *Rupr.* Bult. Petersb., p. 115, tab. 3, fig. 8. — Himalaya et Nepalia.
A. interrupta *Trin.*
Bambusa gracilis *Hort.* (non *Wall.*).

THAMNOCALAMUS Falcon.

T. Falconeri *Hook.* — Himalaya.

PHYLLOSTACHYS Sieb. et Zucc.

P. bambusoides *Sieb.* et *Zucc.* — Japonia, China et Himalaya.
Bambusa reticulata *Rupr.*
B. bifolia *Sieb.*
B. Metake *Aliq. Hort.*

P. nigra *Munro.* — China et Japonia.
Arundarbor nigra *Rumph.*
Bambusa nigra *Lodd.*
B. puberula *Miquel.*
B. Duquilloi ? *Carr.*

BAMBUSA Schreber.

B. angulata *Munro.* — China.
Vulg. *Bambou à tiges carrées Hort.* — Rev. Hort. 1876, fig. 3.

B. flexuosa *Munro.* — China.

B. Fortunei, *Van-Htte* Fl. des serres XV, tab. 1535. — Japonia.
B. Fortunei foliis niveo-vittatis *Hort. Van-Htte.*
B. picta *Sieb.* et *Zucc.* (non *Lind.*).
B. variegata *Sieb.*

B. nana. *Roxb.* — China et Japonia.
B. glauca *Lodd.*
B. glaucescens *Sieb.*
B. viridi-glaucescens *Carr.*
Arundinaria glaucescens *Pal. de Beauv.* — *Rupr.*, Bambus. tab. 1, fig. 3.

SPECIES IN HORTIS EUROPÆIS NUPERRIME INTRODUCTÆ, SED ADHUC IMPERFECTE NOTÆ.

B. aurea *Sieb.* apud *Miquel.* — Japonia.
B. aureo striata *Reg.* Gartenfl. 1865, tab. 490, fig. 3 et 4.
Phyllostachys ? *Munro.*
B. argenteo-striata *Reg.* Gartenfl. 1865, tab. 490, fig. 5.
Affin. B. Fortunei *Van-Hutte*, ex *Munro.*
B. striata *Lodd.* — China.
B. viridi-striata *Hort.*
B. Quihoui *Hort.* — Japonia septentrionalis.
B. violescens *Hort.*. — China.
B. Ragamowski *Hort.*
B. Simoni *Carr.*
B. albo-striata *Hort.*

DENDROCALAMUS Nees.

D. latifolius *Munro* Bambus., tab. 6. — China.
Bambusa verticillata *Benth.* Fl. Hongk. (non *Willd.*, nec *Hook.* et *Arn.*).
D. strictus *Nees.* — India orientalis.
Bambusa stricta *Roxb.* — *Rupr.* Bambus., tab. 12.
Bambusa verticillata *Rotler* (non *Willd*, nec *Benth.*, nec *Hook.* et *Arn.*).

TABLES

	pages.
PRÉFACE	I
Extrait du Rapport de la Commission de la Société centrale d'horticulture, chargée de visiter les collections dendrologiques de Segrez.	XX
Auteurs et ouvrages cités	XXXIII
Énumération des espèces	1
Tables	307

TABLE ALPHABÉTIQUE

NOTA : Les noms génériques adoptés sont en caractères romains ordinaires, les noms synonymes ou d'espèces reportées dans un autre genre, en caractères *italiques* ; les noms vulgaires ou français en PETITES CAPITALES ; et les noms de familles en GRANDES CAPITALES.

A

	pages.
Abelia	143
Abies	254
Abies	244, 267, 268, 269, 270
Abies, voir Cedrus.	
— — Larix.	
— — Pseudolarix.	
— — Cunninghamia.	
ABRICOTIER	69
Absinthium	145
Acacia	66, 67
Acanthopanax	126
Acer	26
Acer	30
ACERINEÆ	26
Actinidia	10
Adelia	173
Ægle	24
Æsculus	30
Æsculus	32, 33
Ailanthus	40
Ailanthus	34
AJONC	55
Akebia	10
ALANGIEÆ	113
ALATERNE, voir Rhamnus Alaternus.	
Albizzia	67
ALISIER	99
Alnaster	222
Alnus	222
ALVIEZ	252
AMANDIER, voir Amygdalus.	
AMARANTACEÆ	183
Amelanchier	102
Amelanchier	82
Ammyrsine	159
Amorpha	60
AMPELIDEÆ	34
Ampelopsis	34
Ampelopsis	36, 54
Ampelygonum	183
Amygdalopsis	70, 72, 73
Amygdalus	67
Amygdalus	68, 69, 72
Anagyris	55
Ancistrum	83

pages.
Andromeda. 150
Andromeda. . . . . 147 à 152
Androsæmum. 24
ANIS ÉTOILÉ. 6
Anona. 10
ANONACEÆ 10
APETALÆ. 183
APOCYNEÆ 175
Aralia. 125
Aralia. 125, 126
ARALIACEÆ. 125
Araucaria 244
Araucaria. 270
ARBRE DE JUDÉE, voir Cercis.
Arbutus. 146
Arbutus. 147
Arctostaphylos. 147
Ardisia. 160
Aria 97
Aria 101
Aristolochia. 193
ARISTOLOCHIÆ. 193
Aristotelia. 21
Armeniaca. 69
Armeniaca. 70
Aronia. 107
Aronia. 99, 100, 108, 109
Artemisia 144
Arthrotaxis. 270
ARTOCARPEÆ 242
Arundarbor. 303
Arundinaria. 302
Arundinaria. 303
Arundo. 302
ASCLEPIADEÆ. 175
Asimina. 10
Aster. 5
Astragalus. 64
Atragene. 5
Atraphaxis. 184
Atriplex. 188
ATRIPLICEÆ. 188
AUBÉPINE. 95
Aucuba. 130

pages.
AUNE, voir Alnus.
AURANTIACEÆ. 23
AVELINIER, voir Corylus Avellana.
Azalea 153
Azalea. 153
Azara. 17
AZARÉRO 77
Azarolus. 90, 91, 96

B

Baccharis. 145
BALSAMIFLUÆ. 219
BAMBOU, voir Bambusa.
Bambusa. 305
Bambusa. 304, 305, 306, 307
BEAUMIER DE GILEAD 258
Belis. 270
Ballota. 192
Benthamia. 129
Benzoin. 192
BERBERIDEÆ. 12
Berberidopsis 12
Berberis. 12
Berberis. 15, 16
Berchemia. 48
Berisia. 119
Betula. 220
Betula. 211, 222
BETULACEÆ. 220
Betulaster 222
BIBACIER, voir Eriobotrya japonica.
BIGARADIER. 24
BIGARREAUTIER. 74
Bignonia. 176
Bignonia. 175, 176, 178
BIGNONIACEÆ. 175
Biota. 276
Biota. 281
BIXACEÆ. 17
Bladhia. 160

pages.
Boehmeria 196
Bois d'Arc. 242
— de Sainte-Luce 76
Boldu. 192
BORRACINEÆ. 177
Borya. 173
Boule de neige. 136
Bouleau, voir Betula.
Bourgène. 49
Brahea. 304
Broussonetia. 241
Brugnonier. 68
Brunniehia. 184
Bryanthus. 152
Buddleia. 177
Buddleia. 178
Buis, voir Buxus.
Buisson ardent, voir Cratægus pyracantha.
Bumelia. 160
Burcardia. 179
Bupleurum. 125
BUXACEÆ. 194
Buxus. 194
Buxus 195

C

Cailicarpa. 179
Calligonum. 183
Callitris. 274
Callitris. 274
Calluna. 151
Calobotrya. 121
Calophaca. 63
Calothyrsus 33
Calusparassus. 211
CALYCANTHEÆ 111
Calycanthus. 111
Calycanthus. 112
Camellia. 22
Camphora. 191

pages.
Campsis. 176
Campylotropis. 65
Canne de Provence, voir Arundo.
CAPPARIDEÆ. 16
Capraria. 178
Caprifolium. . . . . 137 à 142
Caragana. 62
Caragana. 63
Cardiandra. 124
Carniola. 57
Carpinus. 214
Carpinus. 214
Carya. 216
Caryotaxus. 296
Cassandra. 150
Cassiope. 151
Cassis, voir Ribes nigrum.
Castanea. 209
Castanea. 209, 210
Castanopsis. 209
Casuarina. 243
CASUARINEÆ. 243
Catalpa. 175
Ceanothus. 50
Cèdratier. 24
Cèdre du comte de Dijon. . . . 268
— du Liban. 268
— de Virginie. 290
— pleureur. 267
— rouge. 290
Cedrela. 34
Cedrus. 267
CELASTRINEÆ. 41
Celastrus. 43
Celastrus. 42
CELTIDEÆ. 238
Celtis. 238
Cembro. 252
Cephalanthus. 143
Cephalotaxus. 295
Cephalotaxus 293, 294
Cerasus. 72
Cerasus. 71, 72, 73
Cereis. 65

pages.
CERISIER. 72
Cestrum. 182
Chænomeles. 110
CHALEF, voir Elæagnus angustifolia.
Chamæbatia. 83
Chamæcerasus. 140
Chamæcyparis. 278, 282
Chamæripes. 303
Chamærops. 303
Chamærops. 303
CHARME, voir Carpinus.
CHATAIGNIER, voir Castanea.
CHÊNE, voir Quercus.
CHÊNE CASTILLAN. 198
— LIÉGE. 197
Chenopodium 188
Chimonanthus. 112
Chionanthus. 173
CHLORANTHEÆ. 196
Chloranthus. 196
Chrysobotrya. 121, 122
Cinnamomum. 191
CIRIER, voir Myrica.
Cissus. 35, 36
CISTINEÆ. 17
Cistus. 18
Citharexylum. 178
CITRONNIER. 23
Citrus. 23
Citrus. 24
Cladrastis. 55
Clematis. 1
Clerodendron. 179
Clethra. 147
Cleyera. 21
Cleyera. 22
Cneorum. 40
Cocculus. 11
COIGNASSIER 111
Colletia. 50
Colutea. 63
Columbea. 244
COMPOSITÆ. 144
Comptonia. 218

pages
CONIFERÆ. 244
COPALME, voir Liquidambar.
Corchorus 77
Cordia. 177
CORDIACEÆ. 177
Coriaria. 40
CORIARIEÆ. 40
CORMIER, voir Cormus.
Cormus. 101
CORNEÆ. 129
CORNOUILLER, voir Cornus.
Cornus. 129
Cornus 129
Coronilla. 64
CORYLACEÆ. 211
Corylopsis. 128
Corylus. 211
Cotoneaster. 96
COUDRIER, voir Corylus.
Cratægus. 89
Cratægus. 89, 97-102, 107, 108, 109
Croton 193
Cryptomeria. 272
Cudrania. 243
Cunninghamia. 270
Cunninghamia. 270
Cupressus. 278
Cupressus. 272, 273, 274, 277, 281, 289, 292
CUPULIFERÆ. 196
Cydonia. 110
Cydonia. 110
Cynanchum. 175
CYPRÈS, voir Cupressus.
CYPRÈS CHAUVE. 272
— DE LA LOUISIANE. 272
Cytisus. 58
Cytisus. 56, 57, 59, 60, 63

D

Dabœcia. 152
Dacrydium 292

pages.
Dacrydium. 274
Dammara. 244
Danae. 300
Daphne. 186
Daphne. 188
Decumaria. 117
Deeringia. 183
Dendrocalamus. 306
Desfontainea 182
Desmodium. 64
Deutzia. 116
Deutzia. 114, 115
DICOTYLEDONEÆ. 1
Diervilla. 136
DILLENIACEÆ. 10
Dimorphanthus. 125
Diospyros. 161
Dirca. 186
Distegocarpus. 214
Distylium. 128
Docynia. 110
Dombeya. 244
Donax. 304
Drymis. 6
Duvaua. 54

E

EBENACEÆ. 161
Ebénier (faux), voir Laburnum.
Edgeworthia. 188
Edwardsia. 55
ELÆAGNEÆ 189
Elæagnus 189
Embothrium. 185
Emerus 64
EMPETRACEÆ. 195
Empetrum 195
Ephedra 243
Epicea 263
Epigæa. 148
Epine noire. 70
Epine-Vinette, voir Berberis.

pages.
Erable, voir Acer.
Erable plane 28
Erica 151
Erica 151, 152
ERICACEÆ. 146
Eriobotrya. 107
Escallonia 122
Escallonia 16
Eugenia. 117
EUPHORBIACEÆ 193
Euptelea 128
Eurya. 21
Eurya 42
Eurybia 145
Eurybia. 145
Euscaphis 41
Evonymus 41
Evonymus. 43
Excæcaria 193
Exochorda. 82
Exochorda 83

F

Fabiana 182
Fadyenia 128
Fagara. 39
Fagus 210
Fagus. 209, 211
Fatsia. 129
Février, voir Gleditschia.
Ficus. 241
Figuier, voir Ficus.
Fitz-Roya. 275
Flacourtia 17
Fluggea 194
Fontanesia. 167
Forestiera. 173
FORESTIERE E 173
Forsythia. 168
Fortunea. 218
Fothergilla 127
Fragon. 300

pages.
Fraxinus. 162
FRÊNE, voir Fraxiuus.
FRÊNE DE CRIMÉE 164
Frenela 274
Freylinia. 178

G

Galphimia 179
Garrya. 128
GARRYACEÆ 128
Gaultheria. 148
Geblera 194
GENÊT, voir Genista.
GENÊT A BALAI. 56
GENÉVRIER, voir Juniperus.
Genista. 59
Genista 56, 57, 58
GESNERIACEÆ 145
Gingko. 296
Gleditschia 66
GLYCINE 65
Glyptostrobus. 273
Glyptostrobus. 273
GNETACEÆ 243
Gordonia. 22
Grabowskia 181
GRAMINEÆ 304
GRANATEÆ. 112
GRENADIER, voir Punica.
Grevillea 185
GRIOTTIER 74
GRISARD. 225
GROSEILLIER, voir Ribes.
Grossularia 118
GLOSSULARIEÆ. 118
GUIGNIER 74
Guilandina. 66
Gymnocladus 66

H

Halimodendron 63
HAMAMELIDEÆ. 127

pages.
Hamamelis. 127
Hamamelis 127
Halesia. 162
Halesia. 161
Hedera 126
Hedysarum. 64, 65
Helianthemum. 17
Helwingia 184
HELWINGIACEÆ 184
HEMLOCK-SPRUCE 265
Heteromeles 107
HÊTRE, voir Fagus.
Hibiscus 18
HIPPOCASTANEÆ 30
Hippophaë 190
Hippophaë 190
Hollboellia. 10
HOUX, voir Ilex.
HOUX (PETIT). 300
Hovenia 52
Hydrangea 123
Hydrangea. 124
HYPERICINEÆ. 24
Hypericum 24

I

Ibutta 171
Idesia. 17
IF 292
Ilex. 43
Ilex. 48, 169
ILICINEÆ. 43
Illicium 6
Indigofera 60
Isomeris. 16
Itea. 122
Iva 144

J

Jamesia 122
JASMINEÆ. 174

pages.
Jasminum 174
JASMIN, voir Jasminum.
JONC-MARIN 55
JUGLANDEÆ 215
Juglans 215
Juglans 716, 217
JUJUBIER, voir Zizyphus.
JULIBRISSIN, voir Albizzia.
Juniperus 285
Juniperus 283

K

Kadsura 9
Kadsura 9
Kalmia 159
Kerria 77
Kcleeeria 267
Kirri 178
Kœlreuteria 33
Kolomikta 10

L

LABIATÆ 180
Laburnum 59
Lagerstrœmia 114
Lapageria 300
Lardizabala 11
LARDIZABALEÆ 10
Larix 268
LAURIER, voir Laurus.
— D'APOLLON, voir Laurus nobilis.
— A SAUCES, — — —
— TIN, voir Viburnum Tinus.
— ALEXANDRIN 300
— DE PORTUGAL 77
— CERISE 77
LAURINEÆ 190
Laurus 190
Laurus 191, 192

pages.
Ledum 159
Ledum 159
Leiophyllum 159
LEGUMINOSÆ 54
Lembotropis 59
Lespedeza 64
Lespedeza 64, 65
Leucothoë 149
Leucothoë 148
Leycesteria 143
Leycesteria 183
Libocedrus 274
Ligustridum 172
Ligustrina 170
Ligustrinum 178
Ligustrum 171
Lilac 168, 169
LILAS, voir Syringa.
LILIACEÆ 301
Lindera 192
Lindleya 83
Liquidambar 219
Liquidambar 218
Liriodendron 9
Liriopsis 8
Lithospermum 177
Litræa 54
Litsæa 192
Loiseleuria 153
Lonicera 137
Lonicera 135, 136
LONICEREÆ 132
Lycium 181
Lycium 144, 181
Lyonia 149
Lyonia 149, 150
LYTHRARIEÆ 113

M

Maakia 55
Machilus 191

pages.
Maclura 242
Maclura 243
Macrothyrsus. 33
Magnolia. 6
Magnolia. 8, 9
MAGNOLIACEÆ. 6
Mahonia 15
Maki. 297
Mallotus 193
Malachodendron 22
Malus 102
Malus 110
MALVACEÆ 18
MANDARINE. 23
Margyricarpus 83
Marlea 113
MARRONNIER D'INDE 34
Marsdenia 175
Maximowiczia. 9
Meclatis 1, 2
MÉLÈZE, voir Larix europæa.
Melia 34
MELIACEÆ. 34
Menziesia. 153
Menziesia. 152
MENISPERMEÆ 11
Menispermum 11
Menispermum 11
MERISIER 74
— A GRAPPES 76
Mespilus 89
Mespilus. . 89-97, 100, 107, 108, 109
MICOCOULIER, voir Celtis.
Mimosa. 67
Micropeuce 266
Microptelea. 237
MILLEPERTIUS, voir Hypericum.
Mitraria 145
MONOCOTYLEDONEÆ. 299
MONOPETALÆ. 133
MOREÆ 239
Morus 239
Morus 241
Muhlenbeckia 184

pages
MURIER. 240
MURIER A PAPIER, voir Broussonetia.
Myrica 218
Myrica 54, 218, 296
MYRICACEÆ. 213
Myricaria. 110
MYRSINEÆ 160
MYRTACEÆ 117
MYRTHE, voir Myrthus.
MYRTILLE, voir Vaccinium Myrtillus.
Myrtus 117
Myrtus. 117

N

Nageia 296, 298
Nandina. 16
NÉFLIER. 89
Negundo 30
Neillia. 124
Nemopanthes 4
NERPRUN, voir Rhamnus Cartharticus.
Nesæa 113
NEZ-COUPÉ, voir Staphylea.
Nigrina 196
Nitraria 117
NITRARIACEÆ. 117
NOISETIER, voir Corylus.
NOYER, voir Juglans.
Nuttalia 83
Nyssa 185
NYSSACEÆ. 185

O

OLIER, voir Viburnum Opulus.
Olea 169
Olea. 169
OLEACEÆ. 162
Olearia. 145

pages.
Olivier, voir Olea.
Oranger 23
— a feuilles de myrte. . 23
— des Osages. 242
Orcopanax 125
Orme, voir Ulmus.
Orme d'Oxford. 276
Ornus. 162, 163
Osier jaune 228
— rouge. 231
Osmanthus. 169
Ostrya 214
Ostrya. 214
Ostryopsis. 213
Osyris 184
Oxycedrus 285, 286
Oxycoccus 146
Oxydendron. 149
Ozothamnus. 144

P

Pacanier? voir Caryra olivæformis.
Padus. 76
Pæonia. 5
Paliurus 48
PALMÆ 303
Panax. 125 126
Panicum. 306
Papyrius. 242
Papyrus 241
Parrotia 127
Passiflora 118
PASSIFLOREÆ 118
Paulownia 178
Pavia 32
Pavia. 31, 33
Pêche-plate. 69
Pêcher 68
Peraphyllum 107
Periclymenum 138
Periploca 175
Pernettya 147

pages.
Persea 191
Persica 68
Peumus 192
Peuplier, voir Populus.
— d'Italie. 226
— Suisse. 226
— de la Caroline 227
Phellodendron. 39
PHILADELPHEÆ. 114
Philadelphus. 114
Philesia 300
Phillyrea. 170
Phlomis 180
Photinia 107
Photinia 106
Phyllodoce. 152
Phyllostachys 305
Picea, voir Abies.
Picris. 148
Pin, voir Pinus.
Pin à parasol.. 248
— à trochets. 246
— chétif 248
— de Corté. 246
— du Lord. 254
— du Lord Weymouth. 254
— pauvre. 248
— pleureur. 253
Pinckneya. 144
Pinus. 244
Pinus, voir Abies.
— — Cedrus.
— — Larix.
— — Sciadopitys.
Piper. 196
PIPERACEÆ 196
Pipthanthus 55
Pirus. 104
Pirus . . . . . 96 à 111
Pistachier, voir Pistacia.
Pistacia. 52
Pivoine, voir Pœonia.
Plagianthus. 18
Planera. 237

pages.
Planera 237, 238
PLAQUEMINIER voir Diospyros.
PLATANE E 219
Platanus 219
Platanus. 219
Platycarya. 218
Platycladus. 276, 278
Platycrater 123
Podocarpus. 296
Podocarpus. 295, 296
Podocytisus 59
Pœderia. 144
POIRIER, voir Pyrus.
POIRIER SAUGER 105
Polycarpa. 17
Polygala. 17
POLYGALEÆ 17
POLYGONACEÆ. 183
Polygonum 183
Polygonum 184
Poma. 102
POMACEÆ 89
Pomaderis 52
POMMIER, voir Malus.
Populus 224
Potentilla 85
Pourthiæa 106
Prinos. 48
Pritchard a 304
PROTEACEÆ 185
PRUNELIER. 0
PRUNIER 70
Prumnopitis. 297
Prunus 70
Prunus 10, 69-77
Pseudægle. 24
Pseudolarix 270
Pseudotsuga 267
Ptelea. 39
Pterocarya. 217
Pterostyrax 162
Punica. 112
Pyracantha 89

Q

pages
Quadrifaria. 244
Quercus 196

R

RAGOUMINIER 72
Rajania 10
RANUNCULACEÆ. 1
Raphiolepis 109
Rebis. 120
Retama 56
Retinospora. . . . 279, 280, 281, 282
RHAMNEÆ. 48
Rhamnus 49
Rhamnus 48, 238
Rhododendron 155
Rhododendron . . 153, 154, 155, 158
Rhodolcia. 128
Rhodora 158
Rhodotamnus 158
Rhodotypos 77
Rhus. 52
Rhynchospermum 175
Ribes 118
Ribes 118
Robinia 61
Robinia. 62, 63
Robsonia 118
RONCE, voir Rubus.
Rosa. 85
ROSINEÆ. 67
ROSIER THÉ 85
— ÎLE BOURBON 85
— HYBRIDE REMONTANT 85
— DE NOISETTE. 85
— DU BENGALE 86
— CAPUCINE 86
— POMPON 87
— PERPÉTUEL OU DU ROI . . 87

pages.
Rosier a cent feuilles 87
— mousse. 87
— de Provins 87
Rottlera. 193
RUBIACEÆ. 143
Rubus. 83
Ruscus. 300
Ruscus. 300
Ruta. 39
RUTACEÆ.. 39

S

Sabina 292
SALICINEÆ. 244
Salisburia. 296
Salix. 227
Salsepareille, voir Smilax.
Salsola. 188
Sambucus. 132
Sambucus. 41
Santolina.. 145
Sapin, voir Abies.
Sapin argenté. 256
— de Normandie. 256
SAPINDACEÆ. 33
Sapindus... 33
SAPOTEÆ.. 160
Sarcococca. 195
Sarothamnus. 56, 57, 58
Sassafras. 191
Saule, voir Salix.
Saule bleu. 230
— d'Amérique 231
— en candelabre.. 230
— pleureur.. 228
Saxe-Gothea. 292
SAXIFRAGEÆ.. 122
Schizandra. 9
SCHIZANDREÆ.. 9
Schoberia.. 188
Schubertia 272, 273

pages.
Sciadopitys. 271
SCROPHULARINEÆ. 177
Sebastiana. 193
Securinega. 194
Sequoia 271
Seringat, voir Philadelphus.
Serissa. 144
Shepherdia. 190
Sideroxylon.. 160
Skimmia. 40
SKIMMIEÆ. 40
SMILACINEÆ. 299
Smilax.. 299
SOLANACEÆ.. 181
Solanum. 182
Sophora.. 54
Sophora. 54
Sorbier, voir Sorbus.
Sorbus.. 100
Sorbus. . . . . 97 à 101, 108
Sapin Beaumier. 258
Sapinette blanche. 260
— bleue. 260
— noire.. 261
— rouge. 261
Spartium. 56
Spartium 56, 57, 58
Spiræa. 78
Spiræa. 77, 82
Stachyurus. 21
Staphylea.. 41
STAPHYLEACEÆ. 41
Stauntonia. 11
Stauntonia. 10
Sterculia. 18
STERCULIACEÆ. 18
Stillingia. 193
Stillingia. 193
Stransvæsia. 97
Stuartia. 22
Styphnolobium. 54
Styphonia.. 54
STYRACEÆ.. 161
Styrax. 161

pages.
Suæda 188
SUMAC, voir Rhus.
SUREAU, voir Sambucus.
Swammerdamia. 144
SYCOMORE. 26
Symphoria. 142
Symphoricarpos. 142
Symplocos. 44
Syringa.. 168
Syringa. 168. 170

T

Talauma.. 9
TAMARISCINEÆ 112
Tamariscus. 113
Tamarix. 112
Tamarix. 113
Taxodium. 272
Taxodium.. . . . . 271, 272, 273
Taxus. 292
Taxus. 271, 293, 296, 297
Tecoma. 176
TEREBINTHACEÆ.. 52
Ternstrœmia. . . . , ... 21
TERNSTRŒMIACEÆ. 21
Tetranthera.. 192
Teucrium. 180
Thamnocalamus 305
THÉ, voir Thea.
Thea. 22
Thermopsis. 55
Thuyopsis.. 278
Thuyopsis. 275, 277, 279, 280
Thuya. 275
Thuya. 271-281
THUYA DE L'ALGÉRIE.. 274
Thymelea. 188
Thymelea. 186, 187
THYMELEÆ. 186
Tilia.. 18
TILIACEÆ.. 18

pages.
TILLEUL, voir Tilia.
Tomex. 192
Torminaria. 100
Torreya. 296
Trachelospermum. 175
Trachycarpus. 303
TREMELE. 225
Triadica. 193
Trochostigma. 10
TROENE, voir Ligustrum.
Tsuga. 265, 266, 267
TULIPIER, voir Liriodendron.
Turpinia. 54

U

Ulex.. 55
ULMACEÆ. 234
Ulmus 234
Ulmus 238
UMBELLIFERÆ. 125
Ungnadia. 33
Urtica. 196
URTICEÆ. 196

V

VACCINIEÆ. 145
Vaccinium 145
Vaccinium. 146
VERBENACEÆ. 178
Veronica. 178
Viburnum. 134
VIGNE, voir Vitis.
Villbrunea. 196
VINETTIER, voir Berberis.
Viorna. 2
VIORNE, voir Viburnum.
Virgilia. 55
Vitex. 180
Vitis. 35

pages.
Vitis. 35
Volkameria. 179

W

Washingtonia. 271
Weigelia. 136
Wellingtonia. 271
Wickstrœmia 188
Wistaria. 65

X

Xanthoceras. 33
Xanthorhiza 5
Xylosteum. 140, 142

Y

pages
Yeuse, voir Quercus Ilex,
Ypréau, voir Populus alba.
Yucca. 301
Yulania. 7, 8

Z

ZANTHOXYLEÆ. 39
Zanthoxylum. 39
Zelkowa. 238
Zenobia. 148
Zizyphus. 48
Zizyphus. 48

Paris. — Imprimerie de E. Donnaud, rue Cassette, 9.

LIBRAIRIE DE J.-B. BAILLIÈRE & FILS

BEILYNCK (A.). — Cours élémentaire de botanique. Deuxième édition. 1876, gr. in-8, 680 pag., avec 900 fig. 10 fr.

BLANCHARD (E.). — Les Poissons des eaux douces de la France. Anatomie, physiologie. Description des espèces, mœurs, instincts, industrie, commerce, ressources alimentaires, pisciculture; législation concernant la pêche. Gr. in-8, 656 pag., avec 151 fig. dessinées d'après nature. 12 fr.

BREHM. — La vie des animaux illustrée, ou Description populaire du règne animal. Caractères, mœurs, instincts, habitudes et régime, chasses, combats, captivité, domesticité, acclimatation, usages et produits.

— **Les mammifères.** *Ouvrage complet*, 2 v. gr. in-8, avec 800 fig. et 40 pl. 21 fr.

— **Les oiseaux.** *Ouvrage complet*, 2 vol. gr. in-8, avec 500 fig. et 40 pl. 21 fr.

BRONGNIART (Ad.). — Enumération des genres de plantes cultivées au Muséum d'histoire naturelle de Paris, suivant l'ordre établi dans l'Ecole de botanique. *Deuxième édition*, avec une *table générale alphabétique*. 1850, in-12, 3 fr.

CHATIN (J.). — Du siége des substances actives dans les plantes médicinales. 1876, in-8 de 173 pag., avec 2 pl. 3 fr. 50.

DUCHARTRE (P.). — Éléments de botanique comprenant l'anatomie, l'organographie, la physiologie des plantes, les familles naturelles et la géographie botanique. Deuxième édition. 1877, 1 vol. in-8 de 1280 pag., avec 510 fig. dessinées d'après nature, par A. Riocreux, cart. 20 fr.

DUVAL-JOUVE. — Histoire naturelle des Equisetum de la France. 1864, in-4, VIII-296 pag., 10 pl. gravées, en partie coloriées, avec 33 fig. 20 fr.

GAUDICHAUD. — Botanique du voyage autour du monde exécuté sur la corvette *la Bonite* (Amérique méridionale, Océanie, Chine) : 1° *Cryptogames cellulaires et vasculaires* (Lycopodiacées), par MONTAGNE, LÉVEILLÉ et SPRING. 1844-46, 1 vol. in-8, 356 pag.; 2° *Botanique*, par GAUDICHAUD. 1851, 2 vol. in-8 ; 3° Atlas de 150 planches in-folio ; 4° *Explication et Description des planches de l'Atlas*, par M. Ch. d'ALLEIZETTE. 1866, in-8, 186 pag. Prix réduit. 80 fr.

Séparément : l'Explication et description des planches. Paris, 1866, in-8, 6 fr.

GERMAIN (de Saint-Pierre). — **Nouveau Dictionnaire de botanique,** comprenant la description des familles naturelles, les propriétés médicales et les usages économiques des plantes, la morphologie et la biologie des végétaux (étude des organes et étude de la vie). 1870, 1 vol. in-8 de XVI-1388 pag. avec 1640 fig. 25 fr.

GODRON (D.-A.), — De l'espèce et des races dans les êtres organisés, et spécialement de l'unité de l'espèce humaine. 2e *édition*. Paris, 1872, 2 v. in-8. 12 fr.

GRENIER (Ch.). — Tableau analytique des familles de la Flore de France. *Paris*, 1874, in-8, 27 pag. 1 fr.

GRISEBACH (A.). — La végétation du globe d'après sa disposition suivant les climats ; esquisse d'une géographie des plantes, traduit par P. de TCHIHATCHEF, et accompagné d'une carte générale des domaines de végétation.

TOME Ier, in-8 de 765 pag. 16 fr.

TOME II, 1re partie, in 8 de 448 pag. 7 fr. 50

JAUME SAINT-HILAIRE (J.-H.). — Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes. 1805, 2 vol. in-4, avec 117 pl. coloriées. 20 fr.

JUSSIEU (A.-L.). — Principes de la méthode naturelle des végétaux. 1824, in-8, 51 pages. 1 fr.

LAMOTTE (Martial). — **Catalogue des plantes vasculaires de l'Europe centrale,** comprenant France, Suisse, Allemagne. 1847, in-8 de 104 pag. 2 fr. 50.

LOISELEUR-DESLONCHAMPS (J.-L.-A.). — Flora gallica. *Editio secunda*, 1828, 2 vol. in-8, avec 31 planches. 4 fr. 50.

— **Nouvel herbier de l'amateur,** contenant la description, la culture, l'histoire et les propriétés des plantes rares et nouvelles cultivées dans les jardins de Paris. Paris, 1830-1838, 1 vol. in-8, avec 52 planches coloriées. 40 fr.

Le même, in-4. 50 fr.

PLÉE (F.). — Glossologie botanique, ou Vocabulaire donnant la définition des mots techniques usités dans l'enseignement. 1854, in-12, 72 pag. 1 fr. 25

VERLOT (B.) — Le Guide du botaniste herborisant, conseils sur la récolte des plantes, la préparation des herbiers, l'exploration des stations de plantes phanérogames et cryptogames et les herborisations. 1865, 1 v. in-18 de 600 pag., avec fig. cart. 5 fr. 50

Paris. — Imprimerie de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.

New York Botanical Garden Library
QK480.F7 A726 1877 gen
Lavallee, Alphonse/Arboretum Segrezianum
3 5185 00023 5935